

ไฮดราลาซีน
ความแรง 50 มิลลิกรัม
ชนิดเม็ดเคลือบฟิล์ม
ชื่อการค้า APRESZINE 50 (อะเพรสซีน 50)

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้มีชื่อว่า ไฮดราลาซีนไฮโดรคลอไรด์ (hydralazine hydrochloride) เป็นยาในกลุ่มลดความดันโลหิตสูง

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ใช้สำหรับรักษาความดันโลหิตสูงระดับปานกลางถึงรุนแรง โดยใช้เสริมยาลดความดันอื่น

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้
- ผู้ที่มีอาการหัวใจเต้นเร็วผิดปกติ
- ผู้มีภาวะกล้ามเนื้อหัวใจทำงานได้ไม่เต็มที่
- ผู้ที่เป็นโรคหลอดเลือดแดงใหญ่โป่งพอง
- ผู้ที่เป็นโรคแพ้ภูมิตัวเอง (เอสแอลอี) และความผิดปกติที่เกี่ยวข้อง
- ผู้มีภาวะหัวใจโตจากโรคปอด ผู้ป่วยโรคพอร์ไฟเรีย

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

- ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ในกรณีต่อไปนี้
 - ผู้ป่วยโรคตับ
 - ผู้ป่วยโรคไต
 - ผู้ที่ต้องเข้ารับการผ่าตัด
- ควรระมัดระวังการใช้ยานี้ในผู้ที่เป็นโรคหลอดเลือดหัวใจ หรือโรคหลอดเลือดสมอง
- หญิงตั้งครรภ์ควรหลีกเลี่ยงการใช้ยานี้ในการตั้งท้องเดือนที่ 1 – 6

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค

3.2 หากลืมกินยาควรทำอย่างไร

- กินยาทันทีที่นึกขึ้นได้ แต่ถ้าใกล้เวลาของมื้อต่อไปให้รอกินยาของมื้อต่อไป ห้ามกินยาเพิ่มเป็น 2 เท่า

3.3 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง (เช่น หัวใจเต้นเร็ว ปวดศีรษะ ผิวดำแดงทั้งตัว) ให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- หลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
- ระมัดระวังการขับชี่ยานยนต์ หรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกล
- ห้ามหยุดยาเอง และให้กินยาน้อยอย่างต่อเนื่อง ตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกร
- พบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตามผลการรักษาหรืออันตรายจากยา

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

- ลมพิษ บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวดำแดงหลุดลอก มีจ้ำตามผิวหนัง
- หัวใจเต้นเร็ว เจ็บหน้าอก มือบวม ขาบวม

“ให้หยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที”

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์

- ปวดศีรษะ เวียนศีรษะ

“ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์”

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อย่าให้โดนแสงโดยตรง โดยทั่วไปควรเก็บที่อุณหภูมิต่ำกว่า 30 องศาเซลเซียส ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

- ลักษณะยา เม็ดกลมมน เคลือบฟิล์มสีขาว ด้านหนึ่งมีขีดแบ่งครึ่งเม็ดยา อีกด้านหนึ่งมีตัวเลข 50
- ตัวยาสําคัญ ไฮดราลาซีนไฮโดรคลอไรด์
- ส่วนประกอบอื่น ๆ ได้แก่ ไมโครคริสตัลลินเซลลูโลส, โคโพรโอดิน, ไดโซเดียมอีดีเตด, โซเดียมสเตียเรตซิงไกลโคเลต, คอลลอยด์อลซิลิกอนไดออกไซด์, แมกนีเซียมสเตียเรต, โพลีไวนิลแอลกอฮอล์, ไทเทเนียมไดออกไซด์, เลซีติน, แอลคัม, โพลีเอทิลีนไกลคอล, น้ำ

ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จำกัด (มหาชน)

1 ซอยคูบอน 11 ถนนคูบอน แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230 ประเทศไทย
เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ 10 มิถุนายน 2567

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.

- <https://ndi.fda.moph.go.th/>
- <https://innovative.fda.moph.go.th/>

**เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร**