

**แอลทีเพลส**  
**ความแรง 50 มิลลิกรัม**  
**ผงยาและน้ำกลั่นสำหรับทำละลาย**  
**เพื่อหยุดหรือฉีดเข้าหลอดเลือดดำ**  
**Actilyse (แอกทีไลส์)**

**1. ยานี้คืออะไร**

**1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร**

- ยานี้มีชื่อว่า แอลทีเพลส (alteplase) มีตัวยา 50 มิลลิกรัม เป็นยาในกลุ่มต้านการเกิดลิ่มเลือดอุดตัน

**1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร**

- ยานี้ใช้เพื่อละลายลิ่มเลือดที่อุดตัน
- ในโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน
  - ในโรคลิ่มเลือดอุดตันในปอดอย่างรุนแรงและเฉียบพลัน
  - ในโรคหลอดเลือดสมองอุดตันเฉียบพลัน

**2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา**

**2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร**

- ⊗ เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้
- ⊗ มีความเสี่ยงสูงในการเกิดภาวะเลือดออก เช่น
  - ⊗ กำลังมีภาวะเลือดออกผิดปกติ หรือ มีโรคที่ทำให้เลือดออกง่ายผิดปกติ
  - ⊗ กำลังได้รับยาต้านการแข็งตัวของเลือดชนิดรับประทานที่มีประสิทธิภาพสูง
  - ⊗ มีประวัติการเจ็บป่วยของระบบประสาทส่วนกลาง
  - ⊗ มีประวัติหรือสงสัยว่ามีเลือดออกในสมอง
  - ⊗ เป็นความดันโลหิตสูงรุนแรงที่ควบคุมไม่ได้
  - ⊗ มีผื่นคันใหญ่ อาการบาดเจ็บรุนแรง หรือ มีการคลอดบุตรในช่วง 10 วันที่ผ่านมา
  - ⊗ เป็นโรคตับชนิดรุนแรง รวมถึง ตับอ่อนอักเสบเฉียบพลัน
  - ⊗ มีการติดเชื้อแบคทีเรียของลิ้นหัวใจ หรือ เยื่อหุ้มหัวใจอักเสบ
  - ⊗ เป็นแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา

**2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้**

- ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร หากท่านกำลังใช้ยาต้านการแข็งตัวของเลือดชนิดอื่น เพราะอาจทำให้เกิดภาวะเลือดออกรุนแรงได้
- ระวังการรับประทานยาร่วมกับยาลดความดันโลหิตในกลุ่ม เอชอี อินฮิบิเตอร์ (ACE inhibitors) เพราะอาจทำให้เกิดการแพ้ยาเพิ่มขึ้น

**3. วิธีใช้ยา**

**3.1 ขนาดและวิธีใช้**

- **ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น** เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค
- ยานี้ใช้เฉพาะในโรงพยาบาลเท่านั้น โดยแพทย์หรือพยาบาลจะให้ยาโดยการหยุดหรือฉีดเข้าทางหลอดเลือดดำ

**3.2 ถ้าใช้ยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร**

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง เช่น มีเลือดออกผิดปกติ ให้รีบแจ้งแพทย์หรือพยาบาลทราบโดยทันที

**4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา**

- หากมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับการใช้ยานี้ ให้สอบถามได้จากแพทย์ หรือ เภสัชกร

**5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา**

**5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที**

- ลมพิษ บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผื่นหนังหลุดลอก มีจ้ำตามผิวหนังหรือเลือดออกผิดปกติ
- ภาวะเลือดออกผิดปกติ เช่น ไอมีเลือดออก หรือ อาเจียนเป็นเลือด
- ภาวะเลือดออกในสมอง ซึ่งจะมีอาการ ซึม พูดไม่รู้เรื่อง อัมพาต ชัก

**“ให้หยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที”**

**5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์**

- เลือดออกเล็กน้อยบริเวณเหงือกและช่องปาก
- “ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์”**

**6. ควรเก็บยานี้อย่างไร**

- เก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อบอุ่นโดยตรง โดยทั่วไปควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- ยาที่ผสมแล้ว
  - เก็บได้เป็นเวลา 24 ชั่วโมงในตู้เย็นที่อุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส
  - เก็บได้เป็นเวลา 8 ชั่วโมงที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

**7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้**

- **ลักษณะยา** ผงยาปราศจากเชื้อสำหรับละลายในน้ำยาเพื่อฉีด สีขาว บรรจุอยู่ในขวดยาฉีดใสไม่มีสี น้ำยาทำละลายใสไม่มีสี บรรจุในขวดแก้วใสไม่มีสี
- **ตัวยาสำคัญ** แอลทีเพลส 50 มิลลิกรัม
- **ส่วนประกอบอื่น ๆ** ได้แก่ L-arginine (แอล-อาร์จินีน), phosphoric acid (ฟอสฟอริก แอซิด), polysorbate 80 (โพลีซอร์เบต 80)

**ผู้ผลิต** Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG., Biberach an der Riss, Germany

**ผู้นำเข้า** บริษัท เบอริงเกอร์ อินเทลไฮม์ (ไทย) จำกัด กรุงเทพมหานคร

**ผู้แทนจำหน่าย** บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด กรุงเทพมหานคร

**เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ** 27 สิงหาคม 2567

**ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.**

- <http://www.fda.moph.go.th/sites/oss/Pages/Main.aspx>
- <http://ndi.fda.moph.go.th/>

**เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ**  
**หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร**