

ทีเนคทีเพลส ความแรง 25 มิลลิกรัม ผงยาสำหรับทำละลายเพื่อใช้ฉีด Metalyse (เมตาไลส์)

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้มีชื่อว่า ทีเนคทีเพลส (tenecteplase) มีตัวยา 25 มิลลิกรัม เป็นยาในกลุ่มต้านการเกิดลิ่มเลือดอุดตัน

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

ยานี้ใช้เพื่อละลายลิ่มเลือดที่อุดตันในโรคหลอดเลือดสมองอุดตันเฉียบพลัน

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- ⊗ เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้
- ⊗ มีความเสี่ยงสูงในการเกิดภาวะเลือดออก เช่น
 - ⊗ กำลังมีภาวะเลือดออกผิดปกติในเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา หรือ มีโรคที่ทำให้เลือดออกง่ายผิดปกติ
 - ⊗ มีประวัติการเจ็บป่วยของระบบประสาทส่วนกลาง
 - ⊗ เป็นความดันโลหิตสูงรุนแรงที่ควบคุมไม่ได้
 - ⊗ เคยได้รับการνωตหัวใจหรือผายปอดเพื่อกู้ชีพเป็นเวลานานกว่า 2 นาทีภายในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา
- ⊗ เป็นโรคตับชนิดรุนแรง รวมถึง ตับอ่อนอักเสบเฉียบพลัน
- ⊗ กำลังเป็นแผลในกระเพาะอาหาร
- ⊗ เป็นโรคเส้นเลือดแดงโป่งพองและมีเส้นเลือดที่เชื่อมต่อกันอย่างผิดปกติ
- ⊗ เป็นโรคเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบเฉียบพลัน หรือ ติดเชื้อแบคทีเรียที่เยื่อหุ้มหัวใจแบบกึ่งเฉียบพลัน
- ⊗ เป็นโรคหลอดเลือดสมองอุดตันโดยปราศจากความผิดปกติทางระบบประสาท
- ⊗ มีประวัติหรือสงสัยว่ามีเลือดออกในกะโหลกศีรษะรวมไปถึงภาวะเลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมอง
- ⊗ กำลังได้รับยาด้านการแข็งตัวของเลือดชนิดรับประทานที่มีประสิทธิภาพสูง

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

- ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร หากท่านกำลังใช้ยาด้านการแข็งตัวของเลือดชนิดอื่น เพราะอาจทำให้เกิดภาวะเลือดออกรุนแรงได้
- ระวังการรับประทานยานี้ร่วมกับยาลดความดันโลหิตในกลุ่ม เอซีอี อินฮิบิเตอร์ (ACE inhibitors) เพราะอาจทำให้เกิดการแพ้ยาเพิ่มขึ้น

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- **ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น** เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค
- ยานี้ใช้เฉพาะในโรงพยาบาลเท่านั้น โดยแพทย์หรือพยาบาลจะให้ยาโดยการฉีดเข้าทางหลอดเลือดดำ

3.2 ถ้าใช้ยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง เช่น มีเลือดออกผิดปกติ ให้รีบแจ้งแพทย์หรือพยาบาลทราบโดยทันที

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- หากมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับการใช้ยานี้ ให้สอบถามได้จากแพทย์ หรือ เภสัชกร

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

- ลมพิษ บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวน้ำหนักหลุดลอก มีจ้ำตามผิวน้ำหนักหรือเลือดออกผิดปกติ
- ภาวะเลือดออกผิดปกติ เช่น ไอมีเลือดออก หรือ อาเจียนเป็นเลือด
- ภาวะเลือดออกในสมอง ซึ่งจะมีอาการ ซึม พูดไม่รู้เรื่อง อัมพาต ชัก

“ให้หยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที”

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์

- เลือดออกเล็กน้อยบริเวณเหงือกและช่องปาก
- “ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์”**

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อย่าวางให้โดนแสงโดยตรง โดยทั่วไปควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- ยาที่ผสมแล้ว
 - เก็บได้เป็นเวลา 24 ชั่วโมงในตู้เย็นที่อุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส
 - เก็บได้เป็นเวลา 8 ชั่วโมงที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

- **ลักษณะยา** ผงยาปราศจากเชื้อสำหรับละลายในน้ำยาเพื่อใช้ฉีด สีขาวถึงเหลืองอ่อน บรรจุอยู่ในขวดยาฉีดใสไม่มีสี
 - **ตัวยาสำคัญ** ทีเนคทีเพลส 25 มิลลิกรัม
 - **ส่วนประกอบอื่น ๆ** ได้แก่ Arginine (อาร์จินีน), phosphoric acid (ฟอสฟอริก แอซิด), polysorbate 20 (โพลีซอร์เบต 20), Gentamicin (เจนตามัยซิน ซึ่งเป็นสารตกค้างจากขบวนการผลิต)
- ผู้ผลิต** Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG., Biberach an der Riss, Germany
ผู้นำเข้า บริษัท เมอริ่งเกอร์ อินเทลไฮม์ (ไทย) จำกัด กรุงเทพมหานคร
ผู้แทนจำหน่าย บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด กรุงเทพมหานคร
เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ 12 มิถุนายน 2567

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.

- <http://www.fda.moph.go.th/sites/oss/Pages/Main.aspx>
- <http://ndi.fda.moph.go.th/>

**เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร**