

# สเปโซลิแมบ 60 มก./มล. ชนิดหยดเข้าหลอดเลือดดำ ชื่อการค้า สเปนวิโก

## 1. ยานี้คืออะไร

### 1.1 ยานี้มีชื่อสามัญว่าอะไร

ยานี้มีชื่อสามัญว่า สเปนโซลิแมบ (spesolimab)

### 1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

ยานี้ใช้สำหรับการรักษาอาการกำเริบในผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่เป็นโรคสะเก็ดเงินชนิดตุ่มหนอง

## 2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

### 2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้

### 2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

- ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ในกรณีต่อไปนี้
- หลังจากใช้ยานี้หากผู้ป่วยมีอาการหรืออาการแสดงของการติดเชื้อที่สำคัญทางคลินิกหลังการรักษาควรปรึกษาแพทย์
- ในผู้ป่วยวัณโรคแฝงหรือมีประวัติวัณโรคที่ไม่สามารถยืนยันว่าได้รับการรักษาที่เพียงพอได้ ควรพิจารณาการรักษาด้วยยาต้านวัณโรคก่อนเริ่มใช้ยานี้
- หากผู้ป่วยมีอาการของภาวะภูมิแพ้แบบรุนแรงหรือภาวะภูมิไวเกินที่ร้ายแรงอื่นๆ ควรหยุดใช้ยานี้ทันทีและควรเริ่มการรักษาที่เหมาะสม
- ควรมีระยะห่างอย่างน้อย 4 สัปดาห์ ระหว่างการฉีดวัคซีนชนิดที่มีชีวิตและการเริ่มต้นการรักษาด้วยยานี้ และไม่ควรให้วัคซีนที่มีชีวิตเป็นเวลาอย่างน้อย 16 สัปดาห์หลังการรักษาด้วยยานี้
- ระมัดระวังการใช้ยานี้ในสตรีตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร เนื่องจากไม่มีข้อมูลยืนยันความปลอดภัย

## 3. วิธีใช้ยา

### 3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ปริมาณที่แนะนำ คือโดสเดี่ยวขนาด 900 มก. (2 ขวด ขนาดขวดละ 450 มก. / 7.5 มล.)
- แพทย์หรือพยาบาลจะเป็นคนฉีดยาให้ท่าน
- ยานี้ใช้เฉพาะในโรงพยาบาลเท่านั้น โดยแพทย์หรือพยาบาลจะให้ยาโดยการหยดเข้าทางหลอดเลือดดำ

### 3.2 หากลืมมาฉีดยาควรทำอย่างไร

- ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรเมื่อลืมฉีดยานี้

### 3.3 หากสงสัยว่าได้รับยาเกินขนาดที่แนะนำควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรงให้รีบแจ้งแพทย์หรือพยาบาลทราบโดยทันที

## 4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

หากมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับการใช้ยานี้ สอบถามได้จากแพทย์ หรือเภสัชกร

## 5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

### 5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วแจ้งแพทย์ทันที

- การติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ
- การติดเชื้อในทางเดินหายใจส่วนบน
- “หากมีอาการเหล่านี้ ให้แจ้งแพทย์ พยาบาล หรือเภสัชกรทันที”

### 5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้แจ้งแพทย์ทันที

- คันผิวหนัง
- การเกิดผื่นแดง, การบวม, อาการปวด, การแข็งตัว, รู้สึกร้อนผิวหนังลอกเป็นขุย, ตุ่มนูน, อาการคัน, ผื่นและลมพิษบริเวณที่ฉีด
- เหนื่อยล้า

“ให้รอดูอาการ แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้แจ้งแพทย์ พยาบาล หรือเภสัชกร”

## 6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- ยานี้เก็บไว้ที่โรงพยาบาล ท่านจะไม่ได้รับกลับบ้าน
- เก็บยานี้ไว้ในตู้เย็นที่อุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส ห้ามแช่แข็ง
- ยาสามารถเก็บที่อุณหภูมิห้อง (ไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส) ได้ตามสูงสุด 24 ชั่วโมง เมื่อเก็บยาไว้ในภาชนะบรรจุเดิมและไม่โดนแสง
- ควรตรวจสอบขวดยาด้วยสายตาก่อนใช้งาน

## 7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

- ลักษณะยา น้ำยาไม่มีสีถึงน้ำตาลอ่อนออกเหลืองเล็กน้อย ใส่ถึงชุนเล็กน้อย
- ตัวยาสำคัญ สเปนโซลิแมบ (spesolimab)
- ส่วนประกอบอื่นๆ ได้แก่ โซเดียม อะซีเตรท ไตรไฮเดรท, กรดอะซิติค, ซูโครส, อาร์จินีน, ไฮโดรคลอไรด์, โพลีซอร์เบท 20, น้ำบริสุทธิ์สำหรับฉีด
- ผู้ผลิต Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG, Biberach an der Riss, Germany
- ผู้นำเข้า บริษัท เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ (ไทย) จำกัด
- ผู้แทนจำหน่าย บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ เมษายน 2567

### ศึกษาข้อมูลยาเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.

- <http://www.fda.moph.go.th/sites/oss/Pages/Main.aspx>
- <http://ndi.fda.moph.go.th/>

**เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร**