

เมซาลาซีน
ความแรง 500, 1000 มิลลิกรัมและ
ความแรง 1.5, 3 กรัม
ชนิด แกรนูลออกฤทธิ์นาน
แตกตัวในลำไส้
ชื่อการค้า Salofalk (ซาโลฟอล์ค)

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

ยานี้มีชื่อว่าเม-ซา-ลา-ซีน (mesalazine) เป็นยาในกลุ่มต้านการอักเสบที่ใช้รักษาโรคลำไส้อักเสบ

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

ยานี้ใช้สำหรับรักษาลำไส้ใหญ่อักเสบเฉียบพลันระดับเล็กน้อยถึงปานกลางที่มีแผลเปื่อยร่วมด้วย และเพื่อคงระยะสงบของโรคในผู้ใหญ่และเด็กอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไปที่มีน้ำหนักตัวมากกว่า 40 กิโลกรัม

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

X เคยแพ้ยานี้ สารที่เป็นส่วนประกอบของยานี้ หรือยาอื่นในกลุ่มกรดซาลิซิลิก หรือแอสไพริน

X เป็นโรคตับหรือโรคไตชนิดรุนแรง

X ห้ามใช้ยานี้ในเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปีที่มีน้ำหนักตัวน้อยกว่า 40 กิโลกรัม

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ในกรณีที่ท่านมีหรือเคยมีอาการดังต่อไปนี้

- เป็นโรคปอด หรือหอบหืด
- แพ้ยาในกลุ่มซัลฟาซาลาซีน
- มีปัญหาเกี่ยวกับตับ
- มีปัญหาเกี่ยวกับไต
- เป็นโรคฟีนิลคีโตนูเรีย เพราะยามีส่วนผสมของแอสพาร์เทม ที่ก่อให้เกิดสารฟีนิลอะลานีนที่ร่างกายขจัดออกไม่ได้
- เคยเป็นผื่นผิวหนัง หรือผิวหนังหลุดลอกชนิดรุนแรง ตุ่มพอง เจ็บบริเวณปากหลังใช้ยาเมซาลาซีน

- ยานี้อาจทำให้ปัสสาวะเปลี่ยนเป็นสีแดงออกน้ำตาล เพราะเกิดปฏิกิริยากับสารฟอกขาว เช่นโซเดียมไฮโปคลอไรต์ในห้องน้ำ แต่ไม่ก่อให้เกิดอันตราย
- กำลังใช้ยาต้านการแข็งตัวของเลือด เช่น วาร์ฟาริน
- กำลังใช้ยากดภูมิคุ้มกัน เช่น เอซาโทโอพรีน ,6-เมอร์แคปโทพิวรีน ,ไทโอควานีน
- กำลังใช้ยาระบาย หรือรักษาท้องผูก เช่น แล็กทูโลส
- วางแผนจะตั้งท้อง ตั้งท้องหรืออยู่ระหว่างให้นมบุตร

"สอบถามแพทย์ หรือเภสัชกร

ถ้าท่านไม่แน่ใจว่ามีภาวะดังกล่าวหรือไม่"

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- **ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกร** เท่านั้น เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค
- ยานี้ใช้สำหรับกิน ให้วางบนลิ้นพร้อมดื่มน้ำตามมากๆ และห้ามเคี้ยว
- ยานี้เหมาะสำหรับผู้สูงอายุ ผู้ใหญ่และเด็กอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไปที่มีน้ำหนักตัวมากกว่า 40 กิโลกรัม

3.2 หากลืมกินยาควรทำอย่างไร

- ให้รอกินยาครั้งต่อไปตามขนาดยาปกติ และห้ามใช้ยาเพิ่มเป็น 2 เท่า

3.3 ถ้ากินยาเกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง ให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- พบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตามผลการรักษาหรืออันตรายจากยา
- ห้ามหยุดยาเอง และให้กินยานี้อย่างต่อเนื่องตามคำแนะนำของแพทย์ หรือเภสัชกร
- ควรได้รับการตรวจเลือดและปัสสาวะเป็นประจำ
- ควรดื่มน้ำมากๆ ระหว่างใช้ยานี้ เพราะยานี้ อาจทำให้เกิดนิ่วในไต อาการที่พบได้ คือมีเลือดปนในปัสสาวะ และปวดท้อง
- ระมัดระวังการใช้ยานี้ในผู้ขับขี่ยานยนต์หรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกล หรือ ทำงานที่เสี่ยงต่อการพลัดตกจากที่สูง เพราะยังไม่มีข้อมูลการศึกษา

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

- ลมพิษ บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก
 - หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
 - ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก หรือมี้ำตามผิวหนัง
 - ผื่นผิวหนังชนิดรุนแรง มีไข้ เจ็บบริเวณรอบดวงตา ปาก จมูก คอ และอวัยวะเพศ หรือต่อมน้ำเหลืองโต
- "ให้หยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที"**

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์

- ปวดหัว

"ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์"

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อย่าให้โดนแสงโดยตรง โดยทั่วไปควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก
- ห้ามใช้ยาหลังวันหมดอายุที่ระบุไว้

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

- **ลักษณะยา** : ยาแกรนูลสีขาวอมเทา
- **ตัวยาสําคัญ** : เมซาลาซีน
- **ส่วนประกอบอื่น ๆ** ได้แก่ เซลลูโลสไมโครคริสตัลไลน์, ไฮโปรมेलโลส, ซิลิกาคอลลอยด์แอนไฮดริส, โพลีอะครีเลต ดิสเปอร์ชัน 40%, แมกนีเซียมสเตียเรต, โซเมติโคเนอิมัลชัน, กรดเมทาอะคริลิก-เมทิลเมทาครีเลตโคโพลีเมอร์ (1:1), ไตรเอธิลซิเตรต, ทัลก์, ไทเทเนียมไดออกไซด์, โซเดียม คาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส, แอสพาร์เทม, กรดซิทริกแอนไฮดริส, กลีเซอริน, คัสตาร์ด, โพรโตน

ผู้ผลิต : Losan Pharma GmbH, Neuenburg, Germany

ผู้ตรวจปล่อยผ่านยา : Dr. Falk Pharma GmbH, Freiburg im Breisgau, Germany

ผู้นำเข้า : บริษัท เอ. เมนารีนี (ประเทศไทย) จำกัด,
กรุงเทพฯ

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ กุมภาพันธ์ 2567

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.

- <http://www.fda.moph.go.th/sites/oss/Pages/Main.aspx>
- <http://ndi.fda.moph.go.th/>

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร