

เมซาลาซีน 500 มิลลิกรัม ยาเม็ดเคลือบแตกตัวในลำไส้ ชื่อการค้า Salofalk (ซาลอฟอล์ค)

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้มีชื่อว่าเม-ซา-ลา-ซีน (Mesalazine)
- เป็นยาในกลุ่มต้านการอักเสบที่ใช้รักษาโรคลำไส้อักเสบ

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ใช้รักษาโรคลำไส้ใหญ่อักเสบ (ulcerative colitis) ชนิดเฉียบพลันและป้องกันการกลับเป็นซ้ำ
- ใช้รักษาโรคลำไส้เล็กอักเสบเรื้อรัง (crohn 's disease) ชนิดเฉียบพลัน

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- X** เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้ หรือยาอื่นในกลุ่มกรดซาลิซิลิก หรือแอสไพริน
- X** เป็นโรคตับ หรือโรคไต ขั้นรุนแรง

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้ ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ในกรณีที่ท่านมีหรือเคยมีภาวะต่อไปนี้

- เป็นโรคปอด หรือหอบหืด
- แพ้ยาในกลุ่มซัลฟาซาลาซีน
- มีปัญหาเกี่ยวกับตับ
- มีปัญหาเกี่ยวกับไต
- เคยเป็นผื่นผิวหนัง หรือผื่นหลุดลอกชนิดรุนแรง ตุ่มพอง เจ็บบริเวณปากหลังใช้ยาเมซาลาซีน
- ยานี้อาจทำให้ปัสสาวะเปลี่ยนเป็นสีแดงออกน้ำตาล เพราะเกิดปฏิกิริยากับสารฟอกขาว เช่น โซเดียมไฮโปคลอไรต์ในห้องน้ำ แต่ไม่ก่อให้เกิดอันตราย
- กำลังใช้ยาต้านการแข็งตัวของเลือด เช่น วาร์ฟาริน

- กำลังใช้ยากดภูมิคุ้มกัน เช่น เอซาโทโอฟริน, 6-เมอร์แคปโทพิวรีน, ไทโอกวานิน
- วางแผนจะตั้งครรภ์ ตั้งท้องหรืออยู่ระหว่างให้นมบุตร

**“สอบถามแพทย์หรือเภสัชกร
ถ้าท่านไม่แน่ใจว่ามีภาวะดังกล่าวหรือไม่”**

3. วิธีใช้ยา

3.1. ขนาดและวิธีใช้

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์ หรือเภสัชกร เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค
- ควรกินยานี้ก่อนอาหารอย่างน้อย 1 ชั่วโมง
- ควรกลืนยาทั้งเม็ด ห้ามเคี้ยว และดื่มน้ำตามมากๆ

3.2. ถ้าลืมกินยาควรทำอย่างไร

- ให้รอกินยาครั้งต่อไปตามขนาดยาปกติ และห้ามใช้ยาเพิ่มเป็น 2 เท่า

3.3 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรงให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- พบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตามผลการรักษาหรืออันตรายจากยา
- ห้ามหยุดยาเอง และให้กินยาอย่างต่อเนื่องตามคำแนะนำของแพทย์ หรือเภสัชกร
- ควรได้รับการตรวจเลือดและปัสสาวะเป็นประจำ
- ควรดื่มน้ำมากๆ ระหว่างใช้ยานี้ เพราะยานี้อาจทำให้เกิดนิ่วในไต อาการที่อาจพบได้ คือมีเลือดปนในปัสสาวะ และปวดท้อง
- ระมัดระวังการใช้ยานี้ในผู้ที่ต้องจำกัดโซเดียม

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยา แล้วต้องรีบไปพบแพทย์ทันที

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผื่นหนังหลุดลอก มีจ้ำตามผิวหนัง
- ผื่นผิวหนังชนิดรุนแรง มีไข้ เจ็บบริเวณรอบดวงตา ปาก จมูก คอ และอวัยวะเพศ หรือต่อมน้ำเหลืองโต
- มีอาการปวดภายในช่องท้องและมีเลือดปนในปัสสาวะ (จากภาวะนิ่วในไต)

“ให้หยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที”

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์

- ปวดหัว
- ผื่น มีอาการคัน

**“ไม่จำเป็นต้องหยุดยา
แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์”**

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บไว้ในภาชนะบรรจุเดิมตามที่ได้รับมา
- ควรแกะยาเมื่อกินในแต่ละครั้งเท่านั้น ห้ามแกะยาออกจากแผงก่อน เพราะยาอาจเสียได้
- เก็บยาในที่แห้ง ควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส และไม่เก็บยาในช่องแช่แข็ง ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องนำห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก
- ห้ามใช้ยาหลังวันหมดอายุที่ระบุไว้

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

- **ลักษณะของยา :** เม็ดรูปรี นูน เคลือบฟิล์มสี เหลืองออกส้มถึงสีน้ำตาล เรียบทั้งสองด้าน
- **ตัวยาสําคัญ :** เมซาลาซีน
- **ส่วนประกอบอื่นๆ :** ใต้แก๊ว แคลเซียมสเตียเรท, เซลลูโลสไมโครคริสตัลไลน์, ครอสคาร์เมลโลส โขติยม, เบสึคบิวทิลเลทเมทาคริเลทโคพอลิเมอร์ (ยูตราจีที), เมทาคริลิกแอซิด-เมทิลเมทาคริเลทโคโพลิเมอร์ (1:1) (ยูตราจีทแอล), ไกลซีน, ซิลิกาคอลลอยด์ลแอนไฮดรัส, ไฮโปรเมลโลส, มาโครกอล 6000, โขติยมคาร์บอนเนต, โพรโตนเค25, ทัลก์, สี: ไททาเนียมไดออกไซด์ (อี171), ไโอออนออกไซด์ (อี172)

ผู้ผลิต : Losan Pharma GmbH, Neuenburg, Germany

ผู้แบ่งบรรจุปฐุมภูมิและทุติยภูมิ : Losan Pharma GmbH, Eschbach, Germany

ผู้ตรวจปล่อยหรือผ่านยาเพื่อจำหน่าย : Dr. Falk Pharma GmbH, Freiburg im Breisgau, Germany

ผู้นำเข้า : บริษัท เอ.เมนารินี (ประเทศไทย) จำกัด
กรุงเทพมหานคร
เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ **10 กรกฎาคม 2567**

ศึกษาข้อมูลยาเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.

- <http://www.fda.moph.go.th/sites/oss/Pages/Main.aspx>
- <http://ndi.fda.moph.go.th/>

**เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร**