

เมซาลาซีน
ความแรง 500 มิลลิกรัม
ชนิดยาเหน็บทวาร
ชื่อการค้า Salofalk® 500
(suppositories)
(ซาลอฟอล์ค 500 ยาเหน็บทวาร)

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้มีชื่อว่าเม-ซา-ลา-ซีน (mesalazine) เป็นยาในกลุ่มต้านการอักเสบที่ใช้รักษาโรคลำไส้อักเสบ

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ยานี้ใช้รักษาอาการเฉียบพลันของโรคลำไส้อักเสบบริเวณทวารหนักหรือโรคลำไส้ใหญ่อักเสบที่มีแผลเปื่อยร่วมด้วย

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- X** เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้ หรือยาอื่นในกลุ่มกรดซาลิซิลิก หรือแอสไพริน
- X** แพ้สารที่เป็นส่วนประกอบของยานี้ เช่น
 - เซทิลแอลกอฮอล์ที่อาจก่อความระคายเคืองที่ผิวหนัง
- X** เป็นโรคตับหรือโรคไตชนิดรุนแรง
- X** ห้ามใช้ยานี้ในเด็ก เพราะยังมีข้อมูลจำกัด

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ในกรณีที่ท่านมีหรือเคยมีภาวะดังต่อไปนี้

- เป็นโรคปอด หรือหอบหืด
- แพ้ยาในกลุ่มซัลฟาซาลาซีน
- มีปัญหาเกี่ยวกับตับ
- มีปัญหาเกี่ยวกับไต
- เคยเป็นผื่นผิวหนัง หรือผิวหนังหลุดลอกชนิดรุนแรง ตุ่มพอง เจ็บบริเวณปากหลังใช้ยาเมซาลาซีน
- ยานี้อาจทำให้ปัสสาวะเปลี่ยนเป็นสีแดงออกน้ำตาล เพราะเกิดปฏิกิริยากับสารฟอกขาว เช่นโซเดียมไฮโปคลอไรต์ในห้องน้ำ แต่ไม่เป็นอันตราย
- กำลังใช้ยาต้านการแข็งตัวของเลือด เช่น วาร์ฟาริน

- กำลังใช้ยากดภูมิคุ้มกัน เช่น เอซาโทโอพรีน 6-เมอร์แคปโทพิวรีน ไทโอกวานีน
- วางแผนจะตั้งครรภ์ ตั้งท้องหรืออยู่ระหว่างให้นมบุตร
**“สอบถามแพทย์ หรือเภสัชกร
ถ้าท่านไม่แน่ใจว่ามีภาวะดังกล่าวหรือไม่”**

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค
- ยานี้ใช้เหน็บทวารหนักเท่านั้น ห้ามกินหรือกลืน

3.2 หากลืมใช้ยาเหน็บทวารควรทำอย่างไร

- ให้รอเหน็บทวารครั้งต่อไปตามขนาดยาปกติ และห้ามเพิ่มขนาดยาเป็น 2 เท่าเพื่อทดแทนครั้งที่ลืมใช้ยาไป

3.3 ถ้าใช้ยาเหน็บทวารนี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง ให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- พบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตามผลการรักษาหรืออันตรายจากยา
- ห้ามหยุดยาเอง และให้ใช้ยานี้อย่างต่อเนื่องตามคำแนะนำของแพทย์ หรือเภสัชกร
- หลีกเลี่ยงการอยู่กลางแจ้งแดดโดยตรง
- ควรได้รับการตรวจเลือดและปัสสาวะเป็นประจำ
- ควรดื่มน้ำมากๆ ระหว่างใช้ยานี้ เพราะยานี้อาจทำให้เกิดนิ่วในไต อาการที่อาจพบได้คือมีเลือดปนในปัสสาวะ และปวดท้อง

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

- ลมพิษ บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีจุดตามผิวหนัง

- ผื่นผิวหนังชนิดรุนแรง มีไข้ เจ็บบริเวณรอบดวงตา ปาก จมูก คอ และอวัยวะเพศ หรือตอมน้ำเหลืองโต
- เจ็บหน้าอก หัวใจเต้นผิดจังหวะ แขนขาบวม
- ปัสสาวะเปลี่ยนสี ปวดท้องที่มีสาเหตุจากนิ่วในไต
“ให้หยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที”

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์

- ผื่น มีอาการคัน

**“ไม่จำเป็นต้องหยุดยา
แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์”**

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง ออxygenให้โดนแสงโดยตรง โดยทั่วไปควรเก็บที่อุณหภูมิห้องไม่เกิน 25 องศาเซลเซียส ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำห้องครัว
- ห้ามใช้ยาหลังวันหมดอายุที่ระบุไว้
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

- ลักษณะยา :** ยาเหน็บสอดทวาร รูปดอว์บีโด สีขาวจนถึงน้ำตาลอ่อนหรือเทาอ่อน
- ตัวยาสำคัญ :** เมซาลาซีน
- ส่วนประกอบอื่น ๆ ได้แก่ :** ฮาร์ดเฟต ด็อกคิวสเตโซเดียม เซทิลแอลกอฮอล์

ผู้ผลิต : Corden Pharma Fribourg AG, Zweigniederlassung Ettingen, Ettingen, Switzerland

ผู้ตรวจปล่อยหรือผ่านยาเพื่อจำหน่าย : Dr. Falk Pharma GmbH, Freiburg im Breisgau, Germany

ผู้นำเข้า : บริษัท เอ. เมนารีนี (ประเทศไทย) จำกัด, กรุงเทพมหานคร

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ กรกฎาคม 2567

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ **อย.**

- http://www.fda.moph.go.th/sites/oss/Pages/Main.aspx
- http://ndi.fda.moph.go.th/

**เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร**