

ไฮดราลาซีน
ความแรง 50 มิลลิกรัม
ชนิดเม็ดเคลือบฟิล์ม
ชื่อการค้า HYDRALAZINE FC 50
(ไฮดราลาซีน เอฟซี 50)

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้ชื่อว่า ไฮดราลาซีนไฮโดรคลอไรด์ (hydralazine hydrochloride) เป็นยาในกลุ่มลดความดันโลหิตสูง

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ใช้สำหรับรักษาความดันโลหิตสูงระดับปานกลางถึงรุนแรง โดยใช้เสริมยาลดความดันอื่น

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้หรือส่วนประกอบของยานี้
- ผู้ที่มีอาการหัวใจเต้นเร็วผิดปกติ
- ผู้มีภาวะกล้ามเนื้อหัวใจทำงานได้ไม่เต็มที่
- ผู้ที่เป็นโรคหลอดเลือดแดงใหญ่โป่งพอง
- ผู้ที่เป็นโรคแพ้ภูมิตัวเอง (เอสแอลอี) และความผิดปกติที่เกี่ยวข้อง
- ผู้มีภาวะหัวใจโตจากโรคปอด ผู้ป่วยโรคพอร์ไฟเรีย

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

- ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ในกรณีต่อไปนี้
 - ผู้ป่วยโรคตับ
 - ผู้ป่วยโรคไต
 - ผู้ที่ต้องเข้ารับการผ่าตัด
- ควรระมัดระวังการใช้ยานี้ในผู้ที่เป็นโรคหลอดเลือดหัวใจหรือโรคหลอดเลือดสมอง
- หญิงที่ตั้งครรภ์หรือสงสัยการตั้งครรภ์ในการตั้งท้องเดือนที่

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค

3.2 หากลืมกินยาควรทำอย่างไร

- กินยาทันทีที่นึกขึ้นได้ แต่ถ้าใกล้เวลาของมื้อต่อไป ให้รอกินยาของมื้อต่อไป ห้ามกินยาเพิ่มเป็น 2 เท่า

3.3 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง (เช่น หัวใจเต้นเร็ว ปวดศีรษะ ผิวแดงทั้งตัว) ให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- หลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
- ระมัดระวังการขับขี่ยานยนต์ หรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกล
- ห้ามหยุดยาเอง และให้กินยาอย่างต่อเนื่อง ตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกร
- พบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตามผลการรักษาหรืออันตรายจากยา

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

- ลมพิษ บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก หรือจ้ำตามผิวน้ำ
- หัวใจเต้นเร็ว เจ็บหน้าอก มือบวม ขาบวม

“ให้หยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที”

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา

แต่ถ้ามีอาการรุนแรง ให้ไปพบแพทย์

- ปวดศีรษะ เวียนศีรษะ

“ไม่จำเป็นต้องหยุดยา

แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์”

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อบอุ่นโดยตรง โดยทั่วไปควรเก็บที่อุณหภูมิต่ำกว่า 30 องศาเซลเซียส ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยา

- ลักษณะยา** เม็ดกลมมนทั้งสองด้าน เคลือบฟิล์มสีชมพู
 - ตัวยาสําคัญ** ไฮดราลาซีนไฮโดรคลอไรด์
 - ส่วนประกอบอื่นๆ** ได้แก่ ผงแมนนิทอล แป้งข้าวโพด โพรพิโดน เอทิลเทตโตโซเดียม คอลลอยด์คอลลีคอลลินไดออกไซด์ แมกนีเซียมสเตียเรต ไฮโปรมेलโลส ไทเทเนียมไดออกไซด์ โพลีเอทิลีนไกลคอล และอีริทโรซินเลด
 - ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย** บริษัท ที.โอ.ฟาร์มา จำกัด 101 ซอยลาดพร้าว 124 (สวัสดิการ) ถนนลาดพร้าว แขวง พลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 ประเทศไทย
- เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ 5 กรกฎาคม 2567**

ศึกษาข้อมูลยาเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.

<http://www.fda.moph.go.th/sites/oss/PAGes/Main.aspx>

<http://ndi.fda.moph.go.th>

**เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร**