

**ไซโลเมตาโซลีนไฮโดรคลอไรด์**  
**ความแรง 0.5, 1 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร**  
**ชนิดน้ำยาสำหรับพ่นจมูก**  
**ชื่อการค้า DENOX SPRAY**  
**(เด็นออก ชนิดพ่น)**

## 1. ยานี้คือยาอะไร

### 1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้มีชื่อว่าไซโลเมตาโซลีนไฮโดรคลอไรด์ (xylometazoline hydrochloride) มีความแรง 0.5, 1 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร เป็นยาในกลุ่มยาแก้คัดจมูกที่ทำให้เล้นเลือดหัดตัวเฉพาะที่

### 1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

ยานี้ใช้เพื่อ

- บรรเทาอาการคัดจมูกเนื่องจากหวัด แพ้อากาศ (ไข้ล้างของฟาง) หรือปฏิกิริยาภูมิแพ้ของเยื่อบุผิวในจมูกและอาการคัดจมูกจากไข้หนัก
- ช่วยในการระบายน้ำมูกจากช่องโพรงอากาศในรายที่เป็นไข้หนัก
- ช่วยลดอาการบวมของเยื่อเมือกบริเวณจมูกและคอในรายที่หูชั้นกลางอักเสบ
- ช่วยในการตรวจโพรงจมูก

## 2. ข้อควรรู้ก่อนใช้ยา

### 2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยาani หรือส่วนประกอบของยาani
- ผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดโดยผ่านทางกระดูกสันหลัง หรือการผ่าตัดที่ทำให้เยื่อหุ้มสมองเปิดออก
- ห้ามใช้ในผู้ที่เป็นไข้หนักมาก
- ห้ามใช้ในผู้ที่เป็นเยื่อจมูกฝ่อแห้ง หรือเยื่อจมูกอักเสบฟ่อ
- ห้ามใช้ในผู้ที่เป็นโรคต่อมลูกหมากโต
- ห้ามใช้ในผู้ป่วยที่เป็นเนื้องอกที่ต่อมน้ำเหลือง

- ห้ามใช้ในผู้ป่วยที่รักษาด้วยยาแก้กลุ่มที่ออกฤทธิ์ยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ monoamine oxidase หรือผู้ที่เคยได้รับยาaniมาแล้วไม่เกิน 2 สัปดาห์

### 2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

- ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ในกรณีต่อไปนี้
  - ผู้ที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคต่อมไทรอยด์เป็นพิษ และโรคเบาหวาน
  - ผู้ป่วยที่มีปฏิกิริยาอย่างรุนแรงต่ออะดรีโนร์จิก
- ไม่ควรใช้ต่อเนื่องนานกว่า 7 วัน การใช้เป็นเวลามากเกินไป อาจทำให้เกิดการกลับมาแน่นจมูกอีกครั้งแล้ว/หรือเกิดเยื่อบุจมูกฝ่อ
- ไม่ควรใช้ยาaniร่วมกับยา อาหาร สมุนไพร หรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบางชนิด เพราะอาจมีผลต่อการรักษาหรือเกิดอันตรายได้ เช่น ยาแก้กลุ่มที่ออกฤทธิ์ยับยั้งการทำงานของเอนไซม์โมโนเอมีนออกซิเดสยาต้านอาการซึมเศร้าชนิด Tri- และ tetra-cyclic

## 3. วิธีใช้ยา

### 3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือ เภสัชกร เท่านั้น เพาะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยาani ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค

#### - DENOX 0.05% SPRAY (เด็นออก 0.05% ชนิดพ่น)

เด็กอายุ 1-5 ปี: พ่นเข้ารูจมูก ข้างละ 1 ครั้ง วันละ 1-2 ครั้ง (ทุก 8-10 ชั่วโมง)

เด็กอายุ 6-11 ปี: พ่นเข้ารูจมูก ข้างละ 1-2 ครั้ง วันละ 2-3 ครั้ง

#### - DENOX 0.1% SPRAY (เด็นออก 0.1% ชนิดพ่น)

สำหรับผู้ใหญ่และวัยรุ่นอายุมากกว่า 12 ปี: พ่นเข้ารูจมูกข้างละ 1 ครั้งตามต้องการ โดยไม่เกินวันละ 3 ครั้ง

- ห้ามพ่นยามากกว่า 3 ครั้งต่อวัน

#### • วิธีการใช้ยา

- ห้ามดัดปลายหัวฉีด เตรียมหัวฉีดให้พร้อมก่อนใช้
- ทำความสะอาดโพรงจมูกผู้ป่วย
- เปิดฝาหัวฉีดออก

- ก่อนการใช้ครั้งแรกให้เตรียมหัวฉีดโดยการสเปรย์ทิ้ง 4 ครั้ง หลังจากนั้นหัวฉีดจะพร้อมใช้ได้ตลอดช่วงการรักษา หากหัวฉีดไม่ดีดตัวระหว่างการกด หรือยาไม่ถูกใช้นานมากกว่า 7 วัน ให้เตรียมหัวฉีดใหม่ โดยการสเปรย์ทิ้ง 4 ครั้ง ใช้ความระมัดระวังอย่างพิเศษหากหัวฉีดไม่ดีดตัว
- ถือขวดยาตั้งขึ้น โดยเอาแกนขวดวางไว้บนนิ้วหัวแม่มือและให้หัวฉีดอยู่ระหว่างนิ้วมืออีก 2 นิ้ว
- ถอนศรีษะของผู้ป่วยไปทางด้านหน้าเล็กน้อย สอดจุกขวดยาเข้าไปในรูจมูก พ่นน้ำยาแล้วค่อยๆ ให้ผู้ป่วยหายใจเข้าทางจมูกในเวลาเดียวๆ กัน
- ทำข้างกับจมูกอีกข้าง
- ทำความสะอาดและเช็ดหัวฉีดให้แห้งก่อนปิดขวดหลังการใช้ยา
- เพื่อหลีกเลี่ยงการติดเชื้อ ไม่ควรใช้ยาร่วมกับผู้อื่น

## 3.2 ถ้าพ่นยาaniเกินขนาดที่แนะนำ ควร怎么办

- อาจทำให้เกิดอาการเรื้อรังศรีษะอย่างรุนแรง เหื่องอก อุณหภูมิร่างกายต่ำลงอย่างมาก ปวดศรีษะ หัวใจเต้นช้า ความดันโลหิตสูง กดการหายใจ หมดสติไม่รู้สึกตัว และชักได้ อาจมีความดันโลหิตต่ำ หลังจากที่มีความดันโลหิตสูง
- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง ให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที

## 4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรหากใช้ยาแล้วอาการไม่ดีขึ้นหรืออาการแย่ลง

## 5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

### 5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วไปพบแพทย์ทันที

- ลมพิษ บวมที่ใบหน้า เปลือกดตา ริมฝีปาก
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอกร หายใจลำบาก
- พื่นแดง ตุ่มพอง ผิวนั้นหลุดลอก มีจ้ำดามผิวนั้นหรือเลือดออกผิดปกติ

“ให้หยุดยาแล้วไปพบแพทย์ทันที”

## 5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์ทันที

- ปวดศีรษะ จมูกแห้งหรือรู้สึกไม่สบายในรูจมูกคลื่นไส้ และร้อนบริเวณที่พ่นยา  
**“ไม่จำเป็นต้องหยดยา**  
**แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์”**

**ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.**

- <http://ndi.fda.moph.go.th>

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ  
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

## 6. ควรเก็บยาอย่างไร

- เก็บไว้ในภาชนะบรรจุเดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อย่าให้โดนแสงโดยตรง โดยหัวไป  
ควรเก็บที่อุณหภูมิห้องไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส ไม่  
เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

## 7. ลักษณะและส่วนประกอบของยา

- ลักษณะของยา สารละลายใส ไม่มีสี สำหรับพ่น
- ตัวยาสำคัญ ไซโลเมตาโซซีลินไฮโดรคลอไรด์ (xylometazoline hydrochloride)
- ส่วนประกอบอื่น ๆ ได้แก่ โซเดียมฟอฟเฟตไดเบสิกแอนไฮดรัส (sodium phosphate dibasic anhydrous), โซเดียมฟอฟเฟตโมโนเบสิกโมโนไฮเดรต (sodium phosphate monobasic monohydrate), ไดโซเดียมอีดีทีเอ (disodium EDTA), โซเดียมคลอไรด์ (sodium chloride), สารละลายซอร์บิทอล 70% (70% sorbitol solution), ไฮป์โรเมลโลส (Hypromellose), เบนชาลโคเนียมคลอไรด์ (benzalkonium chloride), เพียวริฟายวอเตอร์ (purified water)

ผู้ผลิตและผู้แทนจำหน่าย

บริษัท มิลลิเมด จำกัด  
193 หมู่ที่ 1 ถนนสุขสวัสดิ์  
ตำบลปากคลองบางปลากด  
อำเภอพระสมุทรเจดีย์  
จังหวัดสมุทรปราการ 10290  
Call center 0 2461 1027