

อะโทรปีนซัลเฟต
ความแรง 0.1 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร
ยาหยอดตา
ชื่อการค้า TROPIN 0.01%
(โทรปีน 0.01%)

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้มีชื่อว่า อะโทรปีนซัลเฟต (atropine sulfate) เป็นยาในกลุ่มต้านโคลิเนอร์จิก

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ใช้สำหรับชะลอการเพิ่มขึ้นของสายตาสั้นในเด็กอายุ 4 ถึง 14 ปี

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้
- ผู้ป่วยที่รู้หรือสงสัยว่าเป็นต้อหินมุมปิด หรือผู้ที่มีความเสี่ยงที่จะเป็นต้อหิน

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

- ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ในกรณีต่อไปนี้
 - กระจกตาโป่ง
 - ม่านต้ายึดติด
 - เด็กอายุต่ำกว่า 4 ปี
 - กำลังตั้งครรภ์หรือให้นมลูก หรือวางแผนจะตั้งครรภ์
 - ผู้สูงอายุ
 - ไม่ควรใช้ยานี้ร่วมกับยาบางชนิด เพราะอาจมีผลต่อการรักษาหรือเกิดอันตรายได้ ยกเว้นแพทย์สั่ง
- "หากมีกรณีเหล่านี้ควรปรึกษาแพทย์"**

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค

ก่อนหยอดตา


- ล้างมือให้สะอาดก่อนใช้ยาหยอดตา
- ตรวจสอบสภาพยาก่อนใช้
 - อย่าใช้ยานี้ถ้าภาชนะบรรจุอยู่ในสภาพไม่สมบูรณ์
 - อย่าใช้ยานี้ถ้ามีน้ำยาขุ่น หรือขุ่น
- ถอดคอนแทคเลนส์ก่อนหยอดตา หลังจากหยอดตาแล้ว รออย่างน้อย 15 นาที ก่อนใส่คอนแทคเลนส์อีกครั้ง

ขณะหยอดตา



- นอนหงายหรือนั่งงอหน้าขึ้น
- ใช้มือข้างที่ถนัดถือหลอดยา และใช้นิ้วของมืออีกข้างดึงเปลือกตาล่างลงมาให้เป็นกระพุ้ง และเหลือบตาขึ้นด้านบน
- หยอดตา 1 หยดลงในกระพุ้งตา ระวังอย่าให้ปลายหลอดสัมผัสกับดวงตาหรือเปลือกตา

หลังหยอดตา



- ให้กดหัวตานาน 2 นาที หลังจากหยอดตา เพื่อลดผลข้างเคียงของยาต่อร่างกาย
- หากจะต้องหยอดยามากกว่า 1 ครั้ง ควรเว้นระยะห่างอย่างน้อย 5 นาทีก่อนหยอดในครั้งถัดไป และใช้ยาซ้ำฝั่งซ้ายตาเป็นลำดับสุดท้าย

- ปิดฝาให้สนิทเมื่อไม่ใช้งาน
- หากยาล้นออกมาจากตา หกเลอะโดนผิวหนังหรือเข้าปากให้ล้างออกทันที

3.2 หากลืมหยอดยาควรทำอย่างไร

- ให้หยอดยาทันทีที่นึกขึ้นได้ แต่หากใกล้กับเวลาหยอดครั้งถัดไป ให้รอหยอดครั้งถัดไป ห้ามหยอดยาเพิ่มเป็น 2 เท่า

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

3.3 ถ้าหยอดยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง เช่น ปากแห้งหรือแสบ กลืนหรือพูดลำบาก ผิวหนังร้อนและแห้ง ปัสสาวะลำบาก ให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- พบแพทย์ตามนัดทุกครั้งเพื่อติดตามผลการรักษาหรืออันตรายจากยา
- ห้ามหยุดยาเอง และให้หยอดยาน้อยอย่างต่อเนื่องตามคำแนะนำของแพทย์ หรือเภสัชกร
- ควรหลีกเลี่ยงการขับขี่ยานยนต์ หรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกล เพราะยานี้อาจทำให้มองเห็นภาพไม่ชัด

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

- ลมพิษ บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก หรือมีจ้ำตามผิวหนัง
- ตัวร้อนแดง ผิวหนังแห้ง ซีพจรเต้นเร็วและผิดปกติ มีไข้ มีความผิดปกติทางจิต โรครจิต ระบบประสาทและกล้ามเนื้อทำงานไม่ประสานกัน

"ให้หยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที"

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์

- มองภาพไม่ชัด
- ระคายเคืองตา เจ็บตา ตาบวม ตาแดง คันตา
- ตาแพ้แสง
- ปวดหัว
- อ่อนเพลีย

"ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์"

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อย่าให้โดนแสงโดยตรง โดยทั่วไป ควรเก็บที่อุณหภูมิห้องไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- ห้ามแช่เย็น
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

- **ลักษณะยา** นี้ายาปราศจากเชื้อ ใสไม่มีสี
- **ตัวยาสำคัญ** อะโทรปีนซัลเฟต (atropine sulfate)
- **ส่วนประกอบอื่น ๆ** ได้แก่ โซเดียมคลอไรด์, บอริกแอซิด, ไฮโปรมेलโลส, ไฮโดรคลอริกแอซิด, โซเดียมไฮดรอกไซด์, น้ำสำหรับฉีด

ผู้ผลิตและผู้แทนจำหน่าย

บริษัท มิลลิเมด บีเอฟเอส จำกัด
174, 179 หมู่ที่ 8 ตำบลผางาม อำเภอเวียงชัย
จังหวัดเชียงราย 57210 Call center 0 2945 9555

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ 2 ตุลาคม 2567

ศึกษาข้อมูลยาเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.

- <http://ndi.fda.moph.go.th/>

คำเตือนตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข

1. ผู้สูงอายุหรือเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี ควรใช้ตามแพทย์สั่ง
2. ห้ามใช้ในโรคต้อหิน (Glaucoma)
3. หากเกิดอาการชีพจรเต้นเร็ว มึนงง หรือสายตาดำพร่า ให้หยุดใช้ยา