

เดตราเคน ไฮโดรคลอไรด์
ความแรง 5 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร
ยาหยอดตา
ชื่อการค้า TETRACAIN 0.5%
(เดตราเคน 0.5%)

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้มีชื่อว่า เดตราเคน ไฮโดรคลอไรด์ (tetracaine hydrochloride)

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- เป็นยาชาเฉพาะที่สำหรับใช้กับตา

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

- ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ในกรณีต่อไปนี้
 - การใช้ยาเป็นเวลานานหรือใช้ยาในทางที่ผิดอาจนำไปสู่พิษต่อเนื้อเยื่อผิวหนังชั้นนอกของกระจกตาและอาจปรากฏเป็นแผลที่ผิวกระจกตา ซึ่งอาจนำไปสู่ความเสียหายที่กระจกตาอย่างถาวร
 - หลีกเลี่ยงห้องหรือให้หมากลูกระมัดระวังการใช้ยานี้
 - ไม่ควรใช้ยานี้ร่วมกับยาบางชนิด เพราะอาจมีผลต่อการรักษาหรือเกิดอันตรายได้ เช่น ยากลุ่มซัลโฟนาไมด์ ยาต้านเชื้อแบคทีเรีย ยารักษาเบาหวานบางชนิด
 - ทารกที่คลอดก่อนกำหนด
- “หากมีกรณีเหล่านี้ควรปรึกษาแพทย์”**

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

ก่อนหยอดตา


- ล้างมือให้สะอาดก่อนใช้ยาหยอดตา
- ตรวจสอบสภาพยาก่อนใช้
 - อย่าใช้ยานี้ถ้าภาชนะบรรจุอยู่ในสภาพไม่สมบูรณ์
 - อย่าใช้ยานี้ถ้ามีน้ำยา มีสี หรือขุ่น
- ถอดคอนแทคเลนส์ก่อนหยอดตา

ขณะหยอดตา



- นอนหงายหรือนั่งงอเข่าขึ้น
- ใช้มือข้างที่ถนัดถือหลอดยา และใช้นิ้วของมืออีกข้างดึงเปลือกตาล่างลงมาให้เป็นกระพุ้ง และเหลือบตาขึ้นด้านบน
- หยอดยา 1 หยดลงในกระพุ้งตา ระวังไม่ให้ปลายหลอดสัมผัสกับดวงตาหรือสิ่งอื่น

หลังหยอดตา



- ให้กดหัวตานาน 2 นาที หลังจากหยอดตา เพื่อลดผลข้างเคียงของยาต่อร่างกาย
- หากจะต้องหยอดยามากกว่า 1 ครั้ง ควรเว้นระยะห่างอย่างน้อย 5 นาที ก่อนหยอดในครั้งถัดไป

- ไม่ควรสัมผัสบริเวณดวงตาประมาณ 10-20 นาที หลังจากหยอดตาหรือจนกว่าอาการชาจะหมดไป

3.2 ถ้าหยอดยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ถ้ามีอาการผิดปกติที่รุนแรงให้แจ้งแพทย์หรือพยาบาลทันที

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- ถอดคอนแทคเลนส์ก่อนใช้ยาหยอดตา และรอจนกว่าอาการชาจะหมดไปก่อนใส่คอนแทคเลนส์อีกครั้ง
- ระวังอย่าให้ปลายหลอดหรือบริเวณรอบ ๆ สัมผัสกับเปลือกตา

- ปิดฝาให้สนิทเมื่อไม่ใช้งาน
- ระมัดระวังการขี้นยานยนต์ หรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกล หรือทำงานที่เสี่ยงต่อการพลัดตกจากที่สูง

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องแจ้งแพทย์ เภสัชกร หรือพยาบาล

- ลมพิษ บวมที่ใบหน้า เปลือกตาริมฝีปาก
 - หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
 - ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก หรือมีจ้ำตามผิวหนัง
- “ให้แจ้งแพทย์ พยาบาล หรือเภสัชกรทันที”**

5.2 อาการที่อาจเกิดขึ้นได้และให้รอดูอาการ แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้แจ้งแพทย์ เภสัชกร หรือพยาบาล

- เจ็บตา แสบตา ตาแดง ระคายเคืองตา ปวดตา รู้สึกไม่สบายตา มองภาพไม่ชัด

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- ยานี้เก็บไว้ที่โรงพยาบาล ท่านจะไม่ได้รับกลับมา
- สามารถใช้ได้ 24 ชั่วโมง หลังจากเปิดใช้

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

- **ลักษณะยา** น้ำยาปราศจากเชื้อใส ไม่มีสีถึงสีเหลืองอ่อน สำหรับหยอดตา
- **ตัวยาสำคัญ** เดตราเคน ไฮโดรคลอไรด์ (tetracaine hydrochloride)
- **ส่วนประกอบอื่น ๆ** ได้แก่ โซเดียมคลอไรด์, กรดไฮโดรคลอริก, น้ำสำหรับยาฉีด

ผู้ผลิตและผู้แทนจำหน่าย
บริษัท มิลลิเมต บีเอฟเอส จำกัด
174, 179 หมู่ที่ 8 ตำบลผางาม อำเภอเวียงชัย
จังหวัดเชียงราย 57210 Call center 0 2945 9555

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ 25 มีนาคม 2567

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.

- <http://ndi.fda.moph.go.th/>