

อะโทรปีนซัลเฟต
ความแรง 10 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร
ยาหยอดตา
ชื่อการค้า TROPIN 1% (โทรปีน 1%)

1. ยานี้คือยาอะไร

- 1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร**
- ยานี้มีชื่อว่า อะโทรปีนซัลเฟต (atropine sulfate) เป็นยาในกลุ่มต้านโคลิเนอร์จิก
- 1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร**
- เพื่อขยายม่านตาก่อนการตรวจตาหรือในรายที่มีการอักเสบของม่านตาและยูเวีย (uvea tract)

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา


- 2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร**
- เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้
 - ผู้ป่วยที่รู้หรือสงสัยว่าเป็นต่อหินมุมปิด หรือผู้ที่มึนแวมโน้มที่จะเป็นต่อหิน
- 2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้**
- ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ในกรณีต่อไปนี้
 - เด็ก
 - ผู้สูงอายุ
 - ผู้ป่วยความดันลูกตาสสูง
 - หญิงตั้งครรภ์ ให้นมลูก หรือวางแผนจะตั้งท้อง
 - ไม่ควรใช้ยานี้ร่วมกับยาบางชนิด เพราะอาจมีผลต่อการรักษาหรือเกิดอันตรายได้ ยกเว้นแพทย์สั่ง
- "หากมีกรณีเหล่านี้ควรปรึกษาแพทย์"**

3. วิธีใช้ยา

- 3.1 ขนาดและวิธีใช้**
- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค

- ก่อนหยอดตา**
- ล้างมือให้สะอาดก่อนใช้ยาหยอดตา
 - ตรวจสอบสภาพยาก่อนใช้
 - อย่าใช้ยานี้ถ้าภาชนะบรรจุอยู่ในสภาพไม่สมบูรณ์
 - อย่าใช้ยานี้ถ้ามีน้ำยา มีสี หรือขุ่น
 - ถอดคอนแทคเลนส์ก่อนหยอดตา หลังจากหยอดตาแล้ว รออย่างน้อย 15 นาที ก่อนใส่คอนแทคเลนส์อีกครั้ง

ขณะหยอดตา



- นอนหงายหรือนั่งเงยหน้าขึ้น
- ใช้มือข้างที่ถนัดถือหลอดยา และใช้นิ้วของมืออีกข้างดึงเปลือกตาล่างลงมาให้เป็นกระพุ้ง และเหลือบตาขึ้นด้านบน
- หยอดยา 1 หยดลงในกระพุ้งตา ระวังอย่าให้ปลายหลอดสัมผัสกับดวงตาหรือเปลือกตา

หลังหยอดตา



- ให้กดหัวตานาน 2 นาที หลังจากหยอดตา เพื่อลดผลข้างเคียงของยาต่อร่างกาย
- หากจะต้องหยอดยามากกว่า 1 ครั้ง ควรเว้นระยะห่างอย่างน้อย 5 นาทีก่อนหยอดในครั้งถัดไป และใช้ยาซีฟิ่งป้ายตาเป็นลำดับสุดท้าย

- ปิดฝาให้สนิทเมื่อไม่ใช้งาน
- หากยาลิ้นออกมาจากตา หกและโดนผิวหนังหรือเข้าปากให้ล้างออกทันที

3.2 หากลืมหยอดยาควรทำอย่างไร

- ห้ามหยอดยาเพิ่มเป็น 2 เท่า ให้รอหยอดยาของครั้งถัดไปตามปกติ

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

3.3 ถ้าหยอดยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง เช่น ชีพจรเต้นเร็วและไม่เป็นจังหวะ สับสน กระสับกระส่าย ชักหรือประสาทหลอน ให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- ป้องกันสายตาจากแสงจ้า
- ระมัดระวังการขับขี่ยานยนต์ หรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกล หรือทำงานที่เสี่ยงต่อการพลัดตกจากที่สูง

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

- ลมพิษ บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก
 - หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
 - ผื่นแดง ผื่นคัน ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีจ้ำตามผิวหนัง
 - ประสาทหลอน กระสับกระส่าย อยู่ไม่นิ่ง
 - ชัก
- "ให้หยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที"**

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่มีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์

- ปากแห้ง
- แพ้แสง มองภาพไม่ชัด
- อาการตัวร้อนแดง ผิวแห้ง
- แน่นท้อง ท้องผูก
- คลื่นไส้ อาเจียน
- รังเวียน ปวดหัว

"ไม่จำเป็นต้องหยุดยา
แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์"

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อย่าให้โดนแสงโดยตรง โดยทั่วไป ควรเก็บที่อุณหภูมิห้องไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- สามารถใช้ได้ 24 ชั่วโมง หลังจากเปิดใช้
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

- **ลักษณะยา** นํ้ายาปราศจากเชื้อ ใสไม่มีสี
- **ตัวยาสำคัญ** อะโทรปีนซัลเฟต (atropine sulfate)
- **ส่วนประกอบอื่น ๆ** ได้แก่ โซเดียมคลอไรด์, กรดบอริก, ไฮโปรเมิลโลส, กรดไฮโดรคลอริก, โซเดียมไฮดรอกไซด์, น้ำสำหรับยาฉีด

ผู้ผลิตและผู้แทนจำหน่าย

บริษัท มิลลิเมด บีเอฟเอส จำกัด
174, 179 หมู่ที่ 8 ตำบลพางาม อำเภอเวียงชัย
จังหวัดเชียงราย 57210 Call center 0 2945 9555

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ 2 ตุลาคม 2567

ศึกษาข้อมูลยาเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.

- <http://ndi.fda.moph.go.th/>

คำเตือนตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข:

1. ผู้สูงอายุหรือเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี ควรใช้ตามแพทย์สั่ง
2. ห้ามใช้ในโรคต้อหิน (glaucoma)
3. หากเกิดอาการซีพจรเต้นเร็ว มึนงง หรือสายตาดำพร่า ให้หยุดใช้ยา