

**อีลิทริปแทน**  
**ความแรง 40 มิลลิกรัม**  
**ชนิดเม็ดเคลือบฟิล์ม**  
**ชื่อการค้า ZEROTAN (ซีโรแทน)**

**1. ยานี้คืออะไร**

**1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร**

- ยานี้มีชื่อว่า อีลิทริปแทน (eletriptan) เป็นยาแก้ปวดไมเกรนในกลุ่มทริปแทน

**1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร**

- ยานี้ใช้เพื่อรักษาอาการปวดหัวไมเกรนแบบเฉียบพลัน ทั้งที่มีหรือไม่มีอาการเตือนล่วงหน้า

**2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา**

**2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร**

- เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้
- เป็นโรคตับหรือโรคไตทำงานบกพร่องรุนแรง
- มีภาวะความดันโลหิตสูงปานกลางถึงรุนแรง หรือมีภาวะความดันโลหิตสูงเล็กน้อยที่ไม่ได้รับการรักษา
- เคยเป็นหรือกำลังเป็นโรคหัวใจหรือโรคหลอดเลือดหัวใจ
- เป็นโรคหลอดเลือดส่วนปลาย
- เคยมีอาการโรคหลอดเลือดสมอง
- รับประทานเออร์โกตามีนหรืออนุพันธ์ของเออร์โกตามีน [รวมถึงเมทิลเซออร์โกด์ (methylsergide)] ภายใน 24 ชั่วโมงก่อนหรือหลังได้รับยานี้
- กำลังใช้ยาอื่นที่มีชื่อลงท้ายด้วย "ทริปแทน" เช่น ซูมาทริปแทน (sumatriptan) นาราทริปแทน (naratriptan)

**เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ**  
**หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร**

**2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้**

- ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ในกรณีต่อไปนี้
  - เป็นโรคเบาหวาน
  - สูบบุหรี่หรือใช้สารทดแทนนิโคติน
  - ไม่แน่ใจว่าเป็นโรคหัวใจ หรือมีความเสี่ยงเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจ เช่น เป็นเพศชายอายุ 40 ปีขึ้นไป หรือเป็นเพศหญิงวัยหมดประจำเดือน หรือมีประวัติคนในครอบครัวเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจ
  - กำลังใช้ยาหรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร หรือสมุนไพรชนิดใดอยู่ เพราะอาจเกิดปฏิกิริยาต่อกันซึ่งมีผลต่อการรักษาหรือเกิดอันตรายได้
  - กำลังตั้งท้องหรือให้นมลูก หรือวางแผนตั้งท้อง **"หากมีกรณีเหล่านี้ควรปรึกษาแพทย์"**

**3. วิธีใช้ยา**

**3.1 ขนาดและวิธีใช้**

- **ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น** เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค
- ควรกินยาทันทีที่มีอาการ
- **ไม่ควรกินยานี้เพื่อป้องกันไมเกรน**
- ควรกินยาทั้งเม็ดพร้อมดื่มน้ำตาม **ไม่ควรหักหรือบดเม็ดยา**
- หากกินยาเม็ดแรกจนอาการปวดหัวไมเกรนดีขึ้นแล้ว แต่กลับมามีอาการปวดอีกครั้งสามารถกินยาเม็ดที่สองได้โดยต้องเว้นระยะห่างจากเม็ดแรกอย่างน้อย 2 ชั่วโมง
- หากกินยาเม็ดแรกแล้วอาการปวดหัวไมเกรน **ไม่ดีขึ้น** ให้แจ้งแพทย์เพื่อพิจารณาปรับขนาดยา
- **ไม่ควรกินยานี้เกิน 2 เม็ด ภายใน 24 ชั่วโมง**

**3.2 หากลืมกินยาควรทำอย่างไร**

- หากท่านยังมีอาการอยู่ ให้กินทันที
- หากไม่มีอาการแล้ว ให้หยุดกินยาได้เลย

**3.3 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร**

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง เช่น ใจสั่น หน้ามืด เวียนหัว เหงื่อออกมาก ให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที

**4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา**

- พบแพทย์ตามนัดทุกครั้งเพื่อติดตามผลการรักษาหรืออันตรายจากยา
- ควรหลีกเลี่ยงการขับชี่ยานพาหนะและการใช้เครื่องจักรระหว่างที่เกิดอาการไมเกรนและหลังกินยานี้ เพราะยานี้หรืออาการของโรคไมเกรนเองอาจทำให้รู้สึกง่วงซึม
- ควรหลีกเลี่ยงการให้นมลูกภายใน 24 ชั่วโมงหลังกินยานี้

**5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา**

**5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที**

- ลมพิษ บวมที่ใบหน้า เปลือกตาริมฝีปาก
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก หายใจหอบเหนื่อยเฉียบพลัน
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีจ้ำตามผิวหนังหรือเลือดออกผิปกัด
- กระสับกระส่าย ประสาทหลอน สูญเสียการทรงตัว หัวใจเต้นเร็ว อุณหภูมิร่างกายสูงขึ้น ความดันเลือดเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว ปฏิกริยาตอบสนองมากเกินไป **"ให้หยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที"**

**5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์**

- ใจสั่น
- เวียนหัว เวียนหัวบ้านหมุน ปวดหัว รู้สึกง่วงซึม ความรู้สึกสัมผัสลดลง
- เจ็บคอ แน่นคอ ปากแห้ง
- ปวดท้อง อาทรมาย่อย คลื่นไส้
- กล้ามเนื้อตึงตัว กล้ามเนื้ออ่อนแรง ปวดหลัง ปวดกล้ามเนื้อ
- รู้สึกอ่อนแรง รู้สึกร้อน หนาวสั่น น้ำมูกไหล เหงื่อออก รู้สึกชาหรือความรู้สึกผิดปกติ หน้าแดง ปวดแน่นหน้าอก

**"ไม่จำเป็นต้องหยุดยา**  
**แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์"**

## 6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อย่าให้โดนแสงโดยตรง โดยทั่วไป ควรเก็บที่อุณหภูมิห้องไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- ควรแกะยาเมื่อกินในแต่ละครั้งเท่านั้น ห้ามแกะยาออกจากแผงก่อน เพราะยาอาจเสียได้
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

## 7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

- **ลักษณะยา** เม็ดกลม นูนเล็กน้อย เคลือบฟิล์มสีส้ม เรียบทั้งสองด้าน
- **ตัวยาสำคัญ** อีลิตริปแทน (eletriptan)
- **ส่วนประกอบอื่น ๆ** ได้แก่ แลคโตสโมโนไฮเดรต, ไมโครคริสตัลไลน์เซลลูโลส, ครอสคาร์เมลโลสโซเดียม, แมกนีเซียมสเตียเรท, เอชพีเอ็มซี, ไตรอะซีดีน, โทเทเนียมไดออกไซด์, ยูโรเลคซันเซตเยลโลว, น้ำ

### ผู้ผลิตและผู้แทนจำหน่าย

บริษัท มิลลิเมด บีเอฟเอส จำกัด  
174, 179 หมู่ที่ 8 ตำบลผางาม อำเภอเวียงชัย  
จังหวัดเชียงราย 57210 Call center 0 2945 9555

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ 11 กันยายน 2566

### ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.

- <http://ndi.fda.moph.go.th/>