

**ซิดากลิปติน**  
**ความแรง 50 และ 100 มิลลิกรัม**  
**ชนิดเม็ดเคลือบฟิล์ม**  
**ชื่อการค้า**  
**SITAGTIN-50 และ SITAGTIN-100**  
**(ซิทากติน-50 และ ซิทากติน-100)**

**1. ยานี้คืออะไร**

- 1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร**
- ยานี้มีชื่อว่า ซิดากลิปติน (sitagliptin) มีตัวยา 50 หรือ 100 มิลลิกรัม เป็นยาในกลุ่มลดระดับน้ำตาลในเลือด
- 1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร**
- ยานี้ใช้เพื่อรักษาโรคเบาหวานประเภทที่ 2 โดยใช้เป็นยาเดี่ยว หรือใช้ร่วมกับยารักษาเบาหวานตัวอื่น

**2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา**

- 2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร**
- เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้
  - เป็นผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 1
  - มีภาวะเลือดเป็นกรด
  - มีภาวะติดเชือรุนแรง
  - ได้รับอุบัติเหตุรุนแรง
- 2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้**
- ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ในกรณีต่อไปนี้
    - ผู้ป่วยโรคตับอ่อน
    - ผู้ป่วยมีนิ่วในถุงน้ำดี
    - ผู้ป่วยไขมันในเลือดสูง
    - เป็นหรือเคยเป็นผู้ป่วยโรคไต
    - เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี
    - ผู้ติดแอลกอฮอล์
    - ใช้ยา สมุนไพร หรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอื่นอยู่ เพราะอาจมีผลต่อการรักษาหรือเกิดอันตรายได้ เช่น ดิจอกซิน
    - กำลังตั้งท้องหรือให้นมลูก

**3. วิธีใช้ยา**

- 3.1 ขนาดและวิธีใช้**
- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือ เภสัชกร เท่านั้น เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับ ชนิดและความรุนแรงของโรค
  - กินยาก่อนหรือหลังอาหารก็ได้
- 3.2 หากลืมกินยาควรทำอย่างไร**
- กินยาที่ลืมทันทีที่นึกขึ้นได้ แต่ถ้าใกล้เวลาของมื้อต่อไป ให้รอกินยาของมื้อต่อไป ห้ามกินยาเพิ่มเป็น 2 เท่า
- 3.3 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร**
- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่ รุนแรง ให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที

**4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา**

- พบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตาม ผลการรักษาหรืออันตรายจากยา
- ห้ามหยุดยาเอง และให้กินยาน้อยอย่างต่อเนื่องตาม คำแนะนำของแพทย์ หรือเภสัชกร
- ไม่นำยานี้ให้ผู้อื่นกิน แม้ว่าจะเป็นโรคเดียวกัน
- ไม่ควรใช้ยานี้ร่วมกับเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
- คุมอาหารและออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ เพื่อ ผลการรักษาที่ดีที่สุด
- ระมัดระวังการขับชี่ยานยนต์ หรือทำงานเกี่ยวกับ เครื่องจักรกล หรือทำงานที่เสี่ยงต่อการพลัดตกจากที่สูง เพราะยานี้อาจทำให้เกิดอาการมึนงง และง่วงซึม

**5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา**

- 5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที**
- ลมพิษ บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก
  - หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
  - ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีไข้ หรือมีจ้ำตาม ผิวหนัง
  - ปวดท้องรุนแรงและต่อเนื่องจนอาจร้าวถึงหลัง
- “ให้หยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที”**

**5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการ รุนแรงให้ไปพบแพทย์**

- ง่วงซึม มึนงง ใจสั่น เหงื่อออก หิว ซึ่งแสดงถึงอาการ น้ำตาลตก ให้รีบดื่มน้ำหวาน หรืออมลูกอม
  - ไข้หวัด คัดจมูก น้ำมูกไหล เจ็บคอ
  - ปวดหัว
  - คลื่นไส้ อาเจียน ท้องอืด ท้องผูก
  - แขนหรือขาบวม เจ็บข้อ ปวดแขนขา ข้อเสื่อม
- “ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์”**

**6. ควรเก็บยาน้อย่างไร**

- เก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- ควรแกะยาเมื่อกินในแต่ละครั้งเท่านั้น ห้ามแกะยาออกจากแผงก่อนเพราะยาอาจเสียได้
- เก็บยาในที่แห้ง อย่าให้โดนแสงโดยตรง โดยทั่วไปควร เก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส ไม่เก็บยาในที่ ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

**7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้**

- ลักษณะของยา **ซิทากติน-50** สีส้มอ่อน **ซิทากติน-100** สีน้ำตาลอ่อน
- ตัวยาสำคัญ ซิดากลิปตินฟอสเฟต
- ส่วนประกอบอื่นๆ ได้แก่ ไโดแคลเซียมฟอสเฟต, ไมโคร-คริสตัลไลน์เซลลูโลส, คอลลอยด์ซิลิโคนไดออกไซด์, ครอสคาร์เมลโลสโซเดียม, ทัลค์, กลีเซอรอลบีเฮนท, แมกนีเซียมสเตียเรท, เอชพีเอ็มซี, ไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์ พีอีจี6000, ไอรอนออกไซด์สีแดง, ไอรอนออกไซด์สีเหลือง ไทเทเนียมไดออกไซด์, เมทิลีนคลอไรด์

**ผู้ผลิตและผู้แทนจำหน่าย**  
บริษัท มิลลิเมต บีเอฟเอส จำกัด  
174, 179 หมู่ที่ 8 ตำบลผางาม อำเภอเวียงชัย  
จังหวัดเชียงราย 57210 Call center 0 2945 9555

**เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ 07 พฤษภาคม 2567**

**ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.**

▪ <http://ndi.fda.moph.go.th/>

**คำเตือนตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข**

1. ห้ามใช้ในผู้ที่เคยแพ้ยานี้
2. ห้ามใช้รักษาโรคเบาหวานชนิดที่ 1 ผู้ป่วยภาวะ ketoacidosis ผู้ป่วยภาวะติดเชื้อรุนแรง ผู้ป่วยได้รับอุบัติเหตุรุนแรง
3. สตรีมีครรภ์ควรหลีกเลี่ยงการใช้ยานี้ และสตรีให้นมบุตรระมัดระวังในการใช้ยานี้
4. ไม่ควรใช้ยานี้ร่วมกับเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
5. ยานี้อาจเพิ่มความเสี่ยงในการเจ็บข้ออย่างรุนแรง (severe joint pain)

**เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ**

**หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร**