

**พาราเซตามอล ขนาด 500 มิลลิกรัม
ชนิดเม็ด
[ยาเม็ดพาราเซตามอล]**

คำเตือน

- ห้ามใช้ยาพาราเซตามอลเกินขนาดที่แนะนำในฉลากหรือเอกสารกำกับยา เพราะจะทำให้เป็นพิษต่อตับได้ และไม่ควรใช้ยานี้ติดต่อกันเกิน 5 วัน
- หลีกเลี่ยงการใช้ยานี้ร่วมกับยาอื่นที่มีพาราเซตามอลเป็นส่วนประกอบ เพราะอาจทำให้ได้รับยาเกินขนาด
- บริกรษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยานี้ หากดื่มสุราเป็นประจำเป็นโรคตับหรือโรคตับ
- หากกินยาแล้วเกิดอาการ เช่น บวมที่ใบหน้า เปลือกดตา ริมฝีปาก ลมพิษ หนืดเม็ด ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวนองหลุดลอก ให้หยุดยาและรีบปรึกษาแพทย์ทันที

1. ยานี้คือยาอะไร

- ยานี้มีชื่อสามัญว่าพาราเซตามอล (paracetamol) เป็นยาในกลุ่มลดไข้ บรรเทาปวด
- ยานี้ใช้เพื่อลดไข้ บรรเทาอาการปวดเล็กน้อยถึงปานกลาง เช่น ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยจากไข้หวัด ปวดฟัน ปวดประจำเดือน ปวดกล้ามเนื้อ ปวดหลัง ปวดจากข้อเดื่อม

2. ข้อควรรู้ก่อนใช้ยา**2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไหร่**

- ☒ ห้ามใช้ในผู้ที่เคยแพ้ยาพาราเซตามอลหรือแพ้ส่วนประกอบอื่นในตำรับนี้
- ☒ ห้ามใช้พาราเซตามอลเกินขนาดที่แนะนำในฉลากและเอกสารกำกับยา เพราะอาจเกิดพิษร้ายแรงจนตับวายและเสียชีวิตได้
- ☒ หลีกเลี่ยงการใช้ยานี้ร่วมกับยาอื่นที่มีพาราเซตามอลเป็นส่วนประกอบ เพราะอาจทำให้ได้รับยาเกินขนาด

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

- ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยานี้หากมีภาวะพร่องจีกซีพีดี (G6PD) หรือกำลังกินยาต้านการแข็งตัวของเลือดวอร์ฟาริน เพราะอาจเกิดอันตรายจากยานี้ได้ถาวรขึ้น

- บริกรษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยานี้ หากดื่มสุราเป็นประจำ เมื่อโนโครตับหรือโรคตับ เพราะอาจเกิดอันตรายจากยานี้ได้ถาวรขึ้น

- ถ้ามีไข้สูง (อุณหภูมิสูงกว่า 39.5 องศาเซลเซียส) ให้รีบไปพบแพทย์

3. วิธีใช้ยา**3.1 ขนาดและวิธีใช้**

น้ำหนักตัว (กิโลกรัม)	ขนาดยา
น้อยกว่า 34	ให้บริกรษาแพทย์หรือเภสัชกร
ตั้งแต่ 34 ถึง 50	กินยาครั้งละ 1 เม็ด แต่ละครั้งห่างกันอย่างน้อย 4 ชั่วโมง เฉพาะเวลาปวดหรือมีไข้
มากกว่า 50 ถึง 67	กินยาครั้งละ หนึ่งเม็ดครึ่งวันละไม่เกิน 5 ครั้ง แต่ละครั้งห่างกันอย่างน้อย 4 ชั่วโมง เฉพาะเวลาปวดหรือมีไข้
มากกว่า 67	กินยาครั้งละ 2 เม็ด วันละไม่เกิน 4 ครั้ง แต่ละครั้งห่างกันอย่างน้อย 4 ชั่วโมง เฉพาะเวลาปวดหรือมีไข้

3.2 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควร怎么办 รีบไปพบแพทย์ทันที เพราะหากได้รับยาเกินขนาดไปมากแล้ว ได้รับการรักษาไม่ทันท่วงที จะทำให้ตับถูกทำลายนำไปสู่การเสียชีวิตจากตับวายได้

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างการใช้ยา

- ไม่กินยาติดต่อกันเป็นเวลานาน โดยไม่ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร
- ถ้ากินยาแล้วไข้ไม่ลดภายใน 3 วัน หรืออาการปวดของผู้ไข้ในรูปแบบเดิมๆ ใน 5 วัน หรืออาการปวดของผู้ไข้ในรูปแบบเดิมๆ ใน 10 วัน ให้ไปพบแพทย์เนื่องจากอาจเป็นอาการของโรคที่ร้ายแรงได้

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา**5.1 หากกินยาแล้วเกิดอาการ เช่น**

- บวมที่ใบหน้า เปลือกดตา ริมฝีปาก ลมพิษ
 - หนาเม็ด เป็นลม แน่นหน้าอกร หายใจลำบาก
 - ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวนองหลุดลอก
 - มีจ้ำตามผิวน้ำ ลีดอุดออกพิปกติ เนื้อเยื่อย่าง เป็นหวัดได้ง่าย
- ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

5.2 หากจำเป็นต้องกินยานี้ต่อเนื่องแล้วเกิดอาการ เช่น

- อาการปวดท้อง คลื่นไส้ อาเจียน ท้องอืด ตัวเหลือง ตาเหลือง ปัสสาวะสีเข้มข้น
- ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บยาไว้ในภาชนะบரุงุดิมตามที่ได้รับมา
- แกะยาออกจากแพลงเมื่อจะกินในแต่ละครั้งเท่านั้น
- เก็บยาในที่แห้ง อย่าให้โดนแสงโดยตรง โดยทั่วไปควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

ลักษณะยา – ยาเม็ดรูปไข่สูนหั้งสองด้าน สีขาว ด้านหนึ่งมีเส้นแบ่งครึ่งเม็ดยา
ส่วนประกอบในตำรับ – Tapioca starch, Colloidal silicon dioxide, Povidone, Sodium metabisulfite, Corn starch, Microcrystalline cellulose, Magnesium stearate และ Purified water

ผู้ผลิต – บริษัท บี.เอ็ล.เอช.จำกัด

เลขที่ 4 ช.สิทธิ์เกษตร ถ.สมเด็จเจ้าพระยา แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุง 10600

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ – กันยายน 2560

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัย
ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร