

อะซีทิลซิสทีน
ความแรง 100 มิลลิกรัม
ชนิดยาผงผสมน้ำก่อนใช้สำหรับกิน
[MUCOTIC]

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้ชื่อว่า อะซีทิลซิสทีน (Acetylcysteine)

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ใช้เพื่อละลายเสมหะ ในโรคที่ทางเดินหายใจมีความผิดปกติทั้งชนิดเฉียบพลันหรือเรื้อรัง ซึ่งส่งผลการหลังเสมหะที่เหนียวข้น หรือมากผิดปกติ

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ ส่วนประกอบของยานี้
- ผู้ป่วยโรค " ฟินิลคีโตนูเรีย "

2.2 เพื่อความปลอดภัย ให้บอกแพทย์หากท่านมีภาวะต่อไปนี้

- ใช้ยา สมุนไพร อาหารเสริมอื่นอยู่
- เป็นโรคหอบหืด หรือ มีอาการหอบหืดกำเริบอยู่
- เป็นแผลที่กระเพาะอาหารหรือลำไส้เล็ก
- หญิงตั้งครรภ์ วางแผนจะตั้งครรภ์ หรือหญิงที่กำลังให้นมทารก

3. วิธีใช้ยา

3.1 กินยาได้อย่างไร

- กินยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกร หรือตามฉลากยาที่ได้รับจากโรงพยาบาล
- ละลายผงยา 1 ชง ต่อ น้ำ ครึ่งแก้ว (ประมาณ 125 มิลลิลิตร)
- ขนาดทั่วไปที่แนะนำ:
 - ผู้ใหญ่ 2 ชง 3 ครั้ง ต่อวัน
 - เด็ก 1 ชง 2-4 ครั้ง ต่อวัน

3.2 หากลืมกินยาควรทำอย่างไร

- กินยาที่ลืมทันทีที่นึกขึ้นได้ แต่หากใกล้เวลาที่ต้องกินอีกครั้งไม่ต้องกินยาที่ลืม
- ห้ามกินยาเพิ่มเพื่อชดเชย

3.3 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด และรีบไปโรงพยาบาลพร้อมยานี้หรือภาชนะบรรจุทันทีหากมีอาการผิดปกติ

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยานี้

- ไม่นำยานี้ให้ผู้อื่นกิน แม้ว่าจะเป็นโรคหรือมีอาการเดียวกัน
- ควรดื่มน้ำอุ่น หรือ น้ำสะอาดอุณหภูมิปกติระหว่างวัน บ่อย ๆ และพักผ่อนให้เพียงพอ เพื่อผลในการรักษาที่ดีขึ้น
- ควรงดสูบบุหรี่ น้ำเย็น น้ำแข็ง ของทอดของมัน เพราะอาจทำให้อาการไอหรือเสมหะมากขึ้น

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วไปพบแพทย์ทันที

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีไข้

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามี

อาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์ทันที

- การรับรสเปลี่ยน ปากแห้ง
- มีผื่นเล็กน้อยที่ผิวหนัง
- คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย ไม่สบายท้อง

6. ควรเก็บยาได้อย่างไร

- เก็บไว้ในภาชนะบรรจุเดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อบอุ่นโดยแสงโดยตรง ควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส ไม่ควรเก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว พับมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยา

- ลักษณะยา: ผงสีส้ม
- ตัวยาสาคัญ: อะซีทิลซิสทีน
- ส่วนประกอบอื่น ๆ: sucrose, sunset yellow dye, sucralose, colloidal silicon dioxide, orange powder

เอกสารฉบับนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุด 13 มิถุนายน 2562

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.

<http://ndi.fda.moph.go.th>

ผู้ผลิต: บริษัท บี.แอล. อีวี จำกัด, ประเทศไทย