

**คลอร์เฟนิรามีนมาลีเอต**  
**2 มิลลิกรัม ต่อ 5 มิลลิลิตร**  
**ชนิดน้ำเชื่อม**  
**ชื่อการค้า V-PADRYL SYRUP**  
**(วี-พาดริล ไชร์ป)**

## 1. ยานี้คืออะไร

### 1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้มีชื่อว่า คลอร์เฟนิรามีนมาลีเอต (chlorpheniramine maleate) มีตัวยา 2 มิลลิกรัม/5 มิลลิลิตร เป็นยาในกลุ่มยาแก้แพ้

### 1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ยานี้ใช้เพื่อป้องกันหรือบรรเทาอาการต่างๆ จากการแพ้ เช่น
- น้ำมูกไหล น้ำตาไหล ตาแดง คันดา คันจมูก คันคอ จาม ลมพิษ ผื่นคัน
  - ใช้ลดน้ำมูกในโรคหวัด

## 2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

### 2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- ⊗ เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้
- ⊗ เด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี เพราะยากระตุ้นระบบประสาท ทำให้ชักได้
- ⊗ ผู้ที่กำลังมีอาการหอบหืด เพราะยาทำให้เสมหะเหนียวข้น และอาจอุดตันทางเดินหายใจได้
- ⊗ ในผู้ที่กำลังใช้ยาหรือมีประวัติใช้ยารักษาภาวะซึมเศร้าประเภท "ยับยั้งโมโนเอไมนออกซิเดส" ในช่วง 14 วันที่ผ่านมา เพราะจะทำให้มีอาการข้างเคียงของยาเพิ่มขึ้นได้

### 2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

- ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ในกรณีต่อไปนี้
  - ใช้ยาสมุนไพร อาหารเสริมอื่นอยู่
  - หญิงตั้งครรภ์ หรือ หญิงที่กำลังให้นมทารก
  - โรคหืด โรคหลอดลมอักเสบ หลอดลมพอง โรคถุงลมโป่งพอง โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
  - เป็นต่อหิน ความดันในลูกตาสูง

- ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด
- โรคลมชัก
- ไต หรือ ตับ ทำงานผิดปกติ
- โรคต่อมลูกหมากโต ปัสสาวะขัด หรือปัสสาวะคั่ง
- ผู้ป่วยเบาหวาน เนื่องจากสูตรตำรับยามีน้ำตาลเป็นส่วนประกอบ
- ยานี้มีส่วนประกอบของวัตถุกันเสีย อาจทำให้เกิดอาการแพ้ได้ ควรใช้ด้วยความระมัดระวัง
- ยานี้มีส่วนประกอบของสารให้ความหวาน โซเดียมไซคลาเมต (sodium cyclamate) หรือกรดไซคลามิก (cyclamic acid)
- **แจ้งแพทย์หากท่านอยู่ในกลุ่มต่อไปนี้**
  - กำลังตั้งครรภ์ โดยเฉพาะในช่วง 2 สัปดาห์ก่อนคลอด เพราะอาจมีอันตรายต่อทารกในครรภ์ แต่แพทย์อาจพิจารณาสั่งใช้ยานี้ หากมีเหตุผลทางการแพทย์
  - กำลังให้นมบุตร เพราะยาถูกขับออกทางน้ำนมได้ และอาจลดการสร้างน้ำนม
  - กำลังใช้ยาอื่นอยู่
- **ไม่ควรใช้ยานี้ร่วมกับยาหรือเครื่องดื่มต่อไปนี้** เพราะอาจมีผลต่อการรักษาหรือเกิดอันตรายได้ เช่น
  - เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบ
  - ยาหรืออาหารและเครื่องดื่มที่มีโซเดียมไซคลาเมตหรือกรดไซคลามิกเป็นส่วนประกอบ
  - ยาทางจิตเวช เช่น ยารักษาภาวะซึมเศร้าบางชนิด ยานอนหลับ ยาคลายกังวล
  - ยาแก้ปวดบางชนิด
  - ยาแก้แพ้ชนิดอื่น ๆ

## 3. วิธีใช้ยา

### 3.1 ขนาดและวิธีใช้

- **ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกร** เท่านั้น เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค
- ควรใช้ยานี้ในเด็กอายุ 2 ปีขึ้นไป

### ขนาดยาโดยทั่วไป

- เด็ก อายุ 2-6 ปี: กิน ครั้งละ 1 มิลลิกรัม (ครึ่งช้อนชา หรือ 2.5 มิลลิลิตร) ทุก 4-6 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 6 มิลลิกรัม (3 ช้อนชา หรือ 15 มิลลิลิตร) ต่อวัน
- เด็ก อายุ 6-12 ปี: กิน ครั้งละ 2 มิลลิกรัม (1 ช้อนชา หรือ 5 มิลลิลิตร) ทุก 4-6 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 12 มิลลิกรัม (6 ช้อนชา หรือ 30 มิลลิลิตร) ต่อวัน
- ผู้ใหญ่ และเด็กอายุ 12 ปีขึ้นไป: กิน ครั้งละ 4 มิลลิกรัม (2 ช้อนชา หรือ 10 มิลลิลิตร) ทุก 4-6 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 24 มิลลิกรัม (12 ช้อนชา หรือ 60 มิลลิลิตร) ต่อวัน
- ยานี้จะกินก่อนหรือหลังอาหารก็ได้ แต่ถ้ากินยาแล้วปวดมวนท้อง อาจกินยาพร้อมอาหารหรือนม

### 3.2 หากลืมกินยาควรทำอย่างไร

- กินยาที่ลืมทันทีที่นึกขึ้นได้ แต่หากใกล้เวลาที่ต้องกินอีกครั้ง ไม่ต้องกินยาที่ลืม
- ห้ามกินยาเพิ่มเพื่อชดเชย

### 3.3 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง ให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที พร้อมยานี้หรือภาชนะบรรจุทันที

## 4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- ก่อนใช้ยานี้ ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่ได้ใช้ยาอื่น ๆ ที่มีส่วนผสมของคลอร์เฟนิรามีนมาลีเอตหรือยาแก้แพ้ชนิดอื่นอยู่ เพราะอาจทำให้ได้รับยาเกินขนาดได้
- ไม่นำยานี้ให้ผู้อื่นกิน แม้ว่าจะเป็นโรค หรือมีอาการเดียวกัน
- อุปกรณ์ที่ใช้ในการดวงยาจะต้องเป็นช้อนชาที่ได้รับมาจากสถานพยาบาล โดย 1 ช้อนชา มีปริมาตรเท่ากับ 5 มิลลิลิตร ดวงยาให้เต็มขอบบนของช้อนชาพอดี
- ระมัดระวังในการขับขี่ยานยนต์หรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกล หรือทำงานที่เสี่ยงต่อการพลัดตกจากที่สูง เพราะยานี้ทำให้ง่วงซึม

- หลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบ เพราะอาจทำให้วงซึมมากขึ้น
- ถ้าต้องทำการทดสอบภูมิแพ้ ควรแจ้งแพทย์ทราบว่าคุณกำลังใช้ยานี้อยู่
- ควรดื่มน้ำระหว่างวันมากๆ เพื่อลดอาการไม่พึงประสงค์จากยา เช่น คอแห้ง ปากแห้ง เสมหะเหนียวข้น
- สูตรตำรับยามีน้ำตาลเป็นส่วนประกอบอาจเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดฟันผุได้ ควรดูแลสุขอนามัยในช่องปาก

## 5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

### 5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีจำตามผิวหนัง รอยฟกช้ำ หรือเลือดออกผิดปกติ
- ตัวเหลือง ตาเหลือง ดีซ่าน ซึ่งอาจเกิดจากความผิดปกติที่ตับ
- อ่อนเพลียรุนแรง
- เวียนหัวรุนแรง
- สับสน กระสับกระส่าย ชัก
- ตาพร่าหรือการมองเห็นผิดปกติ
- ใจสั่นผิดปกติ
- ปัสสาวะขุ่น ปัสสาวะออกน้อยลงผิดปกติ

**“ให้หยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที”**

### 5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์

- ง่วงซึม เหนื่อย เพลีย ไม่มีแรง นอนไม่หลับ
- ปวดหัว เวียนหัว
- ปากแห้ง คอแห้ง จมูกแห้ง
- คลื่นไส้ อาเจียน เบื่ออาหาร ท้องผูก ท้องเสีย หรือไม่สบายท้อง

**“ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์”**

## 6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บยาไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อบอุ่นแสงโดยตรง โดยทั่วไป ควรเก็บที่อุณหภูมิต่ำกว่า 30 องศาเซลเซียส ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- หากเปิดยาแล้ว เก็บไว้ที่อุณหภูมิต่ำกว่า 30 องศาเซลเซียส ไม่เกิน 15 วัน
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

## 7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

- **ลักษณะยา** น้ำเชื่อมใส สีแดง กลิ่นรสปีเบอร์รี่
- **ตัวยาสำคัญ** คลอร์เฟนิรามีนมาลีเอต
- **ส่วนประกอบอื่น ๆ** ได้แก่ sucrose (ซูโครส), methylparaben (เมททิลพาราเบน), propylparaben (โพรพิลพาราเบน), liquid glucose (ลิควิดกลูโคส), saccharin sodium (แซคคารินโซเดียม), sodium cyclamate (โซเดียมไซคลาเมต), citric acid monohydrate (ซิตรีคแอซิดโมโนไฮเดรต), sodium citrate (โซเดียมซิเตรต), levomenthol (เลโวเมนทอล), alcohol (ethanol 95%) [แอลกอฮอล์ (เอทานอล 95%)], glycerin (กรีเซอริน), raspberry essence (รสปีเบอร์รี่-เอสเซนซ์), sucralose (ซูคราโลส), caramel (คาราเมล), ponceau 4R (ปองโซโฟรอาร์) และ purified water (น้ำบริสุทธิ์)

ผู้ผลิต บริษัท วี แอนด์ พี ลาบอราตอรี จำกัด  
182 หมู่ 14 ถนนเพชรเกษม ตำบลไร่ขิง  
อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210  
ประเทศไทย

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ มิถุนายน 2567

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ  
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ **อย.**

- [http://porta.fda.moph.go.th/fda\\_search\\_all/mai\\_search\\_center\\_main.aspx](http://porta.fda.moph.go.th/fda_search_all/mai_search_center_main.aspx)
- <https://ndi.fda.moph.go.th/>

## คำเตือนตามประกาศฯ

1. ยานี้ทำให้ง่วงซึม จึงไม่ควรขับขี่ยานยนต์หรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกล หรือทำงานที่เสี่ยงต่อการพลัดตกจากที่สูง
2. ไม่ควรรับประทานร่วมกับสุรา หรือสิ่งที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบ
3. ห้ามใช้ในเด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี ผู้ที่กำลังมีอาการหอบหืด โรคต่อหิน ต่อมลูกหมากโต หรือปัสสาวะขัด นอกจากแพทย์สั่ง
4. ระวังการใช้นานี้ในสตรีมีครรภ์ ระยะ 3 เดือนแรก และสตรีที่ให้นมบุตร
5. ยานี้ทำให้ปากแห้ง ปัสสาวะขุ่น เสมหะเหนียวข้น ตาพร่า วิงเวียน สับสน และเมื่อดูดฝิ่นผิดปกติ
6. เด็กและผู้สูงอายุ จะไวต่อยานี้มากขึ้น ทำให้ง่วงนอน วิงเวียน ประสาทหลอน ปากแห้ง ปัสสาวะขุ่น ความดันโลหิตต่ำ หงุดหงิดนอนไม่หลับและบางรายอาจมีอาการชักได้ (paradoxical reaction)
7. ระวังการใช้นานี้ร่วมกับยาที่มีฤทธิ์กดระบบประสาทส่วนกลาง เช่น ยากลุ่ม Benzodiazepines ยาที่มีฤทธิ์แอนติโคลิเนอร์จิก และยาด้านอาการซึมเศร้าชนิดต่างๆ
8. ระวังการใช้นานี้ในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด ต่อมไทรอยด์ทำงานมากกว่าปกติ ผู้ที่มีประวัติโรคหอบหืด โรคถุงลมโป่งพอง

**คำเตือน:** ยานี้มีแอลกอฮอล์ (เอทานอล 95%) ผสมอยู่ 0.12% โดยปริมาตรต่อปริมาตร ควรใช้ด้วยความระมัดระวัง