

แพนโทพราโซล
ความแรง 40 มิลลิกรัม
ชนิดเม็ดเคลือบให้แตกตัวในลำไส้
ชื่อการค้า PANTOPRAZOLE T.O. 40 MG
(แพนโทพราโซล ที.โอ. 40 มก.)

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร
• ยานี้มีชื่อว่า แพนโทพราโซล (pantoprazole) เป็นยาในกลุ่มยับยั้งการหลั่งกรดในกระเพาะอาหาร

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร
เด็ก: ยานี้ใช้เพื่อรักษา
• โรคหลอดอาหารอักเสบ

ผู้ใหญ่: ยานี้ใช้เพื่อรักษา
• โรคหลอดอาหารอักเสบ
• ใช้ร่วมกับยาปฏิชีวนะที่เหมาะสม 2 ชนิดในการกำจัดเชื้อ *Helicobacter pylori* ซึ่งเป็นสาเหตุของการกลับเป็นซ้ำของแผลในกระเพาะอาหารหรือลำไส้เล็กส่วนต้นของผู้ป่วยที่เป็นโรคแผลในกระเพาะอาหาร
• แผลในลำไส้เล็กส่วนต้น
• แผลในกระเพาะอาหาร
• โรคโซลลิงเกอร์-เอลลิสัน และภาวะที่มีการหลั่งกรดสูงอื่นๆ

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร
• เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้ หรือยาอื่นในกลุ่มยับยั้งการหลั่งกรดในกระเพาะอาหาร

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้
ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ในกรณีต่อไปนี้
- ผู้ป่วยที่มีการทำงานของตับบกพร่อง
- หญิงมีครรภ์ และหญิงให้นมบุตร
- ใช้ยาด้านการแข็งตัวของเลือด
- กำลังใช้ “ยา อาหารเสริม สมุนไพร” อื่นๆร่วมด้วย เพราะอาจมีผลต่อการรักษาหรือเกิดอันตรายได้

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้
• ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค

• กินยานี้ก่อนอาหาร 1 ชั่วโมง
• ยานี้ควรกลืนยาทั้งเม็ด ห้ามแบ่งหรือบดเคี้ยวเม็ดยา

3.2 หากลืมกินยาควรทำอย่างไร
• กินทันทีที่นึกขึ้นได้ แต่ถ้าใกล้เวลาของยามื้อต่อไปให้รอกินยาของมื้อต่อไป ห้ามกินยาเพิ่มเป็น 2 เท่า

3.3 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร
• ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง ให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

• ให้กินยานี้ติดต่อกันทุกวันจนครบตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกร หากอาการยังไม่หายขาดควรรักษาต่อไปอีกระยะหนึ่ง

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วไปพบแพทย์ทันที
• ลมพิษ บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก
• หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
• ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีจ้ำตามผิวหนังหรือเลือดออกผิดปกติ

• เป็นตะคริว
• กระตุกร้าว กระตุกหัก

“ให้หยุดยาแล้วไปพบแพทย์ทันที”

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์
• คลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง ท้องเสีย
• เวียนศีรษะ ปวดหัว

“ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์”

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อบอุ่นให้โดนแสงโดยตรง โดยทั่วไปควรเก็บที่อุณหภูมิต่ำกว่า 30 องศาเซลเซียส ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก
- ห้ามนำยานี้ให้ผู้อื่นกิน ถึงแม้ว่าจะมีอาการหรือโรคเช่นเดียวกับท่าน

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

- ลักษณะยา เม็ดรูปรีนูนทั้งสองด้าน เคลือบฟิล์มสีเหลืองอ่อน
- **ตัวยาสำคัญ** แพนโทพราโซล (Pantoprazole)
- **ส่วนประกอบอื่น ๆ** ได้แก่ โซเดียมคาร์บอเนตแอนไฮไดรต์ ผงแมนนิทอล ครอสโพรโอดินชนิด เอ โพรโอดิน เค30 โพรโอดิน เค90 ครอสโพรโอดินชนิด บี แคลเซียมสเตียเรต ไฮโพรเมลโลส อี5 โทเทเนียมไดออกไซด์ เพอร์ริคออกไซด์เยลโล โพรพิลีนไกลคอล เมททาโครลิกแอซิด และเอทิลอะคริเลตโคโพลิเมอร์ (1:1) ไตรเอทิลซิเตรด และ ทัลคัม

ผู้ผลิต บริษัท ที.โอ. เคมีคอลส์ (1979) จำกัด
53 ถนนเลียบคลอง 7 ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอสามพราน
กา จังหวัดปทุมธานี 12150 ประเทศไทย
เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ 28 สิงหาคม 2567

ศึกษาข้อมูลยาเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.
<http://www.fda.moph.go.th/sites/oss/Pages/Main.aspx>
<http://ndi.fda.moph.go.th>

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร