

โมเมธาโซน ฟูโรเอท ความแรงร้อยละ 0.1 ชนิดครีม MODASONE CREAM (โมดาโซน ครีม)

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

ยานี้มีชื่อว่า โมเมธาโซน ฟูโรเอท (mometasone furoate) เป็นยาในกลุ่มคอร์ติโคสเตียรอยด์

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

ยานี้ใช้สำหรับบรรเทาอาการอักเสบและคันของโรคผิวหนังซึ่งไม่เกี่ยวกับการติดเชื้อที่ตอบสนองต่อคอร์ติโคสเตียรอยด์ เช่น โรคสะเก็ดเงิน (psoriasis) และ atopic dermatitis

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- ผู้ที่มีประวัติแพ้ยาโมเมธาโซน ฟูโรเอท ยาอื่นในกลุ่มคอร์ติโคสเตียรอยด์ หรือส่วนประกอบอื่นๆ ในยาครีม
 - มีอาการดังต่อไปนี้ เพราะยาอาจทำให้มีอาการแย่ลง
 - เป็นโรคผิวหนังอักเสบโรซาเซีย (rosacea)
 - กำลังเป็นสิ่วบางชนิดเพราะยาอาจกระตุ้นให้สิ่วบางชนิดกำเริบได้
 - มีภาวะผิวหนังบาง
 - กำลังมีผิวหนังอักเสบบริเวณรอบปาก
 - มีอาการคันบริเวณอวัยวะเพศ
 - กำลังเป็นผื่นผ้าอ้อม
 - กำลังติดเชื้อไวรัสที่ผิวหนัง เช่น อีสุกอีใส งูสวัด เริม
 - กำลังเป็นหูด
 - มีแผลบริเวณผิวหนัง หรือมีแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวก
 - เป็นบริเวณกว้าง
 - มีการติดเชื้อที่ผิวหนัง
- ถ้าท่านไม่แน่ใจว่าอาการที่ท่านเป็นอยู่ มีผลกับการใช้โมเมธาโซน ฟูโรเอทครีม หรือไม่ ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้ ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ในกรณีต่อไปนี้

- ใช้ทาผิวหนังบริเวณกว้าง
- ใช้ในเด็ก เนื่องจากหากใช้ยาปริมาณมากเป็นเวลานานอาจทำให้เด็กเติบโตช้ากว่าปกติ ไม่แนะนำให้ใช้ในเด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี
- ใช้ผ้าหรือพลาสติกปิดผิวหนังบริเวณที่ทายา
- มีการติดเชื้อที่ผิวหนัง
- เป็นโรคต่อหินหรือต่อกระຈ
- หลีกเลี่ยงห้องและหญิงให้นมลูกควรระมัดระวังการใช้ยานี้ ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยานี้ เพราะไม่มีข้อมูลยืนยันความปลอดภัย

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- **ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น** เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค
- ขนาดยาทั่วไป สำหรับผู้ใหญ่และเด็กอายุ 2 ปีขึ้นไป: ทายาบางๆ บริเวณผิวหนังที่มีรอยโรค วันละ 1 ครั้ง
- ก่อนใช้ยาควรล้างมือและผิวหนังที่จะทายาให้สะอาด และล้างมือหลังจากทายา ยกเว้นกรณีทายาเพื่อรักษาที่มือ
- ในกรณีจำเป็นต้องทายานี้บริเวณใบหน้า ไม่ควรทายานานเกิน 5 วัน
- ในเด็ก ไม่ควรใช้ยานานเกิน 5 วัน
- ไม่ใช้วัสดุใดๆ ปิดทับบริเวณที่ทายา โดยเฉพาะในเด็ก นอกจากเป็นคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกร
- หลีกเลี่ยงการทายานี้บริเวณใบหน้า ใกล้ดวงตา ข้อพับ รักแร้ และบริเวณผื่นผ้าอ้อม หากไม่ได้รับการคำแนะนำจากแพทย์หรือเภสัชกร
- ไม่ควรใช้ยาต่อไปในกรณีรอยโรคหายหายดีแล้วแต่กลับมาเป็นซ้ำภายใน 2 สัปดาห์ หากไม่ได้รับการแนะนำโดยแพทย์หรือเภสัชกร

3.2 หากลืมทายาควรทำอย่างไร

- ถ้าลืมทายานี้ ควรทาทันทีที่นึกได้
- ถ้าลืมทายานี้แล้วนึกได้เมื่อใกล้ครั้งถัดไป ให้รอทาครั้งถัดไปตามปกติ ด้วยปริมาณยาเท่าเดิม ไม่ควรเพิ่มปริมาณในการทายา

3.3 ถ้าทายานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรงให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที
- หากแผลลอกสะเก็ดหายไปโดยไม่ตั้งใจ ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรงให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- พบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตามผลการรักษาหรืออันตรายจากยา หากใช้ยานี้แล้วมีอาการระคายเคืองผิวหนัง หรือผิวหนังบางลงให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร
- แจ้งแพทย์หรือเภสัชกร หากใช้ยานี้ประมาณ 1 สัปดาห์ แล้วอาการไม่ดีขึ้นหรือมีอาการแย่ลง
- ห้ามหยุดยาเองหรือใช้ยาปริมาณมากเป็นระยะเวลานาน โดยไม่ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร
- หากใช้ยานี้มาเป็นเวลานานและรอยโรคดีขึ้นแล้ว ไม่ควรหยุดยาเอง ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรเพื่อค่อยๆ ปรับลดขนาดยา
- ยานี้ไม่สามารถใช้ทดแทนยาฆ่าเชื้อได้ และอาจทำให้การติดเชื้อนั้นแย่ลงได้ ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรหากสงสัยว่ามีการติดเชื้อ

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

- ลมพิษ บวมที่ใบหน้า เปลือกตาริมฝีปาก
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก หรือมีจ้ำตามผิวหนัง
- อาการของโรคสะเก็ดเงินแย่ลง
- มองเห็นไม่ชัด มีปัญหาการมองเห็น
- ผิวหนังเปลี่ยนสี
- อาการแสดงของการติดเชื้อที่ผิวหนัง เช่น บวม แดง ร้อน และอาการระคายเคืองผิวหนัง มีหนอง หรือน้ำเหลืองซึม ปุ่มรากขนอักเสบ
- แผลบริเวณผิวหนังหายช้า
- หากทายาในปริมาณมากหรือใช้ยาเป็นระยะเวลานาน อาจทำให้เกิดอาการข้างเคียงทั่วร่างกาย เช่น หน้าบวม อ่อนล้า เหนื่อยง่าย มึนงง ขนหรือผมดกขึ้น

“ให้หยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที”

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์

- ระบายเคืองผิวหนัง ผิวหนังแดง ปวดแสบร้อน คัน ผิวหนังแห้ง มีผื่น มีผด ผิวหนังอักเสบ เป็นสิ่ว ผิวหนังดิ่ง ผิวหนังแตก ผิวหนังแตกลาย ผิวหนังลอก
- รู้สึกเหมือนถูกแมลงกัดต่อย มีอาการเป็นเหน็บหรือรู้สึกคล้ายถูกเข็มตำที่ผิวหนัง

“ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์”

6. ควรเก็บยาอย่างไร

- เก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อย่านำให้โดนแสงโดยตรง โดยทั่วไป ควรเก็บที่อุณหภูมิห้องไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

- **ลักษณะยา** ยาครีมสีขาว
- **ตัวยาสำคัญ** โมเมธาโซน ฟูโรเอท (mometasone furoate)
- **ส่วนประกอบอื่นๆ** ได้แก่ เฮกซิลีนไกลคอล (hexylene glycol), โพลีโพรพิลีน ไกลคอล (propylene glycol), น้ำบริสุทธิ์ (purified water), กรดฟอสฟอริก (phosphoric acid), กลีเซอรอล โมโนสเตียเรต 40-55 ชนิดที่ 2 (glycerol monostearate 40-55 type II), เซโทแมโครกอล อิมัลซิไฟอิง แวกซ์ (cetomacrogol emulsifying wax), พาราฟินสีขาว ชนิดอ่อน (white soft paraffin), ทิตาเนียม ไดออกไซด์ (Titanium dioxide), อะลูมิเนียม สตารซ์ ออกเตนิลซัคซิเนต (Aluminum starch octenylsuccinate)

ผู้ผลิต บริษัท ที.โอ. เคมีคอลส์ (1979) จำกัด
280 ซอยสบายใจ ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสน
นอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ 3 ตุลาคม 2567

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.

- <http://www.fda.moph.go.th/sites/oss/Pages/Main.aspx>
- <http://ndi.fda.moph.go.th/>

**เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร**