

ซีลีค็อกซิบ
ความแรง 200 มิลลิกรัม
ชนิดแคปซูล
ชื่อการค้า CELECOXIB T.O.
(ซีลีค็อกซิบ ที.โอ.)

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้มีชื่อว่า ซีลีค็อกซิบ (Celecoxib)

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ยานี้ใช้เพื่อบรรเทาอาการของโรคข้อเสื่อม โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ โรคข้อสันหลังอักเสบชนิดติดยึด
- เพื่อรักษาอาการปวดเฉียบพลัน อาการปวดประจำเดือนชนิดปฐมภูมิ
- เพื่อรักษาอาการปวดหลังส่วนล่าง

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้ หรือแพ้ยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตอรอยด์ตัวอื่น หรือแอสไพริน
- เคยแพ้ยาในกลุ่มซัลโฟนาไมด์
- หญิงตั้งครรภ์ หรือหญิงให้นมทารก
- เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี
- เป็นโรคตับหรือไตบกพร่องรุนแรง
- เป็นโรคหลอดเลือดหัวใจ หัวใจขาดเลือด กล้ามเนื้อหัวใจตาย หัวใจล้มเหลวเลือดคั่ง หรือโรคหลอดเลือดสมอง
- เคยเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบตัน หรือเคยมีภาวะอัมพฤกษ์ อัมพาตจากโรคหลอดเลือดสมอง
- ได้รับการผ่าตัดหลอดเลือดหัวใจในระยะหลังผ่าตัดใหม่ๆ
- มีแผลทะลุที่กระเพาะอาหารหรือลำไส้เล็กส่วนต้น

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ในกรณีต่อไปนี้

- ใช้ยาสมุนไพร อาหารเสริมอื่นอยู่
- อายุมากกว่า 65 ปี
- เคยมีเลือดออกหรือมีแผลที่กระเพาะอาหาร
- เป็นโรคตับหรือไตทำงานผิดปกติ

- เป็นโรคความดันเลือดสูง เบาหวาน หรือไขมันในเลือดสูง สูบบุหรี่ หรือมีอาการบวม (น้ำคั่งในร่างกาย)
- เป็นโรคหืด
- วางแผนจะตั้งครรภ์
- มีการสูญเสีย น้ำ เช่น ไม่สบายและท้องเสีย รับประทานยาขับปัสสาวะ
- กำลังได้รับการรักษาโรคติดเชื้อ เนื่องจากยาซีลีค็อกซิบ ที.โอ. อาจบดบังอาการไข้ซึ่งเป็นอาการแสดงของการติดเชื้อได้
- ผู้ที่มีประวัติการเกิดปฏิกิริยาทางผิวหนังที่ร้ายแรง เช่น ปฏิกิริยาจากยาร่วมกับภาวะที่มีเม็ดเลือดขาวชนิดอีโอซิโนฟิลในเลือดสูงและอาการต่างๆของระบบร่างกาย (กลุ่มอาการ DRESS)

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค
- กินยานี้พร้อมอาหาร

3.2 หากลืมกินยาควรทำอย่างไร

- กินยาที่ลืมทันทีที่นึกขึ้นได้ แต่หากใกล้เวลาที่ต้องกินอีกครั้งไม่ต้องกินยาที่ลืม
- ห้ามกินยาเพิ่มเพื่อชดเชย

3.3 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด และรีบไปโรงพยาบาล พร้อมยานี้หรือาชนะบรรจุทันทีหากมีอาการผิดปกติ

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- ไม่นำยานี้ให้ผู้อื่นกิน แม้ว่าจะเป็นโรคหรือมีอาการเดียวกัน
- หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ ดื่มเหล้าหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ระหว่างใช้ยานี้ เพราะอาจเพิ่มความเสียหายให้ตับและไตทำงานผิดปกติ
- ยานี้อาจทำให้เกิดอาการมึนงงได้ในบางคน หากกินยาแล้วมีอาการมึนงง หรือมองเห็นผิดปกติ ควรหลีกเลี่ยงการขับรถหรือทำงานกับเครื่องจักร
- ควรใช้ยาในขนาดต่ำที่สุดที่ให้ผลในการรักษา ละไม่ควรใช้ยานี้ติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน ยกเว้นในกรณีที่แพทย์แนะนำ

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

- ลมพิษ บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีจำตามผิวหนัง มีไข้ มีอาการคล้ายหวัด
- ตัวเหลือง ตาเหลือง ดีซ่าน ซึ่งอาจเกิดจากความผิดปกติที่ตับ
- เจ็บเค้นหน้าอกรุนแรง
- ปวดท้องรุนแรง มีเลือดออกในทางเดินอาหาร อาเจียนเป็นเลือด อุจจาระสีดำ

“ให้หยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที”

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์

- มึนงง ปวดหัว
- ไม่สบายท้อง คลื่นไส้ อาเจียน ระบบขับถ่ายผิดปกติ ท้องอืด แสบท้อง

“ไม่จำเป็นต้องหยุดยา
แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์”

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อบอุ่น โดยตรง โดยทั่วไป ควรเก็บที่อุณหภูมิต่ำกว่า 30 องศาเซลเซียส ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

- **ลักษณะยา** แคปซูลสีขาวขุ่น-ขาวขุ่น เบอร์ 2 มีตัวอักษรสีเหลือง “CCX” และตัวเลขสีเหลือง “200” บนแคปซูล ภายในบรรจุแกรนูโลสีขาวถึงสีขาวออกเหลืองอ่อน
 - **ตัวยาสำคัญ** ซีลีค็อกซิบ (Celecoxib)
 - **ส่วนประกอบอื่น ๆ** ได้แก่ lactose monohydrate, croscarmellose sodium, povidone K30, sodium lauryl sulfate, talc, และ magnesium stearate
- ผู้ผลิต** บริษัท ที.โอ. เคมีคอลส์ (1979) จำกัด
เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ 1 ตุลาคม 2567

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.

<http://www.fda.moph.go.th/sites/oss/Pages/Main.aspx>

<http://ndi.fda.moph.go.th>