

**ฟิวสิดิก แอซิด**  
**20 มิลลิกรัมต่อ 1 กรัม**  
**ชนิดครีม**  
**ชื่อการค้า TOSIDIC (โทซิดิก)**

**1. ยานี้คืออะไร**

**1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร**

- ยานี้มีชื่อสามัญว่า ฟิวสิดิกแอซิด (fusidic acid)

**1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร**

- ยานี้ใช้เพื่อต้านจุลชีพที่ทำให้เกิดโรคผิวหนังที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย

**2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา**

**2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร**

- เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้

**2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้**

ระมัดระวังเมื่อมีความจำเป็นต้องใช้ยาในบริเวณใกล้ดวงตา เพราะอาจเกิดการระคายเคืองได้

**3. วิธีใช้ยา**

**3.1 ขนาดและวิธีใช้**

ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น

**3.2 หากลืมใช้ยาควรทำอย่างไร**

ใช้ยาทันทีที่นึกได้และใช้ยาครั้งต่อไปตามเวลาปกติ ไม่ต้องเพิ่มขนาดยาเป็น 2 เท่า

**3.3 ถ้าได้รับยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร**

ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง ให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที

**4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา**

- ล้างมือให้สะอาดก่อนใช้ยา ทายาให้ทั่วบริเวณที่เป็น ระวังอย่าให้เข้าตา
- ทายาต่อเนื่องจนกว่าแพทย์สั่งให้หยุดยา
- ถ้าหยุดยาแล้วกลับมีอาการซ้ำให้แจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทันที ถ้าท่านมีคำถามเกี่ยวกับการใช้ยานี้ให้สอบถามแพทย์

**5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา**

**5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที**

- ลมพิษ บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผื่นหนังหลุดลอก มีจ้ำตามผิวหนังหรือเลือดออกผิดปกติ

**“ให้หยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที”**

**5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์**

- เยื่อตาขาวอักเสบ ผื่นแดงคัน

**“ไม่จำเป็นต้องหยุดยา**

**แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์”**

**6. ควรเก็บยานี้อย่างไร**

- เก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อย่านำให้โดนแสงโดยตรง โดยทั่วไปควรเก็บที่อุณหภูมิต่ำกว่า 30 องศาเซลเซียส ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

**7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้**

- **ลักษณะยา** ครีม สีขาว บรรจุในหลอดอะลูมิเนียมหลอดละ 5 กรัม และบรรจุในกล่องกระดาษละ 1 หลอด
- **ตัวยาสำคัญ** ฟิวสิดิกแอซิด
- **ส่วนประกอบอื่น ๆ** ได้แก่

พาราฟินอ่อนชนิดขาว พาราฟินเหลวชนิดเบา ซีดีลแอลกอฮอล์ บิวทิลเลตไฮดรอกซีเอนิโซล ซอร์บิแทนสเตียเรต โพลีซอร์เบต 60 เอทิลเทตโดโซเดียม โซเดียมซีเตรตไดไฮเดรต แอนไฮดรัสซิงก์แอซิด เมธิลพาราเบน โพรพิลพาราเบน โพรพิลีนกลัยคอล กลีเซอริน และน้ำ

ผู้ผลิต บริษัท ที.โอ. เคมีคอลส์ (1979) จำกัด

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ 11 พฤศจิกายน 2567

**ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.**

<http://www.fda.moph.go.th/sites/oss/Pages/Main.aspx>

<http://ndi.fda.moph.go.th>

**คำเตือนตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข**

1. ห้ามใช้ในผู้ที่แพ้ยานี้
2. ยานี้อาจทำให้เกิดอันตรายต่อดับได้

**เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร**