

**แพนโทพราโซล**  
**ความแรง 40 มิลลิกรัม**  
**ชนิดเม็ดเคลือบให้แตกตัวในลำไส้**  
**ชื่อการค้า PANTOPRAZOLE T.O. 40 MG**  
**(แพนโทพราโซล ที.โอ. 40 มก.)**

**1. ยานี้คืออะไร**

**1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร**  
• ยานี้มีชื่อว่า แพนโทพราโซล (pantoprazole) เป็นยาในกลุ่มยับยั้งการหลั่งกรดในกระเพาะอาหาร

**1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร**  
เด็ก: ยานี้ใช้เพื่อรักษา  
ผู้ใหญ่: ยานี้ใช้เพื่อรักษา

- โรคหลอดอาหารอักเสบ
- ใช้ร่วมกับยาปฏิชีวนะที่เหมาะสม 2 ชนิดในการกำจัดเชื้อ *Helicobacter pylori* ซึ่งเป็นสาเหตุของการกลับเป็นซ้ำของแผลในกระเพาะอาหารหรือลำไส้เล็กส่วนต้นของผู้ป่วยที่เป็นโรคแผลในกระเพาะอาหาร
- แผลในลำไส้เล็กส่วนต้น
- แผลในกระเพาะอาหาร
- โรคโซลลิงเกอร์-เอลลิสัน และภาวะที่มีการหลั่งกรดสูงอื่นๆ

**2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา**

**2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร**  
• เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้ หรือยาอื่นในกลุ่มยับยั้งการหลั่งกรดในกระเพาะอาหาร

**2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้**  
**ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ในกรณีต่อไปนี้**  
- ผู้ป่วยที่มีการทำงานของตับบกพร่อง  
- หญิงมีครรภ์ และหญิงให้นมบุตร  
- ใช้ยาด้านการแข็งตัวของเลือด

- กำลังใช้ “ยา อาหารเสริม สมุนไพร” อื่นๆร่วมด้วย เพราะอาจมีผลต่อการรักษาหรือเกิดอันตรายได้

**3. วิธีใช้ยา**

**3.1 ขนาดและวิธีใช้**  
• **ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกร** เท่านั้น เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค  
• กินยานี้ก่อนอาหาร 1 ชั่วโมง  
• ยานี้ควรกลืนยาทั้งเม็ด ห้ามแบ่งหรือบดเคี้ยวเม็ดยา

**3.2 หากลืมกินยาควรทำอย่างไร**  
• กินทันทีที่นึกขึ้นได้ แต่ถ้าใกล้เวลาของยามื้อต่อไปให้รอกินยาของมื้อต่อไป ห้ามกินยาเพิ่มเป็น 2 เท่า

**3.3 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร**  
• ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง ให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที

**4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา**

• ให้กินยานี้ติดต่อกันทุกวันจนครบตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกร หากอาการยังไม่หายขาดควรรักษาต่อไปอีกระยะหนึ่ง

**5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา**

**5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วไปพบแพทย์ทันที**  
• ลมพิษ บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก  
• หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก  
• ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีจุดตามผิวหนังหรือเลือดออกผิดปกติ  
• เป็นตะคริว  
• กระดูกร้าว กระดูกหัก

**“ให้หยุดยาแล้วไปพบแพทย์ทันที”**  
**5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์**  
• คลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง ท้องเสีย  
• เวียนศีรษะ ปวดหัว

**“ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์”**

**6. ควรเก็บยานี้อย่างไร**

- เก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง ปล่อยให้โดนแสงโดยตรง โดยทั่วไปควรเก็บที่อุณหภูมิต่ำกว่า 30 องศาเซลเซียส ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก
- ห้ามนำยานี้ให้ผู้อื่นกิน ถึงแม้ว่าจะมีอาการหรือโรคเช่นเดียวกับท่าน

**7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้**

- **ลักษณะยา** เม็ดรูปรีนูนทั้งสองด้าน เคลือบฟิล์มสีเหลืองอ่อน
- **ตัวยาสำคัญ** แพนโทพราโซล (Pantoprazole)
- **ส่วนประกอบอื่น ๆ** ได้แก่ โซเดียมคาร์บอเนตแอนไฮไดรต์ ผงแมนนิทอล ครอสโพรโโดนชนิด เอ โพรโโดน เค30 โพรโโดน เค90 ครอสโพรโโดนชนิด บี แคลเซียมสเตียเรต ไฮโพรเมลโลส อี5 ไทเทเนียมไดออกไซด์ เพอร์ริคออกไซด์เยลโล โพรพิลีนไกลคอล เมททาโครลิกแอซิด และเอทิลอะคริเลตโคโพลิเมอร์ (1:1) ไตรเอทิลซีเตรด และ ทาลคัม

**ผู้ผลิต** บริษัท ที.โอ. เคมีคอลส์ (1979) จำกัด  
53 ถนนเลียบคลอง 7 ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150 ประเทศไทย  
**เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ** 28 สิงหาคม 2567

**ศึกษาข้อมูลยาเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.**  
<http://www.fda.moph.go.th/sites/oss/PAGes/Main.aspx>  
<http://ndi.fda.moph.go.th>

**เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ**  
**หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร**