

ลิวฟล็อกซาซิน

ความแรง 5 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร

ชนิดหยอดตา

ชื่อการค้า LEVO-OPH (เลโว-ออฟ)

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้มีชื่อว่า ลิวฟล็อกซาซิน (levofloxacin) มีตัวยา 5 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร เป็นยาในกลุ่มควิโนโลน

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

ยานี้ใช้เพื่อรักษาโรคติดเชื้อทางตาที่แพทย์ตรวจแล้วว่าต้องใช้ยานี้

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้ หรือยาอื่นในกลุ่มควิโนโลน

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

- ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ในกรณีต่อไปนี้
 - เด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี
 - กำลังท้อง วางแผนที่จะท้อง หรืออยู่ในระยะให้นมลูก
 - กำลังใช้ยาสมุนไพร หรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอื่นๆ

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือ เภสัชกร เท่านั้น เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค
- ล้างมือให้สะอาดก่อนหยอดยา
- ถอดคอนแทคเลนส์ก่อนหยอดตา
- ใช้หยอดตาข้างที่เป็นครั้งละ 1 หยด ระวังไม่ให้ปลายขวดยาสัมผัสกับตา
- หยอดได้ไม่เกิน 3 ครั้งต่อวัน

3.2 หากลืมหยอดยาควรทำอย่างไร

- หากลืมหยอดยา ให้รอหยอดยาของรอบถัดไป และห้ามหยอดยาเพิ่มเป็นสองเท่า

3.3 ถ้าหยอดยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง เช่น คลื่นไส้ อาเจียน วิงเวียนศีรษะ ง่วงซึม งงง พุดไม่ชัด ลิ้นแข็ง ให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- ให้หยอดยานี้ติดต่อกันทุกวันจนครบตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรแม้อาการจะดีขึ้นแล้วก็ตามิฉะนั้นเชื้อจะดื้อยา
- ไม่ควรใส่คอนแทคเลนส์ขณะมีการติดเชื้อทางตา
- ห้ามใช้ยาหยอดตาาร่วมกับผู้อื่น
- ถ้ามียาหยอดตา หรือยาป้ายตาชนิดอื่นที่ใช้ร่วมกัน ให้เว้นระยะห่างในการหยอดตาแต่ละชนิดอย่างน้อย 15 นาที
- ถ้าใช้ยาจนครบระยะเวลาที่แพทย์สั่งแล้วอาการไม่ดีขึ้น ให้ปรึกษาแพทย์ทันที
- ระมัดระวังการขับขียานยนต์ หรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกล หรือทำงานที่เสี่ยงต่อการพลัดตกจากที่สูง

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

- ลมพิษ บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีฝ้าตามผิวหนังหรือเลือดออกผิดปกติ
- ตาแดงบวมมากขึ้น คันตามากขึ้น เปลือกตาบวม
- ปวดกล้ามเนื้อ ปวดเอ็นข้อมือหรือข้อเท้า

“ให้หยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที”

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์

- แสบตา ตามัว หรือมีเมือกในลูกตา
- ระคายเคืองตา ปวดตา เยื่อบุตาบวมแดง ตาไม่ทนแสง ตาแฉะ มีฝื่นรอบตา

“ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์”

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อย่านำให้โดนแสงโดยตรง โดยทั่วไปควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- ไม่ควรใช้ยาหลังจากเปิดใช้แล้วหนึ่งเดือน
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

ลักษณะยา: นํ้ายาปราศจากเชื้อ สี สีเหลืองอ่อน สำหรับหยอดตา

ตัวยาสำคัญ: ลิวฟล็อกซาซิน 5 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร

ส่วนประกอบอื่นๆ: โซเดียมคลอไรด์ เบนซาลโคเนียมคลอไรด์ น้ำ และปรับ pH ด้วยกรดไฮโดรคลอริกและ/หรือโซเดียมไฮดรอกไซด์ ให้อยู่ในช่วง 6.2 - 6.8

ผู้ผลิต/ผู้แทนจำหน่าย:

บริษัท ที.โอ.เคมิคอลส์ (1979) จำกัด

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ: กรกฎาคม 2567

ศึกษาข้อมูลยาเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.

<http://www.fda.moph.go.th/sites/oss/PAGes/Main.aspx>
<http://ndi.fda.moph.go.th>

คำเตือนตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข

- ห้ามใช้ยานี้ในผู้ที่แพ้ยานี้ หรือยาในกลุ่มควิโนโลนตัวอื่นๆ
- หากใช้ยานี้แล้วมีอาการตาแดง บวมมากขึ้น หรือมีผื่นขึ้น ปวดเมื่อย ปวดกล้ามเนื้อ ปวดเอ็นข้อมือหรือข้อเท้า ให้รีบหยุดยาและปรึกษาแพทย์ทันที
- ยานี้อาจทำให้เกิดอันตรายต่อดับ ไตได้

**เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร**