

พิเพอราซิลลิน/ทาโซแบ็กแทม
ความแรง 4 กรัม/0.5 กรัม
ชนิดฉีด

ชื่อการค้า TAZOPET (ทาโซเพท)

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้มีชื่อว่าพิเพอราซิลลินโซเดียมและทาโซแบ็กแทมโซเดียม (piperacillin sodium/ tazobactam sodium) ซึ่งเป็นยาปฏิชีวนะในกลุ่มเพนิซิลลินผสมกับยาต้านเอนไซม์เบตาแล็กทาเมส

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ยานี้ใช้เพื่อรักษาโรคติดเชื้อแบคทีเรียแบบรุนแรงที่ไวต่อยานี้ ได้แก่
 - ติดเชื้อภายในช่องท้อง เช่น ไส้ติ่งอักเสบ เยื่อช่องท้องอักเสบ
 - ติดเชื้อในท่อทางเดินน้ำดี
 - ปอดอักเสบจากการติดเชื้อ
 - ติดเชื้อที่ผิวหนัง
 - ติดเชื้อในเลือด
 - ติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ
 - มีไข้และตรวจพบเม็ดเลือดขาวชนิดนิวโทรฟิลต่ำ

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้ หรือยาอื่นในกลุ่มเพนิซิลลิน กลุ่มเซฟาโลสปอริน หรือยาอื่นในกลุ่มเบตาแล็กแทม

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ในกรณีต่อไปนี้

- มีประวัติการแพ้ยาหลายชนิด
- มีอาการผื่นแดง ระบายเคืองหรือบวม
- ท้องร่วง
- โรคไตบกพร่อง หรือกำลังฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
- ระดับโพแทสเซียมในเลือดต่ำ
- ต้องจำกัดเกลือโซเดียม
- เป็นโรคซิสติกไฟโบรซิสซึ่งเป็นโรคทางกรรมพันธุ์ชนิดหนึ่ง
 - ⊗ *ไม่ควรใช้ยานี้ร่วมกับยา อาหาร สมุนไพร หรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบางชนิด* เพราะอาจมีผลต่อการรักษาหรือเกิดอันตรายได้ เช่น
 - ยาคลายกล้ามเนื้อบางชนิด เช่น เวคูโรเนียม
 - ยาด้านการแข็งตัวของเลือด เช่น วอร์ฟารินโซเดียม
 - ยาเมโทรทริกเซดซึ่งใช้รักษามะเร็ง โรคข้อและเรื้อนกวาง
 - ยาโพรเบนเซดซึ่งใช้รักษาโรคเกาต์
 - ยาด้านเชื้อแบคทีเรียอื่นบางชนิด เช่น แวนโคไมซิน ยาเทตระไซคลิน

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค
- ยานี้ใช้สำหรับหยดเข้าสู่หลอดเลือดดำภายใต้การดูแลของแพทย์หรือพยาบาล

3.2 ถ้าฉีดยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง เช่น ชัก ให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- ให้รับยานี้ติดต่อกันทุกวันจนครบตามคำแนะนำของแพทย์ หรือเภสัชกร แม้อาการดีขึ้นแล้วก็ตาม

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องแจ้งแพทย์เพื่อหยุดยา หรือหากเกิดอาการหลังออกจากโรงพยาบาลต้องรีบไปพบแพทย์ทันที

- ลมพิษ บวมที่ใบหน้า เปลือกตาริมฝีปาก
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผื่นหนังหลุดลอก มีจ้ำตามผิวหนัง หรือเลือดออกผิดปกติ
- ตาเหลือง ตัวเหลือง
- ท้องร่วงรุนแรง ร่วมกับมีไข้ หรืออ่อนเพลีย
- บัสสาวะสีแดง หรือน้ำตาล
- เลือดกำเดาไหล หรือมีรอยฟกช้ำ
- ชัก

“หากมีอาการเหล่านี้ ให้แจ้งแพทย์ พยาบาล หรือเภสัชกรทันที”

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้แจ้งแพทย์หรือพยาบาล

- ปวดศีรษะ นอนไม่หลับ
- แผลในปาก
- คลื่นไส้ อาเจียน ท้องผูก อาหารไม่ย่อย ปวดท้อง
- ความดันเลือดต่ำ
- ปวด บวม หลอดเลือดดำอักเสบบริเวณที่ฉีดยา
- ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ปวดข้อ

“ให้รอดูอาการ แต่ถ้ามีอาการรุนแรง ให้แจ้งแพทย์ พยาบาล หรือเภสัชกร”

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- ยานี้เก็บไว้ที่โรงพยาบาล ท่านจะไม่ได้รับกลับบ้าน
- เก็บยาในที่แห้ง อย่าให้โดนแสงโดยตรง โดยทั่วไปควรเก็บที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส
- ห้ามเก็บยาในช่องแช่แข็ง

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

• ลักษณะยา

ผงยาปราศจากเชื้อสีขาวถึงสีขาวออกเหลืองอ่อน

• ตัวอย่างสำคัญ

ฟิเพอราซิลลินโซเดียมและทาโซแบ็กแอมโซเดียม

- ส่วนประกอบอื่น ๆ ได้แก่ Sodium Bicarbonate (โซเดียมไบคาร์บอเนต)

ผู้ผลิต Shandong Anxin Pharmaceutical Co. Ltd., Jinan, China

ผู้นำเข้า บริษัท แชนดอส (ประเทศไทย) จำกัด กรุงเทพฯ ประเทศไทย

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ 09/2567

ศึกษาข้อมูลยาเพิ่มเติมทางเว็บไซต์

ของ อย.

- <http://www.fda.moph.go.th/sites/oss/Pages/Main.aspx>
- <http://ndi.fda.moph.go.th/>

คำเตือนตามประกาศฯ

1. ห้ามใช้ในผู้ที่เคยแพ้ยานี้
2. ยานี้อาจทำให้เกิดการแพ้และเป็นอันตรายถึงชีวิต
3. หากเกิดอาการผื่นแดง ระคายเคืองหรือบวม ให้หยุดใช้ยาและปรึกษาแพทย์

**เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร**