

โพลีมิกซินบี
ความแรง 500,000 ยูนิต ชนิดฉีด
ชื่อการค้า
POLIZ-B
(500,000 UNITS FOR INJECTION)
(โพลีซ-บี (500,000 ยูนิต ชนิดฉีด))

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้มีชื่อว่าโพลีมิกซินบี (polymyxin B)
- เป็นยาปฏิชีวนะในกลุ่มโพลีมิกซิน

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ยานี้ใช้เพื่อรักษาการติดเชื้อแบคทีเรียแกรมลบที่รุนแรง และไม่สามารถใช้ยาปฏิชีวนะตัวอื่นได้ โดยแพทย์พิจารณาแล้วว่าเหมาะสมที่จะใช้ยานี้

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้
- เป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

- ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ในกรณีต่อไปนี้
 - เป็นโรคไต
 - เป็นโรคเลือดที่ชื่อว่า โรคพอร์ไฟเรีย
 - หญิงตั้งครรภ์ ควรระมัดระวังการใช้ยานี้ตลอดช่วงการตั้งครรภ์ ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยานี้ เพราะไม่มีข้อมูลยืนยันความปลอดภัย
 - หญิงให้นมลูก ควรระมัดระวังการใช้ยานี้ ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยา เพราะไม่มีข้อมูลยืนยันความปลอดภัย

- กำลังใช้ยาบางชนิดเพราะอาจมีผลต่อการรักษาหรือเกิดอันตรายได้ เช่น แบซิเทรซิน คานาไมซิน สเตรปโทมัยซิน โทบรามัยซิน แอมิเคซิน เซฟาโลริติน เซฟาโลทิน พาโรโมมัยซิน พอลีมิกซินอี (โคลิสทิน) นีโอะไมซิน เจนทาไมซิน แวนโคไมซิน ฟูโรซิมิด แต่หากท่านไม่แน่ใจว่ามีภาวะหรือใช้ยาเหล่านี้อยู่ โปรดปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือ เภสัชกร เท่านั้น เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค
- ยานี้ใช้ในโรงพยาบาลเท่านั้น
- แพทย์หรือพยาบาลจะเป็นผู้ฉีดยาให้กับท่าน โดยหยุดเข้าหลอดเลือดดำ

3.2 หากลืมมาฉีดยาควรทำอย่างไร

- หากท่านสงสัยว่าไม่ได้รับยาตามเวลาที่กำหนด ให้แจ้งแพทย์ พยาบาล หรือเภสัชกร

3.3 หากสงสัยว่าได้รับยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง เช่น หายใจลำบาก กล้ามเนื้ออ่อนแรง พูดไม่ชัด ลิ้นแข็ง ให้แจ้งแพทย์หรือพยาบาลทันที

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- ให้รับยานี้ติดต่อกันทุกวันจนครบตามคำแนะนำของแพทย์ หรือเภสัชกร แม้อาการจะดีขึ้นแล้วก็ตาม มิฉะนั้นเชื้อจะดื้อยา

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องแจ้งแพทย์ พยาบาล หรือเภสัชกรทันที

- ลมพิษ บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก หรือ มีจุดตามผิวหนัง
- อาการชาคล้ายเข็มที่มรอบใบหน้า ชาปลายมือปลายเท้า
- ชัก กล้ามเนื้ออ่อนแรง ทรงตัวลำบาก
- มองเห็นไม่ชัด พูดไม่ชัด สับสน

“หากมีอาการเหล่านี้ ให้แจ้งแพทย์ พยาบาล หรือเภสัชกรทันที”

5.2 อาการที่อาจเกิดขึ้นได้และให้รอดอาการ แต่ ถ้ามีอาการรุนแรงให้แจ้งแพทย์ เภสัชกร หรือ พยาบาล

- ปวด บวม หรือแดงบริเวณที่ฉีดยา
- มึนงง เวียนศีรษะ ง่วงนอน
- ใบหน้าแดง ร้อนวูบวาบ
- บั๊สภาวะน้อยผิดปกติ

“ให้รอดอาการ แต่ถ้ามีอาการรุนแรง ให้แจ้งแพทย์ พยาบาล หรือเภสัชกร”

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- ยานี้เก็บไว้ที่โรงพยาบาล ท่านจะไม่ได้รับกลับบ้าน

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

- ลักษณะยา
ในยา 1 กล่อง ประกอบด้วย ขวดแก้วบรรจุผงยาปราศจากเชื้อ สีขาวถึงสีน้ำตาลอ่อนออกเหลือง สำหรับผสมน้ำยาทำลายเชื้อชนิด
- **ตัวยาสําคัญ** โพลีมิกซินบี
- **ส่วนประกอบอื่น ๆ** น้ำสำหรับยาฉีด

ผู้ผลิต

บริษัท สยามเภสัช จำกัด

123 ซอยโชคชัยร่วมมิตร ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล

เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ประเทศไทย

และเลขที่ 9 ซอยโชคชัยร่วมมิตร 3 ถนนวิภาวดีรังสิต

แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 ประเทศไทย

ผู้แทนจำหน่าย

บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด

171/1-2 ซอยโชคชัยร่วมมิตร ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล

เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ประเทศไทย

โทร. 02-6259999

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ (06/11/2024)

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.

- <http://ndi.fda.moph.go.th/>

คำเตือนตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข

1. ห้ามใช้ในผู้ที่แพ้ยานี้
2. ยานี้อาจทำให้เกิดอันตรายต่อไต และระบบประสาทได้

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ

หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร