

โรวาร็อกซาแบน
ความแรง 15 และ 20 มิลลิกรัม
ชนิดเม็ดเคลือบฟิล์ม
ชื่อการค้า VEBROZ (15 MG TABLET)
(เวบรอกซ์ (15 มก. ชนิดเม็ด))
และ
VEBROZ (20 MG TABLET)
(เวบรอกซ์ (20 มก. ชนิดเม็ด))

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

ยานี้มีชื่อว่า โรวาร็อกซาแบน เป็นยาในกลุ่มยาต้านการแข็งตัวของเลือด

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ยานี้ใช้ในผู้ใหญ่เพื่อป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดสมองและลิ่มเลือดอุดตันหลอดเลือดอื่นๆ
- ยานี้ใช้ในผู้ใหญ่เพื่อรักษาภาวะลิ่มเลือดอุดตันหลอดเลือดดำที่ขา และภาวะลิ่มเลือดอุดตันหลอดเลือดที่ปอดและป้องกันการกลับเป็นซ้ำ

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไหร่

- × ห้ามใช้ในผู้ที่แพ้ยานี้หรือส่วนประกอบของยานี้
- × ห้ามใช้ในผู้ที่กำลังมีเลือดออกมากผิดปกติ
- × ห้ามใช้ในผู้ที่มีโรคหรือภาวะที่เพิ่มความเสี่ยงต่อการมีเลือดออกอย่างรุนแรง (เช่น แผลในกระเพาะอาหาร, อาการบาดเจ็บหรือมีเลือดออกในสมอง, เพิ่งผ่าตัดสมองหรือดวงตาเมื่อไม่นานมานี้)
- × ห้ามใช้ในผู้ที่กำลังใช้ยาอื่นเพื่อป้องกันการแข็งตัวของเลือด ได้แก่ วาร์ฟาริน ดาบีคาแทรน เอพิซาแบน หรือเฮพาริน
- × ห้ามใช้ในผู้ป่วยโรคตับ
- × ห้ามใช้ในหญิงกำลังตั้งท้องหรือวางแผนที่จะมีลูก
- × ห้ามใช้ในหญิงกำลังให้นมลูก

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

- ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ในกรณีต่อไปนี้
 - มีความเสี่ยงต่อการเกิดเลือดออกเพิ่มขึ้น ซึ่งอาจมีได้ในกรณีต่อไปนี้
 - ภาวะไตทำงานบกพร่องปานกลางและรุนแรง
 - มีความดันเลือดสูงซึ่งรุนแรงที่ควบคุมไม่ได้
 - มีแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้เมื่อเร็วๆนี้
 - ใส่ลิ้นหัวใจเทียม
 - มีความดันเลือดไม่คงที่หรือมีกำลังจะผ่าตัดเพื่อเอาลิ้นเลือดออกจากปอด
 - มีความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกันที่เป็นสาเหตุให้เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดลิ่มเลือดอุดตัน หลอดเลือด
- เป็นเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี
- ใช้ยา สมุนไพร หรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอื่นอยู่

สอบถามแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยานี้
หากไม่แน่ใจว่ามีอาการดังกล่าวหรือไม่

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- **ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น** เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค
- กินยานี้พร้อมอาหาร

3.2 หากลืมหินยานี้ ควรทำอย่างไร

- ให้กินยาทันทีที่นึกได้ และกินยาเม็ดต่อไปในวันถัดไปตามที่กำหนด ห้ามกินยาเพิ่มเป็น 2 เท่า

3.3 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง เช่น เลือดออกผิดปกติ ให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- ห้ามหยุดยาเอง และให้กินยานี้อย่างต่อเนื่องตามคำแนะนำของแพทย์ หรือเภสัชกร
- ผู้หญิงต้องคุมกำเนิดด้วยวิธีที่มีประสิทธิภาพในระหว่างได้รับยา
- ระมัดระวังการขับชี่ยานยนต์ การทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร หรือการทำงานที่เสี่ยงต่อการพลัดตกจากที่สูง เพราะยานี้อาจทำให้วิงเวียนหรือเป็นลมได้

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

- ลมพิษ บวมที่ใบหน้า เปลือกตาริมฝีปาก
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีจ้ำตามผิวหนัง
- ปวดหัว อาเจียน ชัก หมดสติ หรือคอแข็ง
- เลือดออกมากหรือนานผิดปกติ เช่น เลือดออกในตา เลือดกำเดาไหล เลือดออกที่เหงือก ไอมีเลือดปน ปัสสาวะมีเลือดออก ประจำเดือนมากผิดปกติ
- อ่อนแรง อ่อนเพลีย เวียนศีรษะ บวมโดยไม่มีสาเหตุ หายใจหอบ

“ให้หยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที”

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์

- ผิวหนังซีด
- รู้สึกไม่สบาย มีไข้
- ปวดแขนขา
- ปวดท้อง อาหารไม่ย่อย คลื่นไส้ ท้องผูก ท้องเสีย

“ไม่จำเป็นต้องหยุดยา
แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์”

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อบอุ่นโดยตรง โดยทั่วไป ควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

- **ลักษณะยา:**

เม็ดรูปกลม นูน เคลือบฟิล์มสีแดงออกน้ำตาล ด้านหนึ่งมีเครื่องหมายการค้าบริษัท "A" อีกด้านหนึ่งมีอักษรและตัวเลข "R15"

หรือ เม็ดรูปกลม นูน เคลือบฟิล์มสีแดงเข้ม ด้านหนึ่งมีเครื่องหมายการค้าบริษัท "A" อีกด้านหนึ่งมีอักษรและตัวเลข "R20"

- **ตัวยาสําคัญ:** ไรวาร็อกซาแบน 15 หรือ 20 มิลลิกรัม

- **ส่วนประกอบอื่นๆ**

ไฮโปรมेलโลส, โซเดียมลอริลซัลเฟต, ไมโครคริสตัลไลน์เซลลูโลส, แลคโตสโมโนไฮเดรต, ครอสคาเมลโลสโซเดียม, แมกนีเซียมสเตียเรท, พอลิเอทิลีนไกลคอล, เทเทเนียมไดออกไซด์, ไอเอิร์นออกไซด์, เพียวริฟายวอเตอร์

ผู้ผลิต

บริษัท สยามเภสัช จำกัด

123 ซอยโชคชัยร่วมมิตร ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ประเทศไทย และเลขที่ 9 ซอยโชคชัยร่วมมิตร 3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 ประเทศไทย

ผู้แทนจำหน่าย

บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด

171/1-2 ซอยโชคชัยร่วมมิตร ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ประเทศไทย โทร. 02-6259999

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ (22/10/2024)

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.

- <http://www.fda.moph.go.th/sites/oss/Pages/Main.aspx>
- <http://ndi.fda.moph.go.th/>

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร