

ดูแอสเทอไรด์
ความแรง 0.5 มิลลิกรัม
ชนิดแคปซูลนิ่ม
ชื่อการค้า Dutasvitae 0.5 mg
(ดูแอสวีไทด์ 0.5 มก.)

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้มีชื่อว่า ดูแอสเทอไรด์ (Dutasteride) มีตัวยา 0.5 มิลลิกรัม เป็นยาในกลุ่มสอโรโมนเพศชาย

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

ยานี้ใช้เพื่อ รักษาโรคต่อมลูกหมากโต

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้
- ห้ามใช้ยาในเด็กและผู้หญิง
- ห้ามใช้ยาในผู้ป่วยที่ตับบกพร่องรุนแรง

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ในกรณีต่อไปนี้

- มีการทำงานของตับบกพร่อง
- พบก้อนเนื้อหรือสารคัดหลั่งจากหัวนม

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือ เภสัชกร เท่านั้น เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค
- กินยานี้ วันละ 1 ครั้ง ในเวลาเดียวกันของแต่ละวัน
- ควรกลืนยาทั้งแคปซูล ไม่ควรเคี้ยวหรือแกะแคปซูล
- ยานี้กินก่อนหรือหลังกินอาหารก็ได้

3.2 หากลืมกินยาควรทำอย่างไร

- ให้กินยาทันทีที่นึกได้ แต่หากใกล้เวลาของมื้อถัดไป ให้รอกินยาของมื้อถัดไป โดยไม่เพิ่มขนาดยาเป็น 2 เท่า

3.3 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรงให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- ห้ามหยุดยาเอง และให้กินยานี้อย่างต่อเนื่องตามคำแนะนำของแพทย์ หรือเภสัชกร
- สวมถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์
- เด็ก วัยรุ่น หรือผู้หญิง หากสัมผัสตัวยาที่บรรจุในแคปซูล ให้ล้างบริเวณที่สัมผัสด้วยสบู่ทันที

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

- ลมพิษ บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก
- หน้ามืด เป็นลม แขนหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีจ้ำตามผิวหนังหรือเลือดออกผิดปกติ
- รู้สึกซึมเศร้า
- อ่อนเพลีย เหนื่อยง่าย หายใจลำบากเมื่อนอนหงาย ข้อเท้าหรือเท้าบวม

“ให้หยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที”

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์

- หย่อนสมรรถภาพทางเพศ
- มีความต้องการทางเพศลดลง
- มีความผิดปกติของการหลังอสุจิ
- มีความผิดปกติของเต้านม เช่น เจ็บเต้านม หรือเต้านมขยายใหญ่ขึ้น

“ไม่จำเป็นต้องหยุดยา

แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์”

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อย่าให้โดนแสงโดยตรง โดยทั่วไป ควรเก็บที่อุณหภูมิต่ำกว่า 30 องศาเซลเซียส ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

ระบุลักษณะและสีของยา และระบุส่วนประกอบในตำรับ

ลักษณะยา: แคปซูลชนิดนิ่มรูปยาวปลายมนทั้งสองด้าน สีเหลืองทึบแสง ภายในบรรจุของเหลวเป็นน้ำมันสีเหลือง

ตัวยาสำคัญ: ดูแอสเทอไรด์ 0.5 มิลลิกรัม

ส่วนประกอบอื่นๆ: บิวทิลไฮดรอกซีโทลูอิน

(butylhydroxytoluene), กลีเซอรอลโมโนแคปรีท

โกลคาเพรท (glycerol monocaprylocaprate), เจ

ลาติน (gelatin), กลีเซอรอล (glycerol),

ไทเทเนียม ไดออกไซด์ (titanium dioxide), เยล

โลไอร์รอน ออกไซด์ อี 172 (yellow iron oxide

E172), มีเดียมเชน ไตรกลีเซอไรด์ (medium

chain triglyceride), เลซิทีน (lecithin), เพียวริ

ไฟด์วอเตอร์ (purified water)

ผู้ผลิต: ซินเดีย ฟาร์มา เอส.แอล. ประเทศสเปน

ผู้นำเข้า: บริษัท ที.โอ.เมด จำกัด

กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ 6 มิถุนายน 2567

ศึกษาข้อมูลยาเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.

<https://druglink.fda.moph.go.th/U1DR1C1052670>

017611C

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร