

มิลิฟริสโตน 200 มิลลิกรัม และ
ไมโซพรอสตอล 200 ไมโครกรัม
ชนิดเม็ด
ชื่อการค้า MISOMIFE-FEM COMBO
(ไมโซไมเฟ-เฟม คอมโบ)

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อว่าอะไร

- ยานี้เป็นยาสูตรผสม มีตัวยา คือ มิลิฟริสโตน (mifepristone) 1 เม็ด และไมโซพรอสตอล (misoprostol) 4 เม็ด

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ยานี้ใช้สำหรับยุติการตั้งครรภ์

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- × เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้ หรือแพ้ยาในกลุ่มพรอสตาแกลนดิน
- × เป็นโรคต่อมหมวกไตวาย
- × เป็นโรคหอบหืดรุนแรงที่ไม่สามารถควบคุมได้ด้วยยา
- × เป็นโรคเลือดออก หรือฟอรัเรีย
- × แพทย์ยังไม่ยืนยันว่ากำลังตั้งครรภ์
- × ตั้งครรภ์นอกมดลูก หรือสงสัยว่าตั้งครรภ์นอกมดลูก

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

- ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ในกรณีต่อไปนี้
 - เป็นโรคหัวใจหรือแพทย์แจ้งว่ามีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจ
 - มีเลือดออกผิดปกติ หรือเป็นโรคเลือดออกง่าย หรือเป็นโรคโลหิตจาง
 - เป็นโรคตับหรือไต
 - มีภาวะขาดสารอาหาร
 - เคยใช้ยานี้แล้วมีภาวะอัมพาตที่ใบหน้า
 - มีการตัดหรือขลิบอวัยวะเพศ
 - กำลังใช้ยาคอร์ติโคสเตียรอยด์รักษาหอบหืด
- หากใส่ห่วงอนามัยคุมกำเนิด จะต้องเอาออกก่อนการรักษา
- ต้องตรวจหมู่เลือดอาร์เอชก่อนใช้ยานี้
- แจ้งแพทย์ หากกำลังใช้ยา สมุนไพร หรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เพราะอาจมีผลต่อการรักษา หรือเกิดอันตรายได้

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ ขึ้นกับอายุครรภ์
- แพทย์จะแจ้งวิธีใช้ยา โดยกินยา เหน็บยาที่ช่องคลอด หรือแพทย์อาจให้ท่านอมยาใต้ลิ้น หรืออมข้างกระพุ้งแก้ม ทั้งนี้ขึ้นกับดุลยพินิจของแพทย์
- อย่าดื่มน้ำเกรฟฟรุตพร้อมกับยานี้

3.2 หากลืมกินหรือเหน็บยาควรทำอย่างไร

- ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรเมื่อลืมกินยานี้
- ให้ปรึกษาแพทย์ หากเปลี่ยนใจว่าจะตั้งครรภ์ต่อ

3.3 ถ้ากินหรือเหน็บยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- หากท่านใช้ยาเกินขนาดโดยไม่ตั้งใจ ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง เช่น มีไข้ ความดันเลือดผิดปกติ คลื่นไส้ ปวดท้อง มีอาการอื่น ให้แจ้งแพทย์หรือพยาบาลทันที

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- ใช้ยาจนครบตามที่แพทย์สั่ง
- ยานี้อาจทำให้ปวดหัวและเวียนหัว หากมีอาการ ควรหลีกเลี่ยงการขับชี่ ยานยนต์หรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกล หรืองานที่เสี่ยงต่อการพลัดตกจากที่สูง
- ต้องคุมกำเนิดภายใน 9 วัน นับตั้งแต่เริ่มกินยานี้

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องแจ้งแพทย์ เภสัชกร หรือพยาบาลทันที

- ลมพิษ บวมที่ใบหน้า เปลือกตาริมฝีปาก
 - หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
 - ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีจ้ำตามผิวหนัง หรือเลือดออกผิดปกติ
 - ปวดท้องรุนแรง
 - เลือดไหลจากช่องคลอดไม่หยุด
 - มีไข้ต่อเนื่องนานกว่าสี่ชั่วโมง หรือตกขาวมีกลิ่นไม่พึงประสงค์
 - กินยาแก้ปวดแล้วไม่หายปวด
- "หากมีอาการเหล่านี้ ให้แจ้งแพทย์ เภสัชกร หรือพยาบาลทันที"**

5.2 อาการที่อาจเกิดขึ้นได้และให้รอดอาการ แต่ ถ้ามีอาการรุนแรงให้แจ้งแพทย์ เภสัชกร หรือพยาบาล

- มดลูกหดเกร็ง
 - คลื่นไส้ อาเจียน ปวดเกร็งท้อง ท้องเสีย
 - ปวดหัว เวียนหัว มีอาการอื่น
- "ให้รอดอาการ แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้แจ้งแพทย์ พยาบาล หรือเภสัชกร"**

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- ยานี้เก็บไว้ที่โรงพยาบาล ท่านจะไม่ได้รับกลับบ้าน

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

• ลักษณะยา

- ยาเม็ดมิลิฟริสโตน เป็นเม็ดรูปกลม สีเหลือง นูนทั้งสองด้าน ด้านหนึ่งมีอักษร M1 อีกด้านเรียบ
- ยาเม็ดไมโซพรอสตอล เป็นเม็ดรูปหกเหลี่ยม สีขาว ด้านหนึ่งแบน มีอักษร M13 อีกด้านนูนเล็กน้อย

• ตัวยาสำคัญ มิลิฟริสโตน, ไมโซพรอสตอล

• ส่วนประกอบอื่นๆ

- ยาเม็ดมิลิฟริสโตน มีส่วนประกอบอื่น ได้แก่ คอลลอยด์ซิลิคอนไดออกไซด์, แป้งข้าวโพด, โพรโตน, แมกนีเซียมสเตียเรต, ไมโครคริสทอลล์เซลลูโลส
- ยาเม็ดไมโซพรอสตอล มีส่วนประกอบอื่น ได้แก่ ไมโครคริสทอลล์เซลลูโลส, โซเดียมสเตียเรตซัลเฟต, โคเลท, น้ำมันละหุ่ง, ไฮโปเมิลโลส

ผู้ผลิต

China Resources Zizhu Pharmaceutical Co. Ltd.
ประเทศจีน

ผู้นำเข้า/ผู้แทนจำหน่าย

บริษัท ดี อาร์ โซลูชั่นส์ จำกัด

เลขที่ 28 ชั้น 4 ยุนิต C อาคารทิชา ซ.งามวงศ์วาน 6
ถ.งามวงศ์วาน ด.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ เมษายน 2565

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของ อย.

- <http://www.fda.moph.go.th/sites/oss/Pages/Main.aspx>
- <http://ndi.fda.moph.go.th/>

**เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร**