

ทราสทูซูแมบ
ขนาด 150 และ 440 มิลลิกรัม
ชนิดผงสำหรับละลาย เพื่อหยดเข้า
หลอดเลือดดำ
OGIVRI (โอกิวิริ)

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อสามัญว่าอะไร

- ยานี้มีชื่อสามัญว่า ทราสทูซูแมบ (Trastuzumab) เป็นยาในกลุ่มสารภูมิต้านทาน (monoclonal antibody)

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ใช้รักษาโรคมะเร็งเต้านมในผู้ใหญ่ที่มีระดับโปรตีนชนิดเฮอร์ทูมากกว่าปกติ
- ใช้รักษาโรคมะเร็งกระเพาะอาหารในผู้ใหญ่ที่มีระดับโปรตีนชนิดเฮอร์ทูมากกว่าปกติ

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไหร่

- เมื่อเคยแพ้ตัวยาทราสทูซูแมบ หรือส่วนประกอบอื่นๆของยานี้
- ผู้ที่ต้องให้ออกซิเจน หรือมีอาการหายใจลำบากอย่างรุนแรง

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

- แจ้งแพทย์หากท่านอยู่ในกลุ่มต่อไปนี้
 - มีครรภ์ กำลังวางแผนตั้งครรภ์ หรือให้นมบุตร
 - เคยเป็นหรือเป็นโรคหัวใจล้มเหลว โรคหัวใจ และหลอดเลือด ลิ้นหัวใจผิดปกติ
 - เป็นโรคความดันโลหิตสูง
 - มีอาการหายใจลำบาก เช่น หายใจไม่ออก เหนื่อยหอบ หายใจไม่ทัน หายใจไม่อิ่ม

- แจ้งแพทย์และเภสัชกรเสมอว่ากำลังใช้ ยา หรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร หรือสมุนไพรรชนิดใดอยู่บ้าง ในขณะที่กำลังใช้ยานี้ เนื่องจากอาจเกิดปัญหาต่อกันซึ่งมีผลต่อการรักษาหรือเกิดอันตรายได้
- แจ้งแพทย์และเภสัชกรว่าเคยได้รับยานี้ หากต้องได้รับยาอื่นๆ ภายใน 7 เดือนหลังหยุดยานี้

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- แพทย์จะกำหนดขนาดและระยะเวลาให้เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละราย
- ยานี้เป็นยาที่ให้ทางหลอดเลือดดำ ท่านจะได้รับยานี้โดยแพทย์หรือพยาบาลเท่านั้น

3.2 ถ้าหากลืมมารับยาควรทำอย่างไร

- แจ้งแพทย์ พยาบาล หรือเภสัชกรทันที หากท่านลืมมารับยา หรือไม่พบแพทย์ตามนัด

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- พบแพทย์ตามนัดทุกครั้งเพื่อติดตามผลการรักษาหรืออันตรายจากยา
- ห้ามหยุดใช้ยานี้เองโดยไม่แจ้งคำสั่งแพทย์
- ยานี้ใช้เวลา 7 เดือนในการขับยาออกจากร่างกายจนหมดดังนั้น
 - ผู้หญิงควรคุมกำเนิดระหว่างใช้ยานี้ และหลังหยุดยานี้ ให้คุมกำเนิดต่อไปอีก 7 เดือน เพราะยานี้อาจเป็นพิษต่อทารก
 - หยุดให้นมบุตรระหว่างใช้ยานี้ และหลังหยุดยานี้ ให้หยุดให้นมต่ออีก 7 เดือน เพราะยานี้อาจเป็นพิษต่อทารก
- แจ้งแพทย์ทันทีหากตั้ง ครรภ์ หรือสงสัยว่าตั้งครรถ์ในระหว่างใช้ยา

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 หากใช้ยาแล้วเกิดอาการเช่น

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีจ้ำตามผิวหนัง หรือเลือดออกผิดปกติ
- หายใจสั้น หายใจลำบาก ไอ ใจสั้น หน้าบวม แขนขา ข้อเท้าบวม ใจสั้น เวียนศีรษะบ้านหมุน ไม่รู้สึกตัว น้ำหนักตัวเพิ่ม 2 กิโลกรัมใน 24 ชั่วโมง

"ต้องรีบไปพบแพทย์ทันที"

5.2 หากใช้ยาแล้วเกิดอาการเช่น

- ไข้ หนาวสั่น มีผื่นขึ้น ไอ
- คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย น้ำหนักลด
- ปวดหัว นอนไม่หลับ อ่อนเพลีย

"ให้รอดอาการ แต่ถ้ามีอาการรุนแรงควรไปพบแพทย์"

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บไว้ในภาชนะบรรจุเดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในตู้เย็นช่องธรรมดา อุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส
- ยาที่ผสมแล้วต้องใช้ทันที

ผู้ผลิต Biocon Limited
Special Economic Zone Plot Nos. 2, 3, 4 & 5,
Phase-IV, Bommasandra-Jigani Link Road
Bommasandra Post, Bangalore - 560 099
India
ผู้นำเข้า บริษัท เมต้า ฟามาร์ (ประเทศไทย) จำกัด

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ 17 เมษายน 2561

**เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร**

