

## ไรโบซิดลิบ 200 มิลลิกรัม ชนิดเม็ด Kisqali (คิสคาลิ)

### 1. ยานี้คือยาอะไร

#### 1.1 ยานี้มีชื่อสามัญว่าอะไร

ยานี้มีชื่อสามัญว่า ไรโบซิดลิบ ซัคซิเนต (ribociclib succinate) เป็นยาด้านมะเร็ง

#### 1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

ยานี้ใช้รักษาโรคมะเร็งเต้านมในสตรีวัยหมดประจำเดือนที่แพทย์ตรวจแล้วว่าเหมาะสมที่จะใช้ยานี้ โดยให้ยานี้ร่วมกับยาด้านมะเร็งอีกชนิดหนึ่งที่ยังยังเอนไซม์อะโรมาเตส

### 2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

#### 2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยา
- แพ้ถั่วเหลือง หรือ ถั่วลิสง

#### 2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

แจ้งแพทย์ เภสัชกรก่อนเริ่มใช้ยา หากท่าน

- มีไข้ เจ็บคอ มีแผลในปาก ที่เกิดจากการติดเชื้อ เพราะท่านอาจมีเม็ดเลือดขาวต่ำ
- มีปัญหาที่ตับหรือเคยเป็นโรคตับ
- หัวใจทำงานผิดปกติ หัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะ
- เลือดมีโพแทสเซียม แมกนีเซียม แคลเซียม หรือ ฟอสฟอรัส ต่ำกว่าค่าปกติ
- แจ้งรายชื่อยา อาหารเสริมหรือสมุนไพร ที่กำลังใช้ อยู่ เพราะอาจส่งผลต่อการรักษาของยานี้

เอกสารกำกับยาสำหรับประเทศไทย

### 3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้ ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือ เภสัชกร เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค

- แพทย์จะแจ้งท่านว่ากินยาวันละกี่เม็ด
- โดยทั่วไป จะให้กิน วันละ 1 ครั้ง ในตอนเช้า โดยควรเป็นเวลาเดิมทุกวัน กินได้ทั้งก่อนหรือหลังอาหาร
- กลืนยาทั้งเม็ด ห้ามบด แบ่ง เม็ดยา
- กินติดต่อกัน 21 วัน แล้วหยุดยา 7 วัน จึงจะครบหนึ่งรอบของการรักษา 28 วัน
- บนข้างกล่องมีปฏิทินสำหรับจัดการกินยา ให้ท่านทำเครื่องหมายในวงกลมทุกครั้งที่ยินยาแต่ละเม็ด

#### 3.2 หากลืมกินยาควรทำอย่างไร

- หากลืมกินยาหรืออาเจียนหลังกินยา ให้รอกินยาในวันถัดไปของเวลาเดียวกัน ห้ามกินยาเพิ่มเป็น 2 เท่า

#### 3.3 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที โดยสังเกตอาการอย่างใกล้ชิด และให้นำชองยาไปด้วย

### 4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- ห้ามปรับขนาดยาหรือหยุดยาเอง และให้กินยานี้อย่างต่อเนื่องตามคำแนะนำของแพทย์ หรือเภสัชกร
- พบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตามผลการรักษาหรืออันตรายจากยา
- ไม่ควรกินผลและน้ำเกรปฟรุตหรือทับทิม เพราะอาจทำให้ปริมาณยาคิสคาลิในเลือดสูงเกินไปได้
- เพิ่มความระมัดระวังการขับชี่ยานยนต์ หรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกล หรือทำงานที่เสี่ยงต่อการพลัดตกจากที่สูง

### 5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

#### 5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ
  - หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
  - ผื่นแดง คุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีฝ้าตามผิวหนังหรือเลือดออกผื่นปกติ
  - มีไข้ หนาวสั่น อ่อนเพลีย มีอาการที่เกิดจากการติดเชื้ออยู่บ่อยครั้ง เช่น เจ็บคอ มีแผลในปาก
  - อ่อนล้า ตัวเหลือง ตาเหลือง คลื่นไส้ อาเจียน เบื่ออาหาร ปวดท้องบริเวณด้านขวาเหนือสะดือ ปัสสาวะมีสีเข้มหรือสีน้ำตาล
  - เจ็บหรือแน่นหน้าอก หัวใจเต้นเร็ว หรือ ช้ำผิดปกติ ใจสั่น เวียนหัว เป็นลม ปากคล้ำม่วง หายใจถี่ ขาววม
- "ต้องหยุดยารีบไปพบแพทย์ทันที"**

#### 5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์

- คลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง ท้องเสีย ท้องผูก
  - เบื่ออาหาร การรับรสผิดปกติ อาหารไม่ย่อย แสบร้อนกลางอก น้ำหนักลด
  - ผื่น คัน ผิวหนังร้อนแดง เยื่อช่อง-ปากอักเสบ
  - เหนื่อยหรือผิวซีด เหนื่อยล้า อ่อนเพลีย ผมรั้ง หายใจไม่อึม นอนไม่หลับ
  - ปวดหลัง ปวดหัว มีบวม เท้าบวม ตะคริว
  - น้ำตาไหลมาก ตาแห้ง เลือดกำเดาไหล
  - ปัสสาวะแสบขัดและปัสสาวะบ่อย มีไข้
- "ให้รอดอาการ แต่ถ้ามีอาการรุนแรง ควรไปพบแพทย์"**

อาจมีอาการไม่พึงประสงค์อื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุในเอกสารนี้เกิดขึ้นได้ หากมีอาการผิดปกติเกิดขึ้น โปรดปรึกษาแพทย์

## 6. ควรเก็บบยาอย่างไร

- เก็บไว้ในภาชนะบรรจุเดิมตามที่ได้อรับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อย่าให้โดนแสงโดยตรง โดยทั่วไป ควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- ห้ามใช้ยาหลังวันหมดอายุที่ระบุบนกล่อง
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

ผู้นำเข้า บริษัท โนวาร์ติส (ประเทศไทย) จำกัด  
กรุงเทพฯ โทร. 0-2080-0999  
เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ 18 เมษายน 2561

คำเตือน: ยานี้อาจทำให้เกิดอันตรายร้ายแรงได้  
ต้องใช้ภายใต้การควบคุมของแพทย์เท่านั้น

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ  
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร