

กรดกาโดเทอริก
ความแรง 0.5 มิลลิโมลต่อมิลลิลิตร
ชนิดน้ำยาปราศจากเชื้อสำหรับฉีด
ชื่อการค้า คารริสแกน (Clariscan)

1. ยานี้คืออะไร

- 1.1 ยานี้มีข้อห้ามยวดยาอะไร**
- ยานี้มีชื่อว่า กรดกาโดเทอริก (gadoteric acid) เป็นยาในกลุ่มสารทึบแสง

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

 - ยานี้ใช้เพื่อการวินิจฉัยโรคตามแพทย์สั่งเท่านั้น

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

- 2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร**
- เคยแพ้ยานี้หรือส่วนประกอบอื่นของยานี้

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

 - ควรถอดเครื่องประดับทุกชนิดก่อนการตรวจร่างกาย
 - ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรทุกครั้งส่วหากมีอาการแพ้ยา
 - กรณีต่อไปนี้
 - เคยได้รับสารทึบแสง
 - ผู้ป่วยโรคหัวใจ โรคลมชัก โรคตับ โรคไต หรือโรคหัวใจ
 - ได้รับการปลูกถ่ายไตหรือตับ
 - มีประวัติแพ้อาหารทะเล ลมพิษรุนแรง หรือโรคไข้น้ำร้อน
 - กำลังตั้งครรภ์ วางแผนจะตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร เพราะอาจทำให้เกิดอันตรายต่อทารก
 - ใช้ยาโรคหัวใจและยาลดความดันเลือดบางชนิด เช่น เมโทพโพรลอล วาลซาทาน อีนาลาพริล
 - ยานี้อาจตกค้างในสมองและเนื้อเยื่ออื่น และตกค้างเพิ่มขึ้นเมื่อใช้หลายครั้ง จึงควรใช้เท่าที่จำเป็น
 - แจ้งรายชื่อยา อาหารเสริมหรือสมุนไพร ที่กำลังใช้อยู่เพราะอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพ ความปลอดภัยของยานี้

3. วิธีใช้ยา

- 3.1 ขนาดและวิธีใช้**
- ใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรอย่างเคร่งครัด
 - ยานี้ฉีดทางหลอดเลือดดำเท่านั้น
 - งดน้ำและอาหารก่อนได้รับยา 2 ชั่วโมง

- 3.2 ถ้าใช้ยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร**
- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติรุนแรงให้รีบแจ้งแพทย์ทันที

4. ข้อควรปฏิบัติในการใช้ยา

- ระวังระวังการขับถ่ายขายนันต์ หรือการทำงานกับเครื่องจักรกล หรืองานที่เสี่ยงต่อการพลัดตกจากที่สูง

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

- 5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบแจ้งแพทย์ทันที**
- บวมบริเวณใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ
 - หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
 - ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีจุดตามผิวหนัง เลือดออกผิดปกติ
 - บวมบริเวณหน้า ปาก ล้าคอ มือและเท้า
 - ความดันโลหิตต่ำ คล้ายจะเป็นลม

"ต้องรีบไปพบแพทย์ทันที"

- 5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้รีบแจ้งแพทย์ทันที**

- ปวดศีรษะ
- รู้สึกเจ็บแปลบ
- ผื่นคัน ผื่นแดง
- ไอ น้ำมูกไหล จามหรือคันบริเวณดวงตา
- คลื่นไส้ อาเจียน
- ระคายเคืองบริเวณที่ให้ยา

"หรือดูอาการ แต่ถ้ามีอาการรุนแรงควรไปพบแพทย์"

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บไว้ในภาชนะบรรจุเดิมตามที่ได้รับมา
- ควรเก็บยาไว้ในมือเด็ก
- ห้ามใช้ยาที่เหลือจากวันหมดอายุ
- เก็บที่อุณหภูมิต่ำกว่า 30 องศาเซลเซียส
- หลังเปิดใช้ยาแล้ว ใช้ยาหมดใน 24 ชั่วโมง

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

- 7.1 ลักษณะยา**
- ยาปราศจากเชื้อสำหรับฉีด ใสไม่มีสีจนถึงสีเหลืองอ่อน

7.2 ส่วนประกอบอื่นของยา

 - ตัวยาสำคัญ คือ Gadoteric acid
 - ส่วนประกอบอื่น ๆ ได้แก่ Tetraxetan (DOTA) Meglumine และ Water for injection

ผลิตโดย : จีอี เฮลท์แคร์ จำกัด, นิโดไวเยียน 1, หมายเลข 0485, ออสโล นอร์เวย์

นำเข้าโดย : บริษัท เอ เมนารีนิ (ประเทศไทย) จำกัด 63 อาคารเอทอินทาวเวอร์ ชั้น 33 ถนนวิทย์ ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพฯ ประเทศไทย
เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ 5 มีนาคม 2562

**เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร**

