

**โพนาทินิบ**  
**ความแรง 15 และ 45 มิลลิกรัม**  
**ชนิดเม็ด**  
**ชื่อการค้า Iclusig (อีคลูสิก)**

**1. ยานี้คืออะไร**

**1.1 ยานี้มีชื่อสามัญว่าอะไร**

- ยานี้มีชื่อสามัญว่า โพนาทินิบไฮโดรคลอไรด์ (ponatinib hydrochloride) เป็นยา มะเร็ง

**1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร**

- ใช้รักษาโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลันหรือชนิดเรื้อรังแบบมัยอีลอยด์ในผู้ใหญ่ที่ต่อการรักษา และแพทย์ตรวจแล้วว่าเหมาะสมที่จะใช้ยานี้

**2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา**

**2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร**

- เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้

**2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้**

ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรในกรณีต่อไปนี้

- ตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร
- เป็นโรคตับ โรคตับอ่อน โรคไตบกพร่อง โรคหัวใจ ความดันเลือดสูง
- เคยมีภาวะหัวใจล้มเหลวและหลอดเลือดสมอง ตัดเหล้า หลอดเลือดมีลิ้มเลือด หลอดเลือดแดงที่โตมีภาวะตีบ มีภาวะเลือดออก ไวร้สตับอักเสบชนิดบี
- กำลังใช้ยาต่อไปนี้
  - คาร์บามาเซพีน เฟนิโทอิน
  - สารสกัดเชนดัจอห์นส์เวิร์ด เกรปฟรุต
  - คีโทโคนาโซล อิทราโคนาโซล
  - อินดินาเวียร์ เนลฟีนาเวียร์ ริโทนาเวียร์ ซาคควินาเวียร์
  - คลาริโทรไมซิน ซัลฟาซาลาซีน ไรแฟมพิซิน

- ฟิทาวาสแตทิน โรซิวาสแตทิน
- ดิจ็อกซิน โคลชิซิน เมโทเทริกเซด
- แพ้น้ำตาลนม

**ควรปรึกษาแพทย์และเภสัชกรก่อนใช้ยา**

**3. วิธีใช้ยา**

**3.1 ขนาดและวิธีใช้**

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือ เภสัชกร เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค
- กลืนยาทั้งเม็ดยา
- ห้ามหัก บด เคี้ยว หรือละลายเม็ดยา

**3.2 หากลืมกินยาควรทำอย่างไร**

- กินยาเมื่อนึกขึ้นได้ หากนึกขึ้นได้ในเวลาใกล้มี้อ ถัดไป ให้ข้ามยามื้อที่ลืมไป และให้กินยามื้อถัดไป ตามปกติ
  - ห้ามกินยาเป็นสองเท่า เพื่อชดเชยมื้อที่ลืม
- 3.3 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร**
- ให้แจ้งแพทย์ทันที

**4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา**

- ต้องใช้ยานี้ตามแพทย์สั่งเท่านั้น
- ระมัดระวังการขับยานยนต์ หรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกล หรือทำงานที่อาจพลัดตกจากที่สูง เพราะยานี้ทำให้วังงเวียน หัว การมองเห็น ผิดปกติ
- คุมกำเนิดระหว่างรักษาด้วยยานี้ทั้งในผู้ป่วยชายและผู้ป่วยหญิง และคุมกำเนิดต่อไปอีก 3 สัปดาห์ หลังจากหยุดใช้ยานี้
- แจ้งแพทย์และทันตแพทย์ก่อนการผ่าตัดหรือถอนฟัน เพราะยานี้มีผลต่อการแข็งตัวของเลือด

**5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา**

**5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที**

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีฝ้าตามผิวหนังหรือเลือดออกผิดปกติ
- เจ็บหน้าอก ใจสั่น หัวใจเต้นผิดปกติ
- มีไข้ ไอมีเลือดปน เจ็บคอ หนาวสั่น ครั่นเนื้อตัว ชัก
- ปัสสาวะมีสีดําเข้ม อุจจาระสีดําหรือสีซีด ดาเหลือง
- ปวดท้องและหลังรุนแรง
- ปวดหัว เวียนหัว ซากครั้งชีกตัว ปวดบวมที่ขา
- ปวดตา มีปัญหาการมองเห็น

**“หยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที”**

**5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์**

- ท้องผูก
- ปวดบวมข้อและกล้ามเนื้อ
- เหนื่อยล้า
- ผิวแห้ง ผื่นขึ้น

**“ไม่จำเป็นต้องหยุดยา**

**แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์”**

**6. ควรเก็บยานี้อย่างไร**

- เก็บไว้ในภาชนะบรรจุเดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อย่าให้โดนแสงโดยตรง
- ควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- ควรเก็บยาและกล่องบรรจุสารดูดความชื้นไว้ในขวดยาเพื่อป้องกันแสงและความชื้น
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

## 7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

**โพนาทินิบ 15 มิลลิกรัม ชนิดเม็ด :**

**ลักษณะ :** เม็ดยาเคลือบฟิล์มรูปร่างกลมมนมีสีขาว ด้านหนึ่งมีอักษร "A5" และอีกด้านหนึ่งเรียบ  
**ตัวยาสาคัญ :** โพนาทินิบ 15 มิลลิกรัม  
**ส่วนประกอบอื่นๆ :** แลคโตส โมโนไฮเดรต, ไมโครคริสตัลไลน์ เซลลูโลส, โซเดียมสตาร์ชไลโคเลต, คอลลอยด์ล ซิลิคอนไดออกไซด์, แมกนีเซียมสเตียเรต, ทัลคัม, โพลีเอทิลีนไกลคอล, โพลีไวนิลแอลกอฮอล์, ไททาเนียมไดออกไซด์

**โพนาทินิบ 45 มิลลิกรัม ชนิดเม็ด :**

**ลักษณะ :** เม็ดยาเคลือบฟิล์มรูปร่างกลมมนมีสีขาว ด้านหนึ่งมีอักษร "AP4" และอีกด้านหนึ่งเรียบ  
**ตัวยาสาคัญ :** โพนาทินิบ 45 มิลลิกรัม  
**ส่วนประกอบอื่นๆ :** แลคโตส โมโนไฮเดรต, ไมโครคริสตัลไลน์ เซลลูโลส, โซเดียมสตาร์ชไลโคเลต, คอลลอยด์ล ซิลิคอนไดออกไซด์, แมกนีเซียมสเตียเรต, ทัลคัม, โพลีเอทิลีนไกลคอล, โพลีไวนิลแอลกอฮอล์, ไททาเนียมไดออกไซด์

**ผู้ผลิต:** บริษัท พาเดอะออน ไอเอ็นซี ประเทศแคนาดา

**ผู้นำเข้า:** บริษัทไทยโอซูก้า จำกัด ประเทศไทย  
**ผู้แทนจำหน่าย:** บ.ซิลลิด ฟาร์มา จำกัด ประเทศไทย

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ 24 ตุลาคม 2561

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ  
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร