

**อะทีโซลิซูเมบ
ขนาด 60 มิลลิกรัม ใน 1 มิลลิลิตร
ชนิดสารละลายน้ำขึ้นส่วนรับหยดเข้าหลอดเลือดดำ
ชื่อการค้า Tecentriq (ทีเซ็นทริก)**

1. ยานี้คือยาอะไร

1.1 ยานี้มีชื่อสามัญว่าอะไร

- ยานี้มีชื่อสามัญว่าอะทีโซลิซูเมบ (atezolizumab) เป็นยาในกลุ่มสารภูมิต้านทาน (monoclonal antibody)

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ยานี้ใช้เพื่อรักษามะเร็งกระเพาะปัสสาวะ
- ยานี้ใช้เพื่อรักษามะเร็งปอด
- ยานี้ใช้เพื่อรักษามะเร็งเต้านม

2. ข้อควรรู้ก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยาเมื่อไร

- เคยแพ้ยาตัวนี้ หรือส่วนประกอบของยาตัวนี้

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยา

หากภาวะต่อไปนี้ ต้องแจ้งให้แพทย์ทราบก่อนรับยา

- ตั้งครรภ์ หรือวางแผนจะตั้งครรภ์
- กำลังให้น้ำนมลูก หรือมีแผนจะให้น้ำนมลูก
- ภูมิคุ้มกันบกพร่อง
- เคยปลูกถ่ายอวัยวะ
- โรคปอด หรือการหายใจลำบาก
- โรคตับ
- โรคระบบประสาท
- กำลังรักษาอาการติดเชื้อใดๆ อายุ

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้ ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์ เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยาต้องขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค

- แพทย์จะให้ยานี้โดยหยดเข้าเส้นเลือดดำนาน 30 นาที ถึง 60 นาทีต่อครั้ง
- ห้ามจะได้รับยาตัวนี้ทุกวัน 2 สัปดาห์ 3 สัปดาห์ หรือ 4 สัปดาห์ ตามแพทย์สั่ง

3.2 หากลืมไปฉีดยา ควรทำอย่างไร

- หากท่านลืมนัด ให้ท่านติดต่อแพทย์โดยด่วนเพื่อปรับตารางการให้ยาใหม่

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- ผู้ป่วยหญิงให้คุณกำเนิดตลอดเวลาที่ได้รับยาตัวนี้ และต่อไปอีกอย่างน้อย 5 เดือน หลังจากหยุดยา
- หยุดให้นมลูกระหว่างได้รับยาตัวนี้ และต่อไปอีกอย่างน้อย 5 เดือน หลังจากหยุดยา

5. ข้อดีและข้อเสียของการใช้ยา

5.1 อาการที่ต้องแจ้งแพทย์หรือรับไปพบแพทย์ทันที

- บวมที่ใบหน้า เปลือกด้วย ริมฝีปาก ลมพิษ
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุบพอง ผิวหนังหลุดลอก มีจ้ำดามผิวหนัง หรือเลือดออกผิดปกติ
- ไอ หรืออาการไอเรื้อรังที่ไม่ดีขึ้น หายใจสั้น เจ็บหน้าอก
- ตัวเหลืองตาเหลือง คลื่นไส้อาเจียนรุนแรง เจ็บชายโครงขวา เชื่อมซึ่น ปัสสาวะสีเข้ม(สีชา) เลือดออก ง่ายกว่าปกติ ทิวน้อยลง
- ห้องเสียว ถ่ายเหลว ถ่ายบ่อย ถ่ายปนเลือด อุจจาระมีสีดำหรือเหลือง ปวดห้องรุนแรง
- ปวดหัวแบบผิดปกติ เหนื่อยล้า น้ำหนักตัวผิดปกติ หน้ามืดหรือเป็นลม ทิบบอยหรือหัวน้ำบอยกว่าปกติ ฟุ้งร่วง อาเจียนขึ้นลง หน้า ห้องผูก เสียงทุมต่ำ ปัสสาวะบ่อย คลื่นไส้อาเจียน ปวดห้อง

- กล้ามเนื้ออ่อนแรงrunแรง ชาหรือเสียวที่ปลายมือ ปลายเท้า มีไข้ สับสนมึนงง อารมณ์แปรปรวน พฤติกรรมแปรปรวน ไม่สู้แสง คงแข็ง
- ดาวร้า ภาพซ้อน หรือการมองเห็นผิดปกติ
- มีไข้ ไอ ปัสสาวะบ่อย อาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ ปวดเสบขณะปัสสาวะ

5.2 อาการที่อาจเกิดขึ้นได้ แต่ถ้ามีอาการรุนแรง ให้ไปพบแพทย์ทันที

- เหนื่อยง่าย
- อยากอาหารลดลง
- คลื่นไส้
- ติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ
- มีไข้
- ห้องผูก
- หายใจสั้น
- ไอ

6. ควรเก็บยาเมื่ออย่างไร

- อย่าให้โดนแสงแดด直射 โดยทั่วไปควรเก็บที่อุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- ห้ามแช่แข็ง ห้ามเขย่า ผลิตภัณฑ์ บริษัท เอฟ สโตร์มันน์ – ลา โรช จำกัด สวีสเซอร์แลนด์ ผู้นำเข้า บริษัท โรช ไทยแลนด์ จำกัด กรุงเทพฯ ผู้แทนจำหน่าย บริษัท ดีเคเอสเอช จำกัด กรุงเทพฯ เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ ตุลาคม 2561

**เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร**

ใช้ยาตัวนี้ภายใต้การควบคุมของแพทย์เท่านั้น
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในเอกสารกำกับยา