

โอลาพาริบ

ความแรง 50 มิลลิกรัม ชนิดแคปซูล
ลินพาร์ชา™

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อสามัญว่าอะไร

- ยานี้มีชื่อสามัญว่าโอลาพาริบ (olaparib) เป็นยาในกลุ่มยาต้านมะเร็ง

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

ยานี้ใช้เพื่อ รักษา มะเร็งรังไข่ที่มีการกลายพันธุ์ของยีน BRCA ในผู้ป่วยที่ตอบสนองต่อการรักษาด้วยยาเคมีบำบัดที่มีแพลทินัมเป็นส่วนประกอบ

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้
- เมื่ออยู่ในระยะให้นมบุตร เพราะอาจทำให้เกิดอันตรายร้ายแรงต่อทารก

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้ หากท่านมีภาวะต่อไปนี้

- ภาวะเลือดจาง ภาวะเกล็ดเลือดต่ำ หรือเม็ดเลือดขาวต่ำ มีไข้หรือติดเชื้อ มีจ้ำเลือด หรือเลือดออก ควรแจ้งให้แพทย์ทราบ
- หายใจสั้น ไอ หรือหายใจมีเสียงหวีด ซึ่งอาจเป็นอาการของปอดอักเสบ ควรแจ้งให้แพทย์ทราบ
- หญิงมีครรภ์ให้หลีกเลี่ยงการใช้ยานี้เพราะอาจมีอันตรายต่อทารกในครรภ์ได้ แต่แพทย์อาจพิจารณาการสั่งใช้ยานี้ หากมีเหตุผลทางการแพทย์

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้ ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือ เภสัชกร เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค

- กินครั้งละ 8 แคปซูล วันละ 2 ครั้ง เข้า และเย็น หลังอาหาร 1 ชั่วโมง และงดกินอาหารหลังกินยา 2 ชั่วโมง

3.2 หากลืมกินยาควรทำอย่างไร

- ให้กินยามื้อถัดไปตามปกติ ห้ามกินยาเป็น 2 เท่า

3.3 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรงให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- ห้ามหยุดยาเองและให้กินยาต่อเนื่องตามคำแนะนำของแพทย์ หรือเภสัชกร
- พบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตามผลการรักษาหรืออันตรายจากยา
- ไม่ควรดื่มน้ำเกรฟฟรุตตลอดช่วงเวลาที่กินยา
- แจ้งแพทย์หรือเภสัชกร หากกำลังกินยา เคยกินยา หรืออาจกินยาตัวอื่นๆ รวมทั้งยาสมุนไพร และยาอื่นๆ ที่ได้รับนอกเหนือจากใบสั่งยา เนื่องจากยา โอลาพาริบ สามารถส่งผลกระทบต่อการทำงานของยา และ/หรือ เพิ่มอาการข้างเคียงของยาบางตัวได้ และยาบางตัวอาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของยา โอลาพาริบ
- แจ้งแพทย์ เภสัชกร หรือพยาบาลทราบหากท่านมีกำหนดการฉีดวัคซีน หรือใช้ยาที่กดภูมิคุ้มกัน
- ห้ามกินยา โอลาพาริบ หากกินยาต้านมะเร็งตัวอื่นๆ
- ไม่ควรตั้งครรภ์ในระหว่างที่กินยานี้ และ 1 เดือนหลังกินยามื้อสุดท้าย ต้องใช้การคุมกำเนิดที่มีประสิทธิภาพในระหว่างการรักษา
- ระมัดระวังการขับขี่ยานยนต์ หรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกล หรือทำงานที่เสี่ยงต่อการพลัดตกจากที่สูง

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ
- หน้ามืด เป็นลม แขนหน้าอก หายใจลำบาก

- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีจ้ำตามผิวหนังหรือเลือดออกผิดปกติ

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์ทันที

- ไข้ หรือการติดเชื้อ
- หายใจสั้น รู้สึกเหนื่อยล้า ผิวซีด หรือหัวใจเต้นเร็ว
- ท้องเสีย
- จ้ำเลือด หรือเลือดออกเป็นระยะเวลาานานกว่าปกติ

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บไว้ในภาชนะบรรจุเดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อบอุ่นโดยตรง โดยทั่วไป ควรเก็บที่อุณหภูมิต่ำกว่า 30 องศาเซลเซียส ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก
ผู้ผลิต/ผู้นำเข้า/ผู้แทนจำหน่าย

ผู้ผลิต: Patheon Pharmaceuticals Inc, Ohio, USA
ผู้แบ่งบรรจุและตรวจผ่าน: AstraZeneca UK Limited, Cheshire, UK

ผู้นำเข้า: บริษัท แอสตราเซนเนกา (ประเทศไทย) จำกัด กรุงเทพมหานคร

ผู้แทนจำหน่าย: บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด กรุงเทพมหานคร

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ 9 กันยายน 2560

คำเตือน: ยานี้อาจทำให้เกิดอันตรายร้ายแรงได้
ต้องใช้ภายใต้การควบคุมของแพทย์เท่านั้น

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร