

LONSURF (ลอนเซอร์ฟ) ชนิดเม็ดเคลือบฟิล์ม

1. ยานี้คือยาอะไร

1.1 ยานี้มีชื่อสามัญว่าอะไร

- ยานี้มีชื่อว่า Lonsurf (ลอนเซอร์ฟ) มี 2 ความแรง คือ ยาเม็ดสีขาว มีไตรฟลูริดีน 15 มิลลิกรัม และไทพิราซิล 6.14 มิลลิกรัม และยาเม็ดสีแดงอ่อน มีไตรฟลูริดีน 20 มิลลิกรัม และไทพิราซิล 8.19 มิลลิกรัม

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ยานี้ใช้รักษามะเร็งลำไส้ใหญ่ระยะแพร่กระจายในผู้ใหญ่ที่แพทย์ตรวจแล้วว่าเหมาะสมที่จะใช้ยานี้

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- ห้ามใช้ยานี้เมื่อแพ้ตัวยาไตรฟลูริดีน หรือไทพิราซิล หรือส่วนประกอบของยานี้ ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรถ้าไม่มั่นใจ

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

แจ้งแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยานี้หากท่านมีภาวะต่อไปนี้

- เป็นโรคตับ
- เป็นโรคไต
- ตั้งครรภ์ หรือวางแผนตั้งครรภ์
- ให้นมบุตร หรือวางแผนให้นมบุตร
- อยู่ระหว่างการรักษาเอชไอวี โดยแพทย์ของท่าน อาจเปลี่ยนไปใช้ยารักษาเอชไอวีตัวอื่น

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้นเนื่องจากขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับสภาวะของท่าน
- กินยานี้ภายใน 1 ชั่วโมงหลังอาหารเช้า และเย็น
- ให้กลืนยาทั้งเม็ด
- ล้างมือให้สะอาดหลังสัมผัสยาทุกครั้ง

3.2 หากลืมกินยา ควรทำอย่างไร

- ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรเมื่อลืมกินยานี้
- ไม่ควรกินยาเพิ่มเป็น 2 เท่าเพื่อชดเชยยาที่ลืมกิน

3.3 ทำอย่างไรหากได้รับยาเกินขนาด

- ให้รีบแจ้งแพทย์หรือไปโรงพยาบาลทันทีโดยนำยาไปด้วย

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างการใช้ยา

- ไม่ควรตั้งครกหรือกระเบื้องระหว่างใช้ยานี้ เพราะอาจเป็นอันตรายต่อทารกในครรภ์
- ให้ท่านและคู่ของท่านคุมกำเนิดในระหว่างใช้ยานี้ และคุมกำเนิดต่อไปอีก 6 เดือน หลังจากหยุดใช้ยาแล้ว
- หากท่านหรือคู่ของท่านตั้งครกหรือกระเบื้องระหว่างใช้ยานี้ ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรทันที

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการดังต่อไปนี้หากเกิดขึ้นให้หยุดยาและไปพบแพทย์ทันที

- มีอาการติดเชื้อ เช่น มีไข้ หนาวสั่น ปวดตามตัว
- หายใจสั้นถี่ รู้สึกเหนื่อย หรือซีด
- การเกิดจำเลือดหรือจุดเลือดเล็กๆบริเวณผิวหนัง หรือมีเลือดออกผิดปกติ
- บวมที่ใบหน้าเปลือกตาริมฝีปากลมพิษ
- หน้ามืดเป็นลมแน่นหน้าอกหายใจลำบาก

- ผื่นแดงตุ่มพองผิวหนังหลุดลอกมีจำกัดตามผิวหนังหรือเลือดออกผิดปกติ

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์ทันที

- เบื่ออาหาร
- อ่อนเพลีย
- คลื่นไส้
- อาเจียน
- ท้องเสีย

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บยานี้ที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส
- เก็บยาไว้ในภาชนะบรรจุเดิมตามที่ได้รับมา
- ไม่ใช้ยาหลังวันหมดอายุที่ระบุไว้บนฉลากยา
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

ตัวยาสาคัญ: ไตรฟลูริดีน และไทพิราซิล
ส่วนประกอบอื่น ๆ: แลคโตสโมโนไฮเดรท แมงกานีสไดออกไซด์ ไนซิง กรดสเตียริก ไฮโปรมีลโลส โพลีเอทิลีนไกลคอล ไททาเนียมไดออกไซด์ แมกนีเซียมสเตียเรท และหมึกพิมพ์สีเทา เฉพาะยาเม็ดสีแดงอ่อนแต่งสีด้วยเฟอร์ริกออกไซด์ (สีแดง)

ผู้ผลิต: Taiho Pharmaceutical Co., Ltd.
ประเทศญี่ปุ่น

ผู้นำเข้า: บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จำกัด
เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุด: กันยายน 2561

คำเตือน

ยานี้อาจทำให้เกิดอันตรายร้ายแรงและควรใช้ภายใต้การดูแลของแพทย์

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร