

อะลิโรคูแมบ 75, 150 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร สารละลายสำหรับฉีด รูปแบบปากกา ฉีดยา หรือ กระบอกฉีดยา [พราลูเออนท์]

1. ยานี้คือยาอะไร

1.1 ยานี้มีชื่อสามัญว่าอะไร

ยานี้มีชื่อสามัญว่า **อะลิโรคูแมบ (alirocumab)** เป็นยาในกลุ่มยาลดไขมัน

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

ยานี้ใช้รักษาร่วมกับการควบคุมอาหารในผู้ใหญ่ที่มีคอเลสเตอรอลในเลือดสูง หรือมีระดับไขมันในเลือดผิดปกติ หรือใช้ร่วมกับยาลดไขมันชนิดอื่น

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ หรือแพ้ส่วนประกอบอื่นของยา

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

- แจ้งแพทย์หากท่านอยู่ในกลุ่มต่อไปนี้
 - ไตบกพร่องอย่างรุนแรง
 - ตับบกพร่องอย่างรุนแรง
- ระวังระวังการใช้ยานี้ในหญิงมีครรภ์หรือให้นมบุตร เนื่องจากไม่มีข้อมูลยืนยันความปลอดภัย

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค
- ฉีดยาเข้าใต้ผิวหนัง

• วิธีการให้ยา

- ใช้ฉีดเข้าใต้ผิวหนังบริเวณต้นขา (ขาอ่อน) หน้าท้อง หรือต้นแขน แนะนำให้เปลี่ยนตำแหน่งที่ฉีดยาในการฉีดแต่ละครั้ง

- ห้ามฉีดยานี้เข้าบริเวณที่กำลังมีโรคผิวหนัง หรือมีการบาดเจ็บ/เสียหายของผิวหนังเช่น แผล แดงเผา ผื่นผิวหนัง ผื่นหนังอักเสบ หรือการติดเชื้อที่ผิวหนัง

- ห้ามฉีดยานี้ ร่วมกับผลิตภัณฑ์ยาฉีดอื่นที่ตำแหน่งฉีดยาเดียวกัน

- ควรได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับเทคนิคการฉีดยา เข้าใต้ผิวหนังที่ถูกต้องจากบุคลากรทางการแพทย์

• ข้อควรระวังก่อนการฉีด

เมื่อนำยาออกจากตู้เย็นแล้ว ให้ตั้งทิ้งไว้ประมาณ 10 นาทีก่อนนำมาฉีด

• ผลิตภัณฑ์นี้สำหรับใช้ครั้งเดียวเท่านั้น

3.2 หากลืมฉีดยาควรทำอย่างไร

• หากลืมฉีดยา ให้ฉีดยาทันทีที่มีโอกาสได้และฉีดเข็มถัดไปตามแผนการรักษาเดิม

3.3 ถ้าฉีดยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

• ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง ให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- ห้ามหยุดยาเอง และให้ฉีดยาอย่างต่อเนื่อง
- ตามคำแนะนำของแพทย์ หรือเภสัชกร
- พบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตามผลการรักษาหรืออันตรายจากยา

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องรีบไปพบแพทย์ทันที เช่น

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีไข้ตามผิวหนังหรือเลือดออกผิดปกติ
- อาการคัน บวม ปวด/อาการกดเจ็บ บริเวณตาแห่งที่ฉีดยา

5.2 อาการที่ยังไม่ต้องรีบไปพบแพทย์ เช่น

- เล็บคอ เจ็บในปาก
- นำมูกไหล จาม
- ผื่นคัน

แต่ถ้ามีอาการรุนแรงควรไปพบแพทย์

6. ควรเก็บยาอย่างไร

- เก็บในตู้เย็น (2 ถึง 8 องศาเซลเซียส) ห้ามแช่แข็ง
- เก็บไว้ในภาชนะบรรจุเดิมตามที่ได้รับมาเพื่อป้องกันแสง
- ระยะเวลาสูงสุดที่ยาอยู่นอกตู้เย็น ไม่เกิน 30 วัน ที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส

ผู้นำเข้า

บริษัท ซาโนไฟ-เอเวนต์ส (ประเทศไทย) จำกัด

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ

27 กุมภาพันธ์ 2562

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร