

วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
ชนิดผสมพร้อมตัวทำละลายสำหรับฉีด
Rabivax-S (เรบิวักซ์-เอส)

1. วัคซีนนี้คือวัคซีนอะไร

1.1 วัคซีนนี้คืออะไร
เบบิเวกซ์-เอส คือ วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งออกฤทธิ์โดยการกระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันต่อการติดเชื้อ

1.2 วัคซีนนี้ใช้เพื่ออะไร
วัคซีนนี้ใช้เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในเด็กและผู้ใหญ่ สามารถใช้ได้กับคน 2 กลุ่ม คือ

- 1) ฉีดให้กับคนปกติที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า
- 2) ฉีดให้กับคนที่ "ติดเชื้อ" หรือ "สงสัยว่าจะติดเชื้อ" โรคพิษสุนัขบ้า เช่น ถูกสัตว์กัดหรือข่วน เป็นต้น

2. ข้อควรระวังเมื่อใช้วัคซีน

- ห้ามใช้กับผู้ที่เคยเกิดอาการแพ้รุนแรงหลังได้รับวัคซีนครั้งก่อน
 - ห้ามใช้เมื่อมีไข้หรือไม่สบาย ให้ฉีดวัคซีนเมื่อหายเป็นปกติ
 - ห้ามฉีดซ้ำในผู้ที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนหรือสงสัยว่าจะติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า
- ต้องได้รับวัคซีนทุกรายเนื่องจากโรคพิษสุนัขบ้าไม่มีวิธีการรักษาและอันตรายถึงขั้นเสียชีวิต

2.2 แจ้งแพทย์หากท่านมีอาการต่อไปนี้

- สตรีมีครรภ์ หรือให้นมบุตร
- เคยเป็นลมหรือหมดสติระหว่างฉีดยา
- ผู้ที่มีความบกพร่องทางภูมิคุ้มกัน
- ให้แจ้งแพทย์หากให้ยาในกลุ่มต่อไปนี้
 - คอร์ติโคสเตียรอยด์ เช่น เพรดนิโซโลน
 - ยาภูมิคุ้มกัน
 - ยาลดกรดในท้องหรือยาลดกรดในกระเพาะอาหาร

3. วิธีใช้วัคซีน

- 3.1 ขนาดและวิธีใช้
- แพทย์หรือพยาบาลอาจฉีดวัคซีนเข้ากล้ามเนื้อหรือเข้าในผิวหนังของ ท่าน และจะนัดหมายให้ท่านมาฉีดวัคซีนจนครบ
- 1) กรณีฉีดให้กับคนปกติที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า

วิธีการฉีด	ฉีดเข็มที่	วันที่ฉีด
ฉีดเข้ากล้ามเนื้อหรือผิวหนัง	เข็มที่ 1	วันแรกของการฉีดวัคซีน
	เข็มที่ 2	7 วันหลังการฉีดวัคซีนเข็มที่ 1
	เข็มที่ 3	21 หรือ 28 วันหลังการฉีดวัคซีนเข็มที่ 1

2) กรณีฉีดให้กับคนที่ติดเชื้อหรือสงสัยว่าจะติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า

วิธีการฉีด	ฉีดเข็มที่	วันที่ฉีด
ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ	เข็มที่ 1	มาฉีดวัคซีนเร็วที่สุดหากติดเชื้อหรือสงสัยว่าจะติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า
	เข็มที่ 2	3 วันหลังการฉีดวัคซีนเข็มที่ 1
	เข็มที่ 3	7 วันหลังการฉีดวัคซีนเข็มที่ 1
	เข็มที่ 4	14 วันหลังการฉีดวัคซีนเข็มที่ 1
	เข็มที่ 5	28 วันหลังการฉีดวัคซีนเข็มที่ 1
ฉีดเข้าผิวหนัง	เข็มที่ 1	มาฉีดวัคซีนเร็วที่สุดหากติดเชื้อหรือสงสัยว่าจะติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า
	เข็มที่ 2	3 วันหลังการฉีดวัคซีนเข็มที่ 1
	เข็มที่ 3	7 วันหลังการฉีดวัคซีนเข็มที่ 1
	เข็มที่ 4	28 วันหลังการฉีดวัคซีนเข็มที่ 1

ทั้งนี้ แพทย์จะให้ท่านมาฉีดวัคซีนตามที่นัดหมาย

ซึ่งจำนวนวันมีขีดจำกัดขึ้นอยู่กับอาการของแพทย์

3.2 หากลืมรับวัคซีนตามโปรแกรมที่กำหนด

- ให้มารับวัคซีนโดยเร็วที่สุดในวันที่ท่านได้

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้วัคซีน

- มารับวัคซีนให้ครบตามที่แพทย์หรือพยาบาลนัดหมายเพื่อให้มีภูมิคุ้มกันสูงในระดับป้องกันโรคได้
- 5. อันตรายที่อาจเกิดจากวัคซีน
 - 5.1 อาการที่ต่อมั่งงั้นแพทย์ พยาบาลหรือเภสัชกรทันที
 - ลมพิษ บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก
 - หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
 - ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวงแดง ผิวงลอก มีจุดตามผิวหนังหรือ

- เพื่อลดอาการปวด
- 5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องไปพบแพทย์
 - ปวดแดง ร้อน คัน บริเวณที่ฉีด
 - มีไข้ ปวดศีรษะ อ่อนเพลีย

“ให้รอดูอาการ แต่ถ้ามีอาการรุนแรง ให้แจ้งแพทย์ พยาบาลหรือเภสัชกร”

6. ควรเก็บวัคซีนนี้อย่างไร

- เก็บในตู้เย็น (ที่อุณหภูมิ 2 องศาเซลเซียส ถึง 8 องศาเซลเซียส) และเก็บนํ้ายาทำละลายในที่เย็น ห้ามแช่แข็ง
- วัคซีนนี้จะเก็บที่สถานพยาบาล ท่านอาจไม่ได้รับวัคซีนกลับบ้าน

7. ลักษณะและส่วนผสมของวัคซีนนี้

ส่วนผสม

วัคซีน 1 มิลลิลิตร ประกอบด้วย ซีโรฟิสิกซ์สุนัขบ้าที่หมดฤทธิ์ ไม่น้อยกว่า 2.5 ยูนิตสากล

ส่วนผสมอื่น ๆ ได้แก่

ซูโครส ไกลซีน อัลบูมินจากซีรัมคน น้ำกลั่นสำหรับฉีด ผู้ผลิต

SERUM INSTITUTE OF INDIA PVT. LTD.

212/2, Hadapsar, Pune 411028, INDIA

ผู้นำเข้า

บริษัท ไบโอโนเวล จำกัด

โทรศัพท์ 02 384 7472 โทรสาร 02 757 7551

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ

หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร