

เอกสารกำกับยาภาษาไทยสำหรับผู้ป่วย

อินวีก้า ทรินซา™

ยาน้ำแขวนตะกอนชนิดออกฤทธิ์นาน สำหรับฉีดเข้ากล้ามเนื้อ

พาลีเพอริโดน พาลมิเตท

เอกสารกำกับยาฉบับนี้ประกอบด้วยอะไรบ้าง

ในเอกสารกำกับยาฉบับนี้จะตอบคำถามทั่วไปเกี่ยวกับอินวีก้า ทรินซา ในเอกสารกำกับยาจะไม่ได้มีข้อมูลทั้งหมด และเอกสารกำกับยาไม่สามารถทดแทนการพูดคุยกับแพทย์หรือเภสัชกรได้

ถ้าคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้อินวีก้า ทรินซา โปรดสอบถามแพทย์หรือเภสัชกร

แพทย์และเภสัชกรของคุณจะมีข้อมูลมากกว่า

กรุณาเก็บเอกสารนี้ไว้ใกล้มือ

คุณสามารถดูมันได้ในภายหลังถ้าคุณมีข้อสงสัยอื่น ๆ

อินวีก้า ทรินซา ใช้สำหรับอะไร

อินวีก้า ทรินซา ถูกจัดอยู่ในกลุ่มยาต้านโรคจิต (antipsychotic agents) ซึ่งช่วยทำให้อาการของความเจ็บป่วยทางจิตบางประเภทดีขึ้น

ยานี้ใช้ในการรักษาอาการของโรคจิตเภท (schizophrenia) ซึ่งเป็นโรคทางจิตที่มีความผิดปกติด้านความคิด ความรู้สึก หรือพฤติกรรม อินวีก้า ทรินซา ช่วยในการแก้ไขความไม่สมดุลของสารเคมีในสมองที่เกี่ยวข้องกับสภาวะนี้

ยานี้ยังสามารถใช้เพื่อลดโอกาสการกลับเป็นซ้ำของอาการโรคจิตเภท

อาการทั่วไปที่พบบ่อยที่สุดของโรคจิตเภท ประกอบด้วย:

- การมองเห็น การได้ยิน หรือการสัมผัสสิ่งต่าง ๆ ที่ไม่มีอยู่จริง (อาการประสาทหลอน (hallucinations))
- มีความเชื่อที่ผิดหรือการตัดสินใจที่ผิดพลาด ในบางครั้งมีความสัมพันธ์กับอาการประสาทหลอน มีความเชื่อมั่นในสิ่งที่แม้ว่ามีหลักฐานแบบตรงกันข้าม (อาการหลงผิด (delusions))
- ไม่เชื่อใจคนอื่นและมีความรู้สึกกระแวงสงสัยมาก (อาการหวาดระแวง (paranoia))
- หลีกเลียงการอยู่ใกล้ชิดกับครอบครัวและเพื่อน และมีความต้องการอยู่เพียงลำพัง

อาจต้องใช้เวลาสักพักก่อนที่อาการของโรคจิตเภทจะเริ่มดีขึ้น โปรดจำไว้ว่าอินวีگا ทรินซา เป็นแค่ส่วนหนึ่งของแผนการรักษาทั้งหมดของคุณ การไปพบแพทย์ตามนัดทุกครั้งเป็นสิ่งสำคัญเพื่อที่คุณจะสามารถได้รับการรักษาตรงเวลาและแพทย์สามารถประเมินอาการของคุณได้

อย่างไรก็ตาม แพทย์ของคุณอาจจะทำการส่งจ่ายอินวีกา ทรินซา เพื่อใช้ในสาเหตุอื่น

โปรดสอบถามแพทย์ถ้าคุณมีข้อสงสัยถึงเหตุผลในการที่แพทย์ส่งจ่ายยาตัวนี้ให้กับคุณ

ก่อนที่คุณจะใช้ยา

เมื่อไรที่ห้ามคุณใช้ยานี้

ห้ามใช้อินวีกา ทรินซา ถ้าคุณทราบว่าคุณมีการแพ้ต่อส่วนผสมใด ๆ ที่ระบุไว้ที่ส่วนท้ายของเอกสารกำกับยาฉบับนี้ หรือยาที่ประกอบด้วย พาลิเพอริโดน (เช่น อินวีกา) หรือริสเพอริโดน (เช่น ริสเพอดาล)

อาการของการแพ้ อาจประกอบด้วย ผื่นผิวหนัง คัน หายใจถี่หอบ และ/หรือ มีอาการบวมบริเวณใบหน้าหรือลิ้น

ห้ามใช้ยาภายหลังจากวันหมดอายุ ที่ได้มีการระบุไว้บนบรรจุภัณฑ์

ถ้าคุณใช้ยาภายหลังจากวันหมดอายุ ยาอาจจะไม่มีฤทธิ์เช่นกัน

ห้ามใช้ยาถ้าบรรจุภัณฑ์มีลักษณะฉีกขาดหรือมีการเปลี่ยนแปลง

ห้ามใช้ยาในการรักษาอาการอื่น ๆ ยกเว้นแพทย์จะเป็นคนบอกว่าสามารถใช้ได้อย่างปลอดภัย

ก่อนที่คุณจะเริ่มใช้ยา

ควรระมัดระวังการใช้ อินวีกา ทรินซา ในบางราย โดยเฉพาะในผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยว่ามีสภาวะทาง การแพทย์มากกว่าหนึ่งสภาวะ

1. ก่อนที่คุณจะเริ่มใช้ยาอินวีกา ทรินซา คุณควรแจ้งแพทย์ถ้าคุณมีหรือเคยมีอาการต่อไปนี้:

- กลุ่มอาการนิวโรเล็ปติกร้ายแรง (Neuroleptic Malignant Syndrome เป็นปฏิกิริยาร้ายแรงต่อยาบางชนิดที่ทำให้คุณหมดสติในร่างกายนั่งขึ้นเฉียบพลัน หัวใจเต้นเร็วมาก ความดันโลหิตสูงหรือต่ำอย่างมาก และกล้ามเนื้อแข็งเกร็ง หรือชักอย่างรุนแรง)
- อาการยีกยือ (Tardive dyskinesia เป็นปฏิกิริยาต่อยาบางชนิดที่ทำให้เกิดการเคลื่อนไหวนอกเหนืออำนาจจิตใจบริเวณลิ้น ใบหน้า ปาก ขากรรไกร แขน ขาหรือลำตัว)
- หัวใจเต้นไม่ปกติ ความดันโลหิตต่ำหรือสูง หรือเคยเกิดหัวใจวายหรือโรคหลอดเลือดสมองในอดีต
- คุณมีแนวโน้มที่จะมีนงเวลาลุกขึ้นยืนจากท่านอนหรือนั่ง

- เหนือออกมาอย่างผิดปกติ หรือท้องเสียมีภาวะขาดน้ำ หรือมีปัญหาในการควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย โรคลมชัก อากาการชัก มีการเคลื่อนไหวนอกเหนืออำนาจจิตใจหรือกระสับกระส่ายอย่างผิดปกติ
- มีหรือเคยมีความคิดฆ่าตัวตายในอดีต มีความพยายามฆ่าตัวตาย
- การอักเสบของปอดเนื่องจากการสำลัก (การสำลักอาหารหรือของเหลวเข้าไปในปอด)
- มีปัญหาในการกลืนหรือมีความผิดปกติของกระเพาะอาหารหรือลำไส้ที่ลดความสามารถที่จะผลักดันอาหารผ่านลงไปและ/หรือส่งผ่านต่อไปในระบบการเคลื่อนไหวของทางเดินอาหารปกติ
- มีปัญหาทางไตหรือตับ
- ภาวะสมองเสื่อม หรือภาวะสมองเสื่อมเนื่องจากโรค เลวีบอดี
 - ผู้สูงอายุที่ทนทุกข์จากภาวะสมองเสื่อมอาจมีความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดสมองหรือเสียชีวิตจากอินวิกา ทรินซาสูงขึ้น
- มีปัญหาในการสับสนหรือกระสับกระส่าย
- โรคพาร์กินสัน (ความผิดปกติในการเคลื่อนไหวและความคิดชนิดลุกลามซึ่งมีแนวโน้มที่จะมีผลต่อผู้สูงอายุ)
- หัวใจเต้นผิดปกติ
- โรคเบาหวานที่เกิดจากระดับน้ำตาลสูง

ถ้าคุณเป็นโรคเบาหวานอยู่แล้ว มีปัจจัยเสี่ยง (ได้แก่ น้ำหนักตัวเกิน หรือมีประวัติคนในครอบครัวเป็นโรคเบาหวาน) หรือมีอาการที่อาจเป็นโรคเบาหวาน (กระหายน้ำผิดปกติ อ่อนเพลีย มองเห็นภาพมัว ไม่สบายท้อง หรือปัสสาวะบ่อย) ควรทำการตรวจระดับน้ำตาลในเลือดเมื่อเริ่มต้นและในระหว่างการรักษา อาการข้างเคียงของโรคเบาหวานสามารถมีความรุนแรงและคุกคามต่อชีวิตได้
- โรคเกี่ยวกับหลอดเลือดในสมอง ได้แก่ โรคหลอดเลือดสมอง (stroke)
- อองคชาตแข็งตัวอย่างต่อเนื่อง และ/หรือ เจ็บปวดเมื่อองคชาตแข็งตัว (ที่เรียกว่า “ภาวะองคชาตแข็งค้าง”)
- ภาวะลิ่มเลือดอุดตัน

แจ้งแพทย์ถ้าคุณหรือคนอื่นในครอบครัวของคุณมีประวัติการเกิดภาวะลิ่มเลือดอุดตัน ภาวะลิ่มเลือดอุดตันที่ปอดหรือขาเกิดขึ้นได้เมื่อได้รับอินวิกา ทรินซา ภาวะลิ่มเลือดอุดตันในปอดสามารถเป็นผลให้เสียชีวิตได้
- จำนวนเม็ดเลือดขาวต่ำ

หากคุณมีจำนวนเม็ดเลือดขาวบางประเภทต่ำ คุณจะมีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อหรือมีไข้ ขณะได้รับอินวิกา ทรินซา

แจ้งแพทย์ถ้า:

- คุณมีแผนที่จะเข้ารับการผ่าตัดตา
 - แพทย์จำเป็นต้องประเมินว่าคุณมีความเสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อนจากการผ่าตัด (ที่เรียกว่า “ม่านต่าย้วยโป่งทะลุแผลผ่าตัด (Intraoperative Floppy Iris Syndrome)” สูงขึ้นหรือไม่ คุณอาจได้รับคำแนะนำให้หยุดใช้ อินวิกา ทรินซาชั่วคราวก่อนผ่าตัดตา
- คุณกำลังตั้งครรภ์หรือวางแผนที่จะตั้งครรภ์ แพทย์จะเป็นคนแนะนำว่าคุณควรหรือไม่ควรใช้อินวิกา ทรินซา
ทารกแรกเกิดจากแม่ที่ได้รับอินวิกา ทรินซา ในไตรมาสสุดท้ายของการตั้งครรภ์อาจมีความเสี่ยงต่อการดูดนมหรือหายใจลำบาก มีอาการสั่น กล้ามเนื้อแข็งเกร็ง และ/หรือ อ่อนแรง มีอาการง่วงนอน หรือภาวะกระสับกระส่าย
- คุณกำลังอยู่ในช่วงให้นมบุตร
- เนื่องจากอินวิกา ทรินซาถูกขับออกมาในน้ำนมได้ จึงแนะนำให้ให้คุณให้นมบุตรในระหว่างที่คุณใช้อินวิกา ทรินซา

กำลังใช้ยาตัวอื่นอยู่

แจ้งแพทย์หรือเภสัชกรถ้าคุณกำลังใช้ยาตัวอื่นอยู่ ซึ่งรวมถึงยาที่คุณสามารถซื้อได้โดยไม่ได้ใช้ใบสั่งแพทย์จากร้านขายยา ซูเปอร์มาร์เก็ต หรือร้านขายผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพ

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แจ้งแพทย์ของคุณถ้าคุณกำลังใช้:

- ยานอนหลับ ยาคลายกังวล ยาระงับปวด หรือยาแก้แพ้ที่เรียกว่ายาด้านฮิสตามีน
- ยาที่ใช้ในการรักษาโรคลมชักหรือโรคพาร์กินสัน
- ยาที่ใช้ในการรักษาโรคซึมเศร้า โรคตื่นตระหนก โรควิตกกังวล หรือโรคย้ำคิดย้ำทำ
- ยาที่ใช้ในการรักษาหัวใจเต้นผิดปกติหรือหัวใจล้มเหลว
- ยาที่ใช้ในการรักษาโรคความดันโลหิตสูง รวมถึงยาขับปัสสาวะ
- ยาอื่น ๆ ที่ใช้ในการรักษาความเจ็บป่วยทางจิต หรือปัญหาทางจิต
- ยาที่เพิ่มการทำงานของระบบประสาทส่วนกลาง (psychostimulants เช่น เมทิลเฟนิเดท (methylphenidate))
- ยาที่บรรเทาอาการคลื่นไส้หรืออาเจียน อาหารไม่ย่อย กรดไหลย้อนหรือปัญหาทางกระเพาะอื่น ๆ
- ยาบางชนิดที่ใช้รักษาโรคมะเร็ง
 - แพทย์จำเป็นที่จะพิจารณาว่ามียาข้างต้นชนิดใดที่มีผลต่ออินวิกา ทรินซาหรือไม่

ใช้ยาอย่างไร

การใช้ยาครั้งแรก

แพทย์จะไม่เริ่มให้การรักษาด้วยอินวีก้า ทรินซา จนกว่าจะทราบว่า คุณได้รับการรักษาด้วยยาอินวีก้า ซัส เทนนามาแล้วเป็นเวลาอย่างน้อย 4 เดือน

ขณะเริ่มต้นของการรักษา คุณอาจจะมีอาการคลื่นไส้หรือท้องร่วงที่ทำให้คุณรู้สึกมีแรงเมื่อยขึ้น หรือหัวใจของคุณเต้นเร็วขึ้น อาการเหล่านี้จะหายไปในเวลาไม่กี่วัน

กรุณาแจ้งแพทย์ถ้าอาการเหล่านี้เกิดขึ้นต่อเนื่องหรือทำให้คุณกังวล

ใช้ยาขนาดเท่าไร

แพทย์จะเป็นคนตัดสินใจถึงขนาดความแรงของยาอินวีก้า ทรินซาที่เหมาะสมสำหรับคุณ

บริหารยาอย่างไร

อินวีก้า ทรินซา ให้โดยการฉีดโดยบุคลากรทางการแพทย์ ยานี้ได้รับการออกแบบมาให้ค่อย ๆ ปลดปล่อยตัวยาสำคัญสู่ร่างกายของคุณ ดังนั้นคุณจึงไม่จำเป็นต้องฉีดยาทุกวัน

อินวีก้า ทรินซา เป็นผลิตภัณฑ์ที่ออกฤทธิ์นานโดยที่คุณจะได้รับยาเพียงแค่ 1 ครั้งในทุก ๆ 3 เดือน

แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์จะบริหารยาโดยการฉีดเข้าที่บริเวณต้นแขนหรือสะโพก คุณอาจมีความรู้สึกปวดหรือไม่สบายตัว แต่อาการจะดีขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป

ใช้ยาบ่อยแค่ไหน

หลังจากคุณได้รับยาในครั้งแรก แนะนำว่าให้อินวีก้า ทรินซา 1 ครั้ง ในทุก 3 เดือน อย่างไรก็ตาม แพทย์อาจเปลี่ยนแปลงขนาดยาโดยขึ้นอยู่กับคำตอบของร่างกายของคุณต่อยา

คุณมีความจำเป็นต้องได้รับยาฉีดจำนวนเท่าไร

อินวีก้า ทรินซา ช่วยในการควบคุมสภาวะของคุณ แต่ไม่ได้ช่วยให้หายขาดจากโรค ดังนั้น คุณมีความจำเป็นในการได้รับการฉีดอย่างต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมอ อย่าหยุดยาเองหรือไม่ไปฉีดตามนัด แม้ว่า你会รู้สึกดีขึ้นก็ตาม

จะเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณพลาดการฉีดยา

เป็นสิ่งสำคัญมากในการไปพบแพทย์ตามนัดทุกครั้งเพื่อที่คุณจะสามารถได้รับยาตรงเวลา

รีบติดต่อแพทย์โดยเร็วที่สุดเท่าที่คุณสามารถทำได้ ถ้าคุณคิดว่าคุณกำลังจะหรือไม่ได้ไปพบแพทย์ตามนัด

แพทย์จะเป็นคนตัดสินใจว่าคุณจะต้องทำอะไรต่อไป

สำหรับผู้ป่วยที่มีปัญหาทางไต

ยังไม่มีการศึกษาถึงการใช้อินวีก้า ทรินซา ในผู้ป่วยที่ไตทำงานไม่เหมาะสม แพทย์จะตัดสินใจถึงขนาดยาที่เหมาะสมกับคุณ

สำหรับผู้ป่วยที่มีปัญหาไตทำงานบกพร่องเล็กน้อย ขนาดยาสูงสุดที่แนะนำคือ 350 มิลลิกรัม ไม่แนะนำการใช้อินวีก้า ทรินซา ในผู้ป่วยที่มีปัญหาไตทำงานบกพร่องปานกลางหรือรุนแรง

ไม่แนะนำให้ใช้อินวีก้า ทรินซา ในเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี

การได้รับยาเกินขนาด

เนื่องจากคุณจะได้รับอินวีก้า ทรินซา ภายใต้ความดูแลของแพทย์ จึงมีความเป็นไปได้น้อยมากในการที่คุณจะได้รับยาเกินขนาด

อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณเกิดอาการข้างเคียงใด ๆ หลังจากได้รับอินวีก้า ทรินซา ให้รีบแจ้งแพทย์โดยทันที หรือไปที่แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉินที่โรงพยาบาลที่ใกล้คุณที่สุด

คุณอาจจำเป็นต้องได้รับการดูแลทางการแพทย์อย่างฉุกเฉิน

ในระหว่างที่คุณกำลังใช้ยา

สิ่งที่คุณต้องทำ

ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด ห้ามพลาดการฉีดยาหรือหยุดการรักษาโดยไม่ได้ทำการปรึกษากับแพทย์ก่อน

แพทย์มีความยินดีที่จะมีการพูดคุยปรึกษากับคุณถึงข้อสงสัยที่คุณมีเกี่ยวกับการรักษา

แจ้งแพทย์ถ้าคุณตั้งครรภ์หรือกำลังวางแผนที่จะตั้งครรภ์

รีบแจ้งแพทย์โดยทันทีถ้าคุณสังเกตเห็นมีอาการเคลื่อนไหวแบบควบคุมไม่ได้ ของลิ้น ปาก แก้ม หรือขากรรไกร ซึ่งอาจลุกลามไปที่แขนและขา

อาการเหล่านี้อาจเป็นกลุ่มอาการที่เรียกว่า อาการยีกยือ (tardive dyskinesia) ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้ในผู้ที่ใช้กลุ่มยาต้านโรคจิต ซึ่งรวมถึงอินวีก้า ทรินซา อาการนี้มักจะเกิดขึ้นในระหว่างที่มีการรักษาด้วยอินวีก้า ทรินซา ในระยะเวลาอันยาวนานขึ้นและในผู้หญิงที่มีอายุสูงขึ้น อาการเหล่านี้อาจเกิดขึ้นอย่างถาวรได้แต่พบในกรณีที่น้อยมาก อย่างไรก็ตาม ถ้าสามารถตรวจพบได้เร็ว อาการเหล่านี้ส่วนมากสามารถหายเป็นปกติได้

ถ้าคุณกำลังวางแผนที่จะทำการผ่าตัดดวงตา ให้แน่ใจว่าได้แจ้งจักษุแพทย์แล้วว่าคุณกำลังใช้ยาตัวนี้อยู่

แจ้งแพทย์คนอื่น ๆ ทันตแพทย์ และเภสัชกรผู้ที่ต้องการจ่ายยาตัวใหม่ใด ๆ ที่ระบุในหัวข้อ “กำลังใช้ยาตัวอื่นอยู่” ว่าคุณกำลังใช้อินวีก้า ตรินซาอยู่

แพทย์ ทันตแพทย์ หรือเภสัชกรจำเป็นที่จะต้องพิจารณาว่ามียาใหม่ชนิดใดหรือไม่ที่จะมีผลต่ออินวีก้า ตรินซา

สิ่งที่ห้ามทำ

ห้ามพลาดการฉีดยาหรือไม่ไปพบแพทย์ตามนัด

ห้ามดื่มแอลกอฮอล์

อินวีก้า ตรินซา สามารถเพิ่มฤทธิ์ของแอลกอฮอล์ได้

สิ่งที่ต้องระมัดระวัง

สอบถามแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยาตัวอื่น

อินวีก้า ตรินซาสามารถเพิ่มฤทธิ์ของยาอื่นซึ่งมีผลต่อคุณ สอบถามแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยาอื่นเสมอ รวมถึงยาสมุนไพรและยาที่ซื้อจากร้านขายยาทั่วไปหรือซูเปอร์มาร์เก็ต

หลีกเลี่ยงการขับขี่หรือใช้เครื่องจักร จนกว่าคุณจะมั่นใจว่าอินวีก้า ตรินซาไม่มีผลต่อการตื่นตัวของคุณ

อินวีก้า ตรินซา อาจส่งผลให้มีอาการมึนงง ซึม หรือวิงเวียน ในบางคน คุณควรแน่ใจว่าคุณทราบว่ายานินวีก้า ตรินซา ส่งผลอย่างไรกับคุณก่อนที่จะขับรถ ใช้เครื่องจักร หรือกระทำการอื่นที่อาจเป็นอันตรายได้ถ้าคุณมีอาการมึนงง

ถ้ายาทำให้คุณรู้สึกวิงเวียน มึนงง หรือเป็นลม ให้ระมัดระวังเมื่อคุณเปลี่ยนท่าจากขณะลุกขึ้นยืนจากการนั่งหรือนอน

การลุกขึ้นยืนอย่างช้า ๆ สามารถช่วยได้

หลีกเลี่ยงการรับประทานมากเกินไป

มีความเป็นไปได้ที่น้ำหนักตัวจะเพิ่มขึ้นเมื่อใช้อินวีก้า แพทย์อาจตรวจติดตามน้ำหนักตัวของคุณหรือแนะนำวิธีการเพื่อช่วยในการควบคุมน้ำหนัก

อาการข้างเคียง

ยาทุกตัวอาจมีอาการไม่พึงประสงค์บางอย่าง ในบางครั้งอาการไม่พึงประสงค์จะมีความรุนแรง แต่ส่วนใหญ่แล้วอาการที่เกิดขึ้นมักจะไม่รุนแรงแพทย์จะเป็นคนประเมินความเสี่ยงจากการใช้ยากับผลดีที่จะได้รับให้คุณ

ยาทุกตัวสามารถทำให้เกิดอาการข้างเคียงได้ คุณอาจจำเป็นต้องได้รับการรักษาทางการแพทย์ถ้าคุณเกิดมีอาการข้างเคียงบางอย่าง

กรุณาสอบถามแพทย์หรือเภสัชกรในข้อสงสัยที่คุณมี

รีบแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรโดยเร็วที่สุดเท่าที่ทำได้ถ้าคุณรู้สึกไม่สบายในระหว่างที่ใช้อินวีگا ทรินซา ยาจะช่วยรักษาอาการของโรคจิตเภทของ ผู้ป่วยส่วนใหญ่ แต่อาจพบอาการไม่พึงประสงค์ได้ในผู้ป่วยบางราย

แจ้งแพทย์ถ้าคุณมีอาการเหล่านี้เกิดขึ้นหรือทำให้คุณกังวลใจ:

มีความลำบากในการคิด ทำงานหรือทำกิจวัตรประจำวันตามปกติ เนื่องจาก:

- ปวดศีรษะ
- มีอาการสั่น กล้ามเนื้ออ่อนแรง ยืนได้ไม่มั่นคง การเดินขาดการประสานงานกัน หรือเดินช้าและลากขา
- นอนหลับยากหรือนอนหลับได้ไม่นาน
- สลึมสลือ เหนื่อย ไม่มีสมาธิ
- ปวดที่บริเวณที่ฉีดยา

การเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรม ได้แก่:

- หงุดหงิดง่ายหรือกระสับกระส่าย
- กังวลใจหรือซึมเศร้าผิดปกติ
- ภาวะไม่มีอารมณ์ตอบสนอง
- มีอารมณ์เพิ่มขึ้นอย่างผิดปกติ

การเปลี่ยนแปลงด้านการเคลื่อนไหว ได้แก่:

- กล้ามเนื้อหรือข้อแข็งเกร็งหรือปวด มีอาการปวดกระดูกหรือกล้ามเนื้อ
- อาการอยู่ไม่สุข มีการเคลื่อนไหวซ้ำๆหรือนอกเหนือการควบคุม
- มีการเคลื่อนไหวอย่างผิดปกติบนใบหน้าโดยตาเหลือกค้าง

การเปลี่ยนแปลงด้านอื่น ๆ ได้แก่:

- ความอยากอาหารเพิ่มขึ้นโดยไม่ทราบสาเหตุหรือน้ำหนักเพิ่ม
- ไข้หวัดหรืออาการคล้ายไข้หวัดใหญ่
- ติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะ
- อาการตาถลอก

- ปวดฟัน
- ปากแห้ง การรับรสเปลี่ยน น้ำลายไหลยืด
- สีว
- ผิวหนังแห้ง
- ผิวหนังหยาบกร้าน
- เลือดกำเดาไหล
- ไม่สามารถถ่ายปัสสาวะได้หรือมีอาการเจ็บปวดในระหว่างปัสสาวะ
- อาเจียน อาหารไม่ย่อย คลื่นไส้ ปวดท้อง
- ท้องเสีย
- ท้องผูก
- ภาวะน้ำนมไหลผิดปกติ
- เต้านมบวม
- ประจำเดือนขาดหรือผิดปกติ
- การแข็งตัวขององคชาตเกิดขึ้นยากหรือเกิดขึ้นไม่นาน; หรือมีการแข็งตัวขององคชาตอย่างต่อเนื่องและ/หรือ เจ็บปวดเมื่อองคชาตแข็งตัว
- อาการเหล่านี้เป็นอาการข้างเคียงที่ไม่รุนแรงของอินวีگا ตรินซา แต่อาจต้องได้รับการดูแลทางการแพทย์

รีบแจ้งแพทย์โดยทันที หรือไปที่แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉินที่โรงพยาบาลที่ใกล้คุณที่สุด ถ้าคุณมีอาการต่อไปนี้:

ปัญหาเกี่ยวกับหัวใจหรือความดันโลหิต ได้แก่:

- ความดันโลหิตตก มองเห็นภาพมัวอาการเวียนศีรษะ หรือมึนงง โดยเฉพาะเวลาขึ้นจากการนั่งหรือนอน
- อัตราการเต้นของหัวใจเร็วมาก อัตราการเต้นของหัวใจช้าลง หัวใจเต้นผิดปกติ

อาการของภาวะน้ำตาลในเลือดสูงหรือโรคเบาหวาน ได้แก่:

- รู้สึกหิวน้ำตลอดเวลา มีการถ่ายปัสสาวะ หรือ “ฉี่” บ่อยกว่าปกติ หรือรู้สึกอ่อนแรงหรือหิว

มีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของร่างกาย ได้แก่:

- ไข้
- อุณหภูมิของร่างกายสูงโดยไม่ทราบสาเหตุ เหงื่อออกมากเกินไปหรือหายใจเร็ว
- การเคลื่อนไหวนอกเหนือการควบคุมบริเวณลิ้น ปาก แก้มหรือขากรรไกร

อาการเหล่านี้อาจเป็นอาการข้างเคียงที่รุนแรงจากอินวีก้า ทรินซา คุณอาจจำเป็นต้องได้รับการดูแลทางการแพทย์อย่างเร่งด่วน

อาการข้างเคียงที่รุนแรงที่พบได้ไม่บ่อย

ถ้ามีอาการใด ๆ เหล่านี้เกิดขึ้น ให้หยุดใช้อินวีก้า ทรินซาอีกต่อไปและรีบแจ้งแพทย์โดยทันที หรือไปที่แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉินที่โรงพยาบาลที่ใกล้คุณที่สุด:

- ผื่นผิวหนัง คัน หรือลมพิษบนผิวหนัง; หายใจถี่หอบ หายใจมีเสียงหวีด หรือมีความลำบากในการหายใจ; มีอาการบวมบริเวณใบหน้าริมฝีปาก ลิ้น หรือส่วนอื่น ๆ ของร่างกาย ถ้าคุณมีอาการเหล่านี้ คุณอาจเกิดปฏิกิริยาการแพ้อย่างรุนแรงต่ออินวีก้า ทรินซา
- มีอาการอ่อนแรงกระแทกหัน หรือขาบริเวณใบหน้า แขน หรือขา โดยเฉพาะเกิดขึ้นบนร่างกายซีกเดียว หรือกรณีมีอาการพูดหรือออกเสียงไม่ชัดบ่อยๆ (slurred speech) (อาการเหล่านี้ เรียกว่าสมองขาดเลือดชั่วคราว (mini-strokes))
- การเคลื่อนไหวนอกเหนือการควบคุมบริเวณลิ้น ใบหน้า ปาก ขากรรไกร แขน ขา หรือลำตัว (อาการแสดงของ tardive dyskinesia)

อาการเหล่านี้อาจเป็นอาการข้างเคียงที่ร้ายแรงมาก คุณอาจจำเป็นต้องได้รับการดูแลทางการแพทย์อย่างเร่งด่วน หรือเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล

แจ้งแพทย์ถ้าคุณสังเกตพบอาการข้างเคียงอื่น ๆ ที่ทำให้คุณรู้สึกไม่สบาย

อาการข้างเคียงอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุในรายการด้านบนอาจเกิดขึ้นได้ในบางคน

โปรดอย่าลังเลที่จะรายงานอาการข้างเคียงใด ๆ ต่อแพทย์หรือเภสัชกร

โปรดอย่าตื่นตระหนกกับรายการของอาการข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นได้

คุณอาจจะไม่เกิดอาการเหล่านี้ขึ้นก็ได้

หลังจากใช้ยา

การเก็บยารักษา

อินวีก้า ทรินซา จะถูกจัดเก็บโดยแพทย์หรือเภสัชกร ยาจะถูกเก็บในที่แห้ง ป้องกันจากแสง ห้ามเก็บที่อุณหภูมิมากกว่า 30 องศาเซลเซียส เก็บยาให้พ้นจากสายตาและมือเด็ก

แพทย์หรือเภสัชกรจะไม่ใช้ยาภายหลังจากวันหมดอายุ ที่ได้มีการระบุไว้บนบรรจุภัณฑ์

ไม่สามารถเก็บยาไว้ใช้ได้โดยไม่มีการกำหนดไว้ แม้ว่าจะมีการจัดเก็บยาเป็นอย่างดีก็ตาม

คำอธิบายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

ยาหน้าตาเป็นอย่างไร

อินวีก้า ทรินซา อยู่ในรูปแบบหลอดบรรจุยาพร้อมฉีดยา ซึ่งประกอบด้วยปริมาณของพาลีเพอริโดน (ในรูปแบบ พาลมิเตท) ที่แตกต่างกัน ในบรรจุภัณฑ์ยังประกอบด้วยเข็มฉีดยา (safety needle)

ส่วนประกอบของยา

ตัวยาสําคัญใน อินวีก้า ทรินซา คือ พาลีเพอริโดน (ในรูปแบบ พาลมิเตท)

ในหลอดบรรจุยาพร้อมฉีดยาประกอบด้วยยาพาลีเพอริโดนขนาด 175, 263, 350 และ 525 มิลลิกรัม (ในรูปแบบ พาลีเพอริโดน พาลมิเตทขนาด 273, 410, 546 และ 819 มิลลิกรัม ตามลำดับ)

สารประกอบที่ไม่ออกฤทธิ์ คือ กรดซิตริกโมโนไฮเดรต, แมคโครกอล 4000, โพลีซอร์เบต 20, โซเดียมฟอสเฟตโมโนเบสิก, โซเดียมไฮดรอกไซด์, น้ำสำหรับยาฉีด

เอกสารกำกับยาฉบับนี้ถูกจัดเตรียมเมื่อ ตุลาคม 2559

ผลิตโดย

Janssen Pharmaceutica NV
Beerse, Belgium (ประเทศเบลเยียม)

เลขทะเบียนตำรับยา

1C 53/60 (NC)

วันที่ได้รับอนุมัติทะเบียนตำรับยา

3 สิงหาคม 2560

นำเข้าโดย

บริษัท แจนเซน-ซีแลก จำกัด

106 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง

กรุงเทพฯ 10520

โทรศัพท์: 02-792-7200

โทรสาร: 02-792-7222

โปรดอ่านเอกสารกำกับยาสำหรับแพทย์ฉบับเต็มได้ที่ทางเว็บไซต์ <http://ndi.fda.moph.go.th/>