

เอกสารกำกับยาสำหรับประชาชน

มาตรฐานเวียร์ ความแรง 150 มิลลิกรัม ชนิดเม็ด
มาตรฐานเวียร์ ความแรง 400 มิลลิกรัม ชนิดเม็ด
มาตรฐานเวียร์ ความแรง 600 มิลลิกรัม ชนิดเม็ด

ชื่อการค้า ดารุแทบ (DARUTAB)

1. ยานี้ต้องยาอะไร

1.1 ยานี้มีชื่อสามัญว่าอะไร

- ดารุเนียร์ (Darunavir) เป็นยาด้านไวรัสอยู่ในกลุ่มยังยังเงนไขซีโนปรีวิช

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ในรักษาโรคติดเชื้อเอชไอวีเชิงเดียวที่ 1 (HIV-1) โดยใช้ร่วมกับยาต้านไวรัสอื่นๆ ในผู้ที่อายุ 3 ปีขึ้นไป และมีน้ำหนักตัวมากกว่า 15 กิโลกรัม

2. ข้อควรรู้ก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยาเม็ดเมื่อไร

- ☒ เด็กเท่านี้ หรือส่วนประกอนอ่อนในตารับ
- ☒ ห้ามใช้เมื่อมีภาวะตับทำงานผิดปกติอย่างรุนแรง
- ☒ ยานี้ห้ามใช้ร่วมกับยาหลายชนิด เช่น
 - Ⓐ ยาต้านชาต่ออนออกทามาก็อก โลหิต เช่น อคุดีน, ราโนลาซิน, ชีลเดนาร์ฟิล
 - Ⓐ ยาต้านเชื้อรา เช่น ฟิโนไซด์
 - Ⓐ ยาต้านชาโรคเก่าท์ เช่น โคลชิเซน
 - Ⓐ ยาต้านไขมันในเลือด เช่น เออร์โกทามิน
 - Ⓐ ยาลดการเคลื่อนตัวของฟ้าใส เช่น ซิสชาไพรด์
 - Ⓐ ยานอนหลับ เช่น โนมาโซแนล, ไตรอะโซแนล
 - Ⓐ ยาลดไข้พัน เช่น ชิมัวสแตทิน, โลวาสแตทิน
 - Ⓐ ยาต้านไวรัสโรค เช่น ไวนิฟานทีซิน
 - Ⓐ ยาต้านเชื้อสาบิเนบานาซิต เช่น แอลเซเตฟีโซล, เทอเรฟีนาเด็น
 - Ⓐ สมุนไพรเช่นตัวหันล่าวอร์ด

“ต้องแจ้งแพทย์เมื่อเกิดสัมผัสกับยาเม็ด”

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยา

- อาจมีผลเสียร้ายแรงเมื่อเป็นคนที่มีโรคตับ หรือเกิดอันตรายได้
 - โรคตับ
 - โรคเบาหวาน
 - โรคเลือดในหลอดเลือด ซึ่งมีพิษเรื้อรัง
 - โรคเกี่ยวกับกระดูกและกล้ามเนื้อ
 - โรคติดเชื้อ เช่น ไวรัสตัวอ่อนน่าเหลืองติด
 - แพ้ยากลุ่มชั้นฟ้า
- แจ้งแพทย์เมื่อเกิดสัมผัสรากษาหากทำงานวางแผนที่จะมีบุตร หรือตั้งครรภ์ หรือให้นมบุตร
- แจ้งรายชื่อยา สมุนไพร และอาหารเสริมทุกชนิดที่ทำให้รับประทานในช่วงเวลาที่ใช้ยา เมื่อแพทย์หรือเภสัชกรทราบทั้งรู้ เพื่ออาจมีผลต่อการรักษาหรือเกิดอันตรายได้

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- **ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรอย่างเคร่งครัด** เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยาเม็ดต้องคำนึงถึงความตุนแรงของโรค
- **กินยาเม็ดร่วมอาหาร**

3.2 หากต้มกินยา ควรนำไปย่างไว้

- ถ้ากินยาวันละ 1 ครั้ง และน้ำกอออกภายนอกใน 12 ชั่วโมง ให้กินยาหันทันที่ที่นี่ก็ได้
แต่ถ้ากินกันตุ่นๆ 12 ชั่วโมง ไม่ต้องกินยาเมื่อตอนนั้น ให้รอกินยาของเมื่อต่อไป และห้ามกินยาเพิ่มเป็น 2 เท่า
- ถ้ากินยาวันละ 2 ครั้ง และน้ำกอออกภายนอกใน 6 ชั่วโมง ให้กินยาหันทันที่ที่นี่ก็ได้
แต่ถ้ากินกันตุ่นๆ 6 ชั่วโมง ไม่ต้องกินยาเมื่อตอนนั้น ให้รอกินยาของเมื่อต่อไป และห้ามกินยาเพิ่มเป็น 2 เท่า

3.3 ถ้ากินยาเม็ดเกินขนาดที่แนะนำ ควรหาอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง ให้รีบไปรักษาแพทย์ทันที

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- ให้กินยาเม็ดติดต่อ กันทุกวันตามคำแนะนำของแพทย์ หรือเภสัชกร และห้ามหยุดยาเองก่อนปรึกษาแพทย์ มิฉะนั้นจะชื่อจะต้องหาย
- หมาดแพทย์ตามนัดด้วยยารักษาเมื่อต้องหาย

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 หากใช้ยาแล้วเกิดอาการ เช่น

- บานมีไข้ ฝริ้งค์ ไข้สูง ลมพิษ
- ใจสั่น หัวใจบั่น ปืนลม แห้งเหนืออก หายใจลำบาก
- ฟันแตก ตุ่มห่อง ผิวน้ำหนักลุดลอก มีจ้ำดามผิวน้ำหนักหรือเลือดออกผิดปกติ
- ตัวเหลือง ตาเหลือง ปัสสาวะมีสีเข้มข้น อุจจาระสีชีดลง เจ็บบริเวณห้องค้านขาวเหมือนสีตะกั่ว

“ต้องรีบไปพบแพทย์ทันที”

5.2 หากใช้ยาแล้วเกิดอาการ เช่น

- ปวดหัว อ่อนเพลีย นอนไม่หลับ
 - ตานแดง ตาพร่า มองเห็นไม่ชัด
 - ห้องเสียว คลื่นไส้ อาเจียน
 - ปวดหัว หัวใจดี อาหารไม่ย่อย
 - ปวดกล้ามเนื้อ กล้ามเนื้ออ่อนแรง มือและเท้าชา “ห้ามดื่มน้ำ
- แต่ถ้ากินยาเม็ดกันตุ่นๆ 6 ชั่วโมง ไม่ต้องกินยาเมื่อตอนนั้น ให้รอกินยาของเมื่อต่อไป และห้ามกินยาเพิ่มเป็น 2 เท่า”

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บยาไว้ในภาชนะมีฝาปิดทึบ
- ห้ามยาออกจากราดเนื้อจะกินในแต่ละครั้งเท่านั้น
- เก็บยาในที่แห้ง คลายให้โดดแสงโดยตรง โดยทั่วไปควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส
- ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาทุกชนิดให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยา

ลักษณะยา

ตารางทับ (150 มิลลิกรัม): เม็ดอุปรีบุน เคลือบฟิล์มสีขาว ต้านหนึ่งมีชื่อแบ่งครึ่ง และมีอักษร "D" อยู่ด้านข้าง และ อักษร "A" อยู่ด้านขวา อีกด้านหนึ่งมีอักษร "150"

ตารางทับ (400 มิลลิกรัม): เม็ดอุปรีบุน เคลือบฟิล์มสีขาว ต้านหนึ่งมีชื่อแบ่งครึ่ง และมีอักษร "D" อยู่ด้านข้าง และ อักษร "A" อยู่ด้านขวา อีกด้านหนึ่งมีอักษร "400"

ตารางทับ (600 มิลลิกรัม): เม็ดอุปรีบุน เคลือบฟิล์มสีขาว ต้านหนึ่งมีชื่อแบ่งครึ่ง และมีอักษร "D" อยู่ด้านข้าง และ อักษร "A" อยู่ด้านขวา อีกด้านหนึ่งมีอักษร "600"

ส่วนประกอบของยา

microcrystalline cellulose, crospovidone, sodium starch glycolate, hydroxypropyl methylcellulose, colloidal silicon dioxide, magnesium stearate, polyvinyl alcohol, polyethylene glycol, titanium dioxide, and talcum

ผู้ผลิต องค์การเภสัชกรรม 75/1 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ กรกฎาคม พ.ศ. 2561