

เทรลากริปติน 100 มิลลิกรัม ชนิดเม็ด [ซาฟาเทค]

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อสามัญว่าอะไร

- ยานี้มีชื่อสามัญว่า เทรลากริปติน (trelagliptin) เป็นยาในกลุ่มลดระดับน้ำตาลในเลือด

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ใช้รักษาโรคเบาหวานชนิดที่สอง หรือเบาหวานชนิดไม่พึ่งอินซูลิน

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้หรือส่วนประกอบอื่นๆในยานี้
- เป็นโรคไตบกพร่องระดับรุนแรง
- เป็นโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ต้องล้างไต
- เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 1
- เป็นผู้ป่วยที่มีน้ำตาลในเลือดสูงมากขั้นรุนแรง (ภาวะคีโตนแอซิโดซิส) ซึ่งสังเกตได้จากอาการคลื่นไส้ อาเจียนมาก ปวดท้อง บัสสาวะมาก คอแห้ง กระหายน้ำมาก หายใจหอบลึก ลมหายใจมีกลิ่นหวาน
- เป็นผู้ป่วยภาวะติดเชื้อมัน
- เป็นผู้ป่วยที่ได้รับอุบัติเหตุรุนแรง

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

- หากท่านมีภาวะต่อไปนี้ ให้ปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ยา เพราะอาจทำให้โรครุนแรงขึ้น หรือเกิดอันตรายจากการใช้ยา
 - ผู้มีอายุน้อยกว่า 18 ปี
 - ผู้มีอายุมากกว่า 65 ปี
 - หญิงตั้งครรภ์ หญิงที่สงสัยหรือมีแนวโน้มจะตั้งครรภ์ และหญิงให้นมบุตร
 - ผู้ที่มีภาวะการดำเนินงานของไตบกพร่อง

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรเท่านั้น เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค
- ยานี้กินสัปดาห์ละครั้ง ในวันเดียวกันของทุกสัปดาห์
- ให้กลืนยาทั้งเม็ด ห้ามแบ่ง เคี้ยว หรือบดเม็ดยา

3.2 หากลืมกินยาควรทำอย่างไร

- ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรเมื่อลืมกินยานี้
- โดยทั่วไปให้กินยาทันทีที่นึกได้ มีข้อต่อไปให้กินตามวันเดิมของสัปดาห์ ตามที่แพทย์สั่ง

3.3 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้หยุดกินยา และสังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติ ให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที
- และให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนกินยาเม็ดถัดไป

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างการใช้ยา

- ควบคุมอาหารและออกกำลังกายระหว่างการใช้นี้
- ไม่ควรใช้ยานี้ร่วมกับเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
- ห้ามกินยานี้ในขนาดสูงกว่าที่แพทย์หรือเภสัชกรแนะนำ
- ห้ามหยุดยาเอง และให้กินยานี้อย่างต่อเนื่องตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกร
- พบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตามผลการรักษาและอันตรายที่อาจเกิดจากยา

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยา แล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีจุดตามผิวหนังหรือเลือดออกผิดปกติ

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์ทันที

- อาการน้ำตาลในเลือดต่ำ สังเกตจากอาการต่อไปนี้ รึงเวียน มึนงง หน้ามืด ตาลาย ใจสั่น เหงื่อออก หัวจะเป็นลม ให้รีบดื่มน้ำหวาน หรืออมลูกอม ถ้าอาการยังไม่ดีขึ้น ให้พบแพทย์ทันที
- ปวดหัว
- อาการเจ็บข้อ

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บยาไว้ในภาชนะบรรจุเดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บในที่แห้ง อบอุ่นโดยตรง โดยทั่วไปควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถยนต์ ห้องนำห้องครัว เป็นต้น
- ควรแกะยาออกจากแผง เมื่อจะกินในแต่ละครั้งเท่านั้น ห้ามแกะยาออกจากแผงและทิ้งไว้ เพราะยาอาจเสียได้
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

ผลิตโดย : ทาเคดา ฟาร์มาซูติคัล คอมพานี ลิมิเต็ด, ประเทศญี่ปุ่น

นำเข้าโดย : บริษัท ทาเคดา (ประเทศไทย) จำกัด, กรุงเทพมหานคร

จัดจำหน่ายโดย : บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด, กรุงเทพมหานคร

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ 8 มกราคม 2561

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ หากมีข้อสงสัย
ให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร