

ทีโนโฟเวียร์ อะลาฟิनाไมด์ 25 มิลลิกรัม

ชนิดเม็ด

ชื่อการค้า : เวมลิดี (Vemlidy®)

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อสามัญว่าอะไร

ยานี้มีชื่อว่า ทีโนโฟเวียร์ อะลาฟินาไมด์ (Tenofovir alafenamide) เป็นยาในกลุ่ม ยาต้านไวรัส

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

ยานี้ใช้รักษาโรคตับอักเสบเรื้อรังจากไวรัสตับอักเสบบีในผู้ป่วยที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไปและมีน้ำหนักตัว 35 กิโลกรัมขึ้นไป

2. ข้อควรรู้ก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

- ควรหลีกเลี่ยงหรือปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ยานี้ ในกรณีต่อไปนี้ เพราะอาจทำให้โรครุนแรงขึ้น หรือเกิดอันตรายจากยานี้มากขึ้น
 - เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีหรือน้ำหนักน้อยกว่า 35 กิโลกรัม เนื่องจากไม่มีข้อมูลความปลอดภัย
 - โรคตับระยะท้าย ควรอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดเพื่อลดความเสี่ยงต่ออันตรายจากยา
 - โรคไต เนื่องจากอาจเกิดพิษจากยาได้ง่าย
 - โรคตับอักเสบซี โรคตับอักเสบดี เนื่องจากไม่มีข้อมูลความปลอดภัย
 - โรคติดเชื้อเอชไอวี เพื่อแพทย์จะวางแผนการรักษาได้อย่างเหมาะสมและลดอันตรายจากยา

- แจ้งแพทย์หากท่านอยู่ในกลุ่มต่อไปนี้

- ตั้งครรภ์หรือคาดว่าจะตั้งครรภ์ ควรปรึกษาแพทย์ เรื่องการคุมกำเนิด เนื่องจากยังไม่มีการศึกษา ความปลอดภัยต่อทารก
- กำลังให้นมบุตร เพราะยังไม่มีข้อมูลความปลอดภัยของทารกที่ได้รับยาผ่านทางนมแม่
- แพ้แลคโตส เนื่องจากยานี้มีแลคโตสเป็นส่วนผสม อาจเกิดอาการข้างเคียงเช่น ท้องเสีย ได้
- ไม่ควรใช้ยานี้ร่วมกับยาหรือเครื่องดื่มต่อไปนี้ เพราะอาจมีผลต่อการรักษาหรือเกิดอันตรายได้ เช่น
 - ยาต้านวัณโรคบางชนิด
 - ยากันชักบางชนิด
 - ยาต้านไวรัสเอดส์บางชนิด
 - ยาต้านเชื้อราบางชนิดหากท่านไม่แน่ใจว่ากำลังใช้ยาดังกล่าวอยู่หรือไม่ ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้ ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือ เภสัชกร เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค

- กินยารวันละ 1 ครั้ง พร้อมอาหาร เพื่อเพิ่มการดูดซึมยา
- หากอาเจียนภายใน 1 ชั่วโมงหลังจากกินยา ให้กินยาซ้ำได้ แต่ถ้าเกิน 1 ชั่วโมง ไม่ต้องกินยาซ้ำ

3.2 หากลืมกินยาควรทำอย่างไร

- ถ้านึกออกภายใน 18 ชั่วโมง ให้กินยาทันทีที่นึกได้
- ถ้าลืมกินเกิน 18 ชั่วโมง ไม่ต้องกินยามี้อันนั้น ให้รอกินยาของมื้อต่อไป และห้ามกินยาเพิ่มเป็น 2 เท่า

3.3 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้ปรึกษาแพทย์หรือสังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรงให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- ใช้ยานี้ตามแพทย์สั่งอย่างเคร่งครัด หากอาการแย่ลงหรือมีผลข้างเคียงจากยาที่ทนไม่ได้ให้แจ้งแพทย์
- ห้ามหยุดหรือปรับขนาดยาเอง เพราะอาจทำให้อาการของโรคกำเริบได้
- พบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตามผลการรักษาหรืออันตรายจากยา
- ในระหว่างใช้ยานี้ ต้องป้องกันการแพร่โรคตับอักเสบบีไปยังผู้อื่น โดยสวมถุงยางทุกครั้งเมื่อมีเพศสัมพันธ์ ไม่บริจาคเลือด ไม่ใช้อุปกรณ์ส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น เช่น มีดโกน แปรงสีฟันหรือของใช้ที่มีเลือดติดอยู่ เป็นต้น
- ระมัดระวังการขับขี่ยานยนต์ หรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกล หรือทำงานที่เสี่ยงต่อการพลัดตกจากที่สูง เนื่องจากยานี้อาจทำให้รู้สึกเวียนศีรษะ

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 หากใช้ยาแล้วเกิดอาการ เช่น

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีจ้ำตาม ผิวหนัง หรือเลือดออกผิดปกติ
- ปวดหัว เวียนหัว รุนแรง
- ปวดท้อง คลื่นไส้ อาเจียนรุนแรง
- รู้สึกอ่อนเพลียรุนแรง

"ต้องรีบไปพบแพทย์ทันที"

5.2 หากใช้ยาแล้วเกิดอาการ เช่น

- ปวดมวนท้อง อาหารไม่ย่อย

"ให้รอดูอาการ"

แต่ถ้ามีอาการรุนแรงควรไปพบแพทย์ "

หากมีอาการไม่พึงประสงค์ใดๆ ที่สงสัยว่าเกิดจากการใช้ยานี้ โปรดแจ้งแพทย์และผู้รับผิดชอบการวางจำหน่ายในประเทศ

(หมายเลขโทรศัพท์ 02-257-3500)

เพื่อติดตามความปลอดภัยจากการใช้ยา

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บไว้ในภาชนะบรรจุเดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อย่าให้โดนแสงโดยตรง โดยทั่วไปควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

ลักษณะยา : ยาเม็ดเคลือบฟิล์ม รูปกลมสีเหลือง ด้านหนึ่งมีตัวอักษร "GSI" อีกด้านหนึ่งมีตัวอักษร "25"

ส่วนประกอบของยา :

ตัวยาออกฤทธิ์ : ทีโนโฟเวียร์ อะลาฟีนาไมด์

ส่วนประกอบอื่น : แลคโตส ไมโครคริสตัลลีน เซลลูโลส ครอสคาร์เมลโลส แมกนีเซียมสเตียเรต โพลีไวนิลแอลกอฮอล์ ไททาเนียมไดออกไซด์ แมโครกอล ทัลก์ ไอรอนออกไซด์เฮลโล

ผู้ผลิต Patheon Inc., Canada

ผู้นำเข้า/ผู้แทนจำหน่าย DCH Auriga (Thailand) Limited

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ สิงหาคม 2561

**เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร**