

อะพรีมิลาสต์
10, 20, 30 มิลลิกรัม / เม็ด
ชนิดเม็ด

1. ยานี้คือยาอะไร

1.1 ยานี้มีชื่อสามัญว่าอะไร

- ยานี้มีชื่อสามัญว่า อะพรีมิลาสต์ (apremilast) เป็นยาในกลุ่มที่ใช้รักษาสะเก็ตเงิน |

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

ยานี้ใช้เพื่อ รักษาโรคสะเก็ตเงินแบบผื่นหนาระดับปานกลางถึงรุนแรง และ โรคข้ออักเสบสะเก็ตเงินในผู้ใหญ่ |

2. ข้อควรรู้ก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เดยแพ้ยา หรือส่วนประกอบของยา |
- เมื่อตั้งครรภ์ หรือวางแผนจะตั้งครรภ์
- เมื่ออยู่ในระยะให้นมบุตร |

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้ หากท่านมีภาวะต่อไปนี้

- ผู้ที่มีอายุน้อยกว่า 18 ปี
- ผู้ที่มีประวัติภาวะซึมเศร้า และ/หรือมีความคิดหรือพฤติกรรมฆ่าตัวตาย
- ผู้ที่แพ้น้ำตาลจากนม (แลคโตส)
- ผู้ป่วยโรคไต
- ระมัดระวังการใช้ยาที่ร่วมกันยา ไวน์พิชิน คาร์บามาซีพิน ฟีโนบาร์บิทอล เฟนิตอยน์ เชนต์จอห์น เวิร์ต |

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้ ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือ เกลส์ชกร เพาะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยาที่เข้มข้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค

- กสีนยาทั้งเม็ด
- ห้ามหักแบ่ง บด หรือเคี้ยวเม็ดยา |

3.2 หากลืมกินยาควรทำอย่างไร

- ให้กินยาทันทีที่นึกได้ แต่ถ้าใกล้เวลาของมื้อต่อไปให้รอ กินยาของมื้อต่อไป และห้ามกินยาเพิ่มเป็น 2 เท่า |

3.3 ถ้ากินยาที่เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรงให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที |

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- ห้ามหยดยาเอง และให้กินยาที่อย่างต่อเนื่องตามคำแนะนำของแพทย์ หรือเกลส์ชกร
- แจ้งแพทย์ หรือเกลส์ชกรทุกครั้งว่ารับประทานยาอะพรีมิลาสต์อยู่
- พบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตามผลการรักษาหรืออันตรายจากยา |

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องรีบไปพบแพทย์ทันที

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอกร หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีจ้ำตามผิวหนัง หรือเลือดออกผิดปกติ
- อาการหายใจลำบาก และมีเสียงหวิด
- มีความรู้สึกซึมเศร้า ความคิดฆ่าตัวตาย หรือพฤติกรรมฆ่าตัวตาย |

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ต้องมีอาการ

รุนแรงให้ไปพบแพทย์ทันที

- ห้องเสีย คลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง อาหารไม่ย่อย
- ความอყ苦难อาหารลดลง น้ำหนักลด
- ไอ เป็นหวัด คัดจมูก จมูก/คอ/ไข้น้อกเสบ
- รู้สึกเหนื่อยอ่อน นอนหลับยาก
- ปวดหัว ปวดในเกรน
- ปวดหลัง ปวดข้อ ข้อบวม
- ความดันเลือดสูงขึ้น |

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บไว้ในภาชนะบรรจุเดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อย่าให้โดนแสงโดยตรง โดยห้าม ควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- ควรแกะยาเมื่อกินในแต่ละครั้งเท่านั้น ห้ามแกะยาออกจากแพลงท์ไวน์เป็นเวลานาน เพราะยาอาจเสียได้ |
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก ผู้ผลิต/ผู้นำเข้า/ผู้แทนจำหน่าย |

Celgene Limited กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย |
เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ 19 กันยายน 2560

**เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเกลส์ชกร**

