

ไอซาโซมิบ 2.3 มิลลิกรัม ชนิดแคปซูล
ไอซาโซมิบ 3 มิลลิกรัม ชนิดแคปซูล
ไอซาโซมิบ 4 มิลลิกรัม ชนิดแคปซูล
นินลาโร

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อสามัญว่าอะไร

ยานี้มีชื่อสามัญว่าไอซาโซมิบ (Ixazomib)

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

ยานี้ใช้รักษาโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดมัลติเพิลไมyeloma ในผู้ใหญ่

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

- ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยานี้ในกรณีต่อไปนี้
 - มีประวัติเลือดออกผิดปกติ
 - มีคลื่นไส้ อาเจียน หรือท้องเสียเรื้อรัง
 - มีประวัติความผิดปกติของเส้นประสาท เช่น อาการเหน็บหรือชา
 - มีประวัติบวม
 - มีผื่นเรื้อรัง
 - มีโรคตับหรือโรคไต
- ไม่ควรใช้ยานี้ ในผู้ป่วยต่อไปนี้
 - หญิงตั้งครรภ์ หรืออยู่ในระหว่างให้นมบุตร
 - ผู้ป่วยที่ใช้ยาต่อไปนี้เช่น ยาแก้อักเสบ (คาร์บามาเซพีน เฟนิโทอิน) และยาต้านไวรัส (ไรแฟมพิซิน) เพราะอาจมีผลต่อการรักษาหรือเกิดอันตรายได้

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกร
- ควรกินยาก่อนอาหารอย่างน้อย 1 ชั่วโมงหรือหลังอาหารอย่างน้อย 2 ชั่วโมง
- กลืนแคปซูลทั้งเม็ดพร้อมน้ำ **ไม่ควรบด เคี้ยว หรือเปิดแคปซูลออกมา**
- หลีกเลี่ยงการสัมผัสยาที่บรรจุภายในแคปซูลโดยตรง หากสัมผัสกับผงยาควรล้างให้สะอาดด้วยสบู่และน้ำ หากแคปซูลแตก ระวังผงยาที่ฟุ้งกระจายระหว่างการทำความสะอาด
- ควรกินยาอย่างต่อเนื่อง จนแพทย์สั่งหยุดยา

3.2 หากลืมกินยาควรทำอย่างไร

- หากลืมกินยาไม่เกิน 4 วัน ให้กินยาทันทีเมื่อนึกได้
- หากลืมกินยาเกิน 4 วัน ไม่ต้องกินยามื้อนั้น ใหรอจนยามื้อต่อไปตามปกติ และห้ามเพิ่มปริมาณยาเอง
- หากผู้ป่วยอาเจียนหลังกินยา ไม่ควรรับประทานยาซ้ำ และให้กินยามื้อถัดไปตามปกติ

3.3 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด
- หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรงให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- คุมกำเนิดระหว่างกินยานี้ และหลังจากหยุดยาไปอีก 3 เดือน
- อาจเกิดอาการง่วงซึมในขณะที่กินยานี้ ควรระมัดระวังในการขับรถหรือทำงานที่ใช้เครื่องจักร

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตาริมฝีปาก ลมพิษ
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผื่นหนังหลุดลอก มีน้ำเลือดตามผิวหนัง หรือเลือดออกผิดปกติ
- จำนวนเกร็ดเลือดต่ำ (ภาวะเกร็ดเลือดต่ำ) ซึ่งอาจเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดเลือดออกในจมูกและรอยฟกช้ำได้ง่าย
- คลื่นไส้ อาเจียน และท้องเสีย
- อาการเหน็บชา หรือปวดแสบปวดร้อนที่มือและเท้า (โรคเส้นประสาทส่วนปลาย)
- กล้ามเนื้ออ่อนแรง ชาบวม เท้าบวม สูญเสียความรู้สึกที่เท้า และนิ้วเท้าหรือสูญเสียการเคลื่อนไหวของขา
- การมองเห็นผิดปกติ หรือ มีอาการชัก
- ภาวะหายใจสั้น หรือการเต้นของหัวใจผิดปกติ ลมชัก สับสน มึนงง
- เลือดออกในจมูก การปัสสาวะน้อยลง

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์ทันที

- ท้องผูก ปวดหลัง อาการเหมือนเป็นหวัด
- รู้สึกเหนื่อยล้าและอ่อนเพลีย
- ความอยากอาหารลดลง
- หัวใจเต้นผิดจังหวะ
- ตาแห้ง ตาแดง มองเห็นไม่ชัด

- การเกิดอีสุกอีใสหรือโรคงูสวัดซ้ำ ที่เป็นสาเหตุของการเกิดผื่นที่ผิวหนังและอาการปวด
- ความดันโลหิตต่ำ
- หายใจสั้นๆ หรือไอเรื้อรังหรือมีอาการเสียงหวีด
- ตาเหลืองและผิวเหลือง

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บไว้ในภาชนะบรรจุเดิมตามที่ได้รับมา เพื่อป้องกันความชื้น ไม่ควรเคลื่อนย้ายยาจนกว่าจะถึงเวลากินยา
- เก็บยาในที่แห้ง ปล่อยให้โดนแสงโดยตรง โดยทั่วไปควรเก็บที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- ไม่ควรใช้ยาหลังวันหมดอายุ ที่ระบุบนแผงยาหลังคำว่า EXP โดยวันหมดอายุคือวันสุดท้ายของเดือนที่ระบุบนแผงยา
- ไม่ควรใช้ยาที่มีบรรจุภัณฑ์ที่เสียหายหรือบรรจุภัณฑ์มีร่องรอยการแกะยา
- ไม่ควรทิ้งยาในท่อน้ำเสียภายในบ้าน เมื่อไม่มีการใช้ยาดังกล่าวแล้วควรสอบถามเภสัชกรถึงวิธีการทิ้งยา เพื่อช่วยปกป้องสิ่งแวดล้อม
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก
ผู้ผลิต: Haupt Pharma Amareg GmbH สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
ผู้นำเข้า: บริษัท ทาเคดา (ประเทศไทย) จำกัด กรุงเทพมหานคร
ผู้แทนจำหน่าย: บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด, กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย
เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ 4 กรกฎาคม 2561

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร