

กรดดีออกซีโคลิก
10 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร
ชนิดยาฉีด


1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อสามัญว่าอะไร

- ยานี้มีชื่อสามัญว่า กรดดีออกซีโคลิก (deoxycholic acid) เป็นยากลุ่มสลายไขมัน

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

ยานี้ใช้เพื่อแก้ไขลักษณะไขมันสะสมใต้คางมากผิดปกติในผู้ใหญ่



2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- ห้ามใช้เมื่อเคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้
- ห้ามใช้เมื่อมีการติดเชื้อบริเวณคางหรือคอ ซึ่งเป็นตำแหน่งที่จะฉีดยา

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้ หากท่านมีภาวะต่อไปนี้

- หญิงตั้งครรภ์ หญิงให้นมบุตร และผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี
- มีภาวะเลือดออกผิดปกติ หรืออยู่ระหว่างกินยาต้านเกล็ดเลือดหรือยาต้านการแข็งตัวของเลือด
- เคยดูดไขมัน ผ่าตัด หรือมีแผลเป็นรอบคางและคอ
- มีภาวะกลืนลำบาก
- ต่อมไทรอยด์ หรือต่อมน้ำเหลืองโต

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้ ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือ เภสัชกร เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับความรุนแรงของโรค

- ยานี้ควรฉีดโดย **แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ** เท่านั้น
- ฉีดได้ไม่เกิน 6 ครั้ง แต่แต่ละครั้งต้องฉีดห่างกัน 1 เดือน

3.2 หากลืมฉีดยาควรทำอย่างไร

- ไปปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

3.3 ถ้าฉีดยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติรีบนำส่งโรงพยาบาลทันที

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- หากกำลังใช้ยาด้านเกล็ดเลือดหรือยาด้านการแข็งตัวของเลือด วิตามิน สมุนไพรหรืออาหารเสริมอยู่ ควรแจ้งแพทย์ เภสัชกร หรือพยาบาลทุกครั้ง

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องรีบไปพบแพทย์ทันที ได้แก่

- ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปากบวมหรือมีผื่นลมพิษ
 - ผิวหนังตามตัวมีจ้ำเลือด ผื่นแดง ตุ่มพอง หรือหลุดลอก
 - แน่นหน้าอก หายใจลำบาก หน้ามืด เป็นลม
 - อาการที่แสดงว่าเส้นประสาทที่คางหรือคออักเสบ ได้แก่ ยึดแล้วปากหรือกลัมน้ำในหน้าเบี้ยว
 - เกิดแผลและเนื้อตายตรงบริเวณที่ฉีด
- * หากเกิดอาการเหล่านี้ ต้องรีบไปพบแพทย์ทันที ***

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องไปพบแพทย์ แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์ทันที ได้แก่

- บริเวณที่ฉีด ปวด แดง คัน ฟกช้ำหรือผิวหนังขึ้น
- กลืนอาหารลำบากและปวดเวลากลืน
- เส้นขนบริเวณที่ฉีดยาหลุดร่วง
- รู้สึกชาตรงบริเวณที่ฉีด
- ลิ้นรับรสอาหารได้น้อยลง รู้สึกชาหรือแสบร้อนภายในปาก

*** อาการเหล่านี้ไม่จำเป็นต้องไปพบแพทย์** เนื่องจากจะหายได้เองโดยไม่ต้องรักษา *

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บไว้ในภาชนะบรรจุเดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อบอุ่นโดยตรง
- ควรเก็บที่อุณหภูมิต่ำกว่า 30 องศาเซลเซียส

ผู้ผลิต :

Hospira, Inc. McPherson, KS, USA

ผู้นำเข้า/ผู้แทนจำหน่าย :

บริษัท แอลเลอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ กุมภาพันธ์ 2562

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

เอกสารอ้างอิง: EU Patient Information Leaflet (EU PIL)