

โซฟอสบูเวียร์ 400 มิลลิกรัม และ เวลพาทาสเวียร์ 90 มิลลิกรัม ชนิดเม็ด (เอเปคลูซา)

1. ยานี้คือยาอะไร

1.1 ยานี้มีชื่อสามัญว่าอะไร

ยานี้มีชื่อสามัญว่า โซฟอสบูเวียร์ (sofosbuvir) และเวลพาทาสเวียร์ (velpatasvir) เป็นยากลุ่มต้านเชื้อไวรัสตับอักเสบบี

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

ยานี้ใช้เพื่อรักษาโรคติดเชื้อตับอักเสบบีชนิดเรื้อรัง (สายพันธุ์ 1, 2, 3, 4, 5 และ 6) ในผู้ป่วยที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้
- กำลังกินยารักษาโรคบางชนิดเช่น ไรแฟมพิซิน ยาสมุนไพรรักษาโรคซึมเศร้า เช่นดัจจอนวอร์ด ยารักษาโรคลมชักบางชนิดเช่น คาร์บามาเซพีน เฟนิโทอิน

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

หากท่านมีภาวะต่อไปนี้

- มีปัญหาโรคตับอื่นที่ไม่ใช่โรคติดเชื้อตับอักเสบบี เช่น โรคติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี หรือเคยปลูกถ่ายตับ
- ผู้ป่วยโรคไต
- ผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวี
- ผู้ที่อายุต่ำกว่า 18 ปี
- เมื่อตั้งครรภ์หรือวางแผนตั้งครรภ์
- กำลังกินยาด้านการแข็งตัวของเลือด เช่น วาฟารินเนื่องจากแพทย์อาจต้องตรวจเลือดของท่านบ่อยขึ้น

- ไม่ควรใช้ยานี้ร่วมกับยา อาหาร สมุนไพรบางชนิดเพราะอาจมีผลต่อการรักษาหรือเกิดอันตรายได้

เช่น

- ยารักษาโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ อะมิโอดาโรน
- ยารักษาโรคผิวหนัง โรฟาเพนทิน
- ยากันชัก ออกซ์คาร์บาเซพีน
- ยารักษาการติดเชื้อเอชไอวี เทโนโฟเวียร์ เอฟาเวียเรนซ์
- ยารักษาโรคหัวใจ ดิจ็อกซิน
- ยาด้านการแข็งตัวของเลือด ดาบีกาแทรน
- ยารักษาการหลับ โมดาฟินิล
- ยาลดไขมัน โรซิวาสแตทิน

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกร

เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค

- กินยาวันละ 1 ครั้ง ก่อนหรือหลังอาหาร
- กลืนยาทั้งเม็ด
- ห้ามหักแบ่ง บด หรือเคี้ยวเม็ดยา
- หากกินยาลดกรดในกระเพาะอาหารให้กินก่อนหรือหลังกินยาอย่างน้อย 4 ชั่วโมง
- หากกินยารักษาแผลในกระเพาะอาหารกลุ่มยายับยั้งการหลั่งกรด เช่น โอเมพราโซล ให้กินยานี้พร้อมอาหาร 4 ชั่วโมงก่อนกินยาโอเมพราโซล
- หากอาเจียนภายใน 3 ชั่วโมงหลังกินยา ให้กินยาใหม่

3.2 หากลืมกินยาควรทำอย่างไร

- ถ้านึกได้ภายใน 18 ชั่วโมง หลังจากเวลาที่ต้องกินยาตามปกติ ให้กินยาทันทีที่นึกได้ และกินยามื้อต่อไปตามปกติ

- ถ้านึกได้เกินกว่า 18 ชั่วโมง หลังจากเวลาที่ต้องกินยาตามปกติ ให้รอกินยามื้อต่อไป และห้ามกินยาเพิ่มเป็น 2 เท่า

3.3 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้ปรึกษาแพทย์หรือสังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรงให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- ห้ามหยุดยาเอง และให้กินยาอย่างต่อเนื่องตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกร
- อย่าให้นมบุตรระหว่างใช้ยานี้
- พบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตามผลการรักษาหรืออันตรายจากยา

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้องหยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีจ้ำตามผิวหนัง หรือเลือดออกผิดปกติ

5.2 อาการที่ไม่จำเป็นต้องหยุดยา

แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์ทันที

- ปวดศีรษะ อ่อนเพลีย คลื่นไส้
- อาการข้างเคียงอื่นๆ ที่อาจไม่ได้อยู่ในเอกสารนี้ หากมีอาการไม่พึงประสงค์ใดๆ ที่สงสัยว่าเกิดจากการใช้ยานี้ โปรดแจ้งแพทย์และผู้รับผิดชอบการวางจำหน่ายในประเทศ (หมายเลขโทรศัพท์ 02-257-3500) เพื่อติดตามความปลอดภัยจากการใช้ยา

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บไว้ในภาชนะบรรจุเดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อย่าให้โดนแสงโดยตรง โดยทั่วไปควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

ผู้ผลิต Patheon Inc., Canada

ผู้นำเข้า/ผู้แทนจำหน่าย DCH Auriga (Thailand) Limited

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ กันยายน 2560

**เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร**