

เอกสารกำกับยาสำหรับประชาชน

1

เอกสารกำกับยาภาษาไทยสำหรับผู้ป่วย

คำแนะนำการใช้ยาสำหรับผู้ป่วย

อินโวคานา® (อิน-โว-คา-นา)

(คานากลิฟลอสิน)

รูปแบบเม็ด

ข้อมูลที่สำคัญที่สุดที่ฉันควรทราบเกี่ยวกับอินโวคานาคืออะไร?

อินโวคานาสามารถทำให้เกิดอาการข้างเคียงที่สำคัญ ประกอบด้วย:

- การตัดขา อินโวคานาอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการตัดขาได้ การตัดขาส่วนใหญ่รวมถึงการตัดนิ้วเท้าหรือส่วนของเท้า อย่างไรก็ตาม ยังเคยเกิดการตัดขาซึ่งรวมถึงขาช่วงล่างและช่วงบนของหัวเข่า บางคนมีการตัดขามากกว่า 1 ครั้ง เหมือนกันทั้งสองด้านของร่างกาย

คุณอาจมีความเสี่ยงต่อการตัดขาที่สูงขึ้น ถ้าคุณ:

- มีประวัติเคยถูกตัดขา
- เป็นโรคหัวใจ หรือมีความเสี่ยงต่อโรคหัวใจ
- เคยมีการอุดตันของหลอดเลือด หรือหลอดเลือดตีบ ส่วนใหญ่ที่ขา
- มีการทำลายของเส้นประสาท (โรคเส้นประสาท) ที่ขา
- เคยมีแผลที่เท้าหรือมีอาการเจ็บที่เท้าซึ่งเกิดจากโรคเบาหวาน

รีบแจ้งแพทย์โดยทันทีถ้าคุณเริ่มมีอาการปวดหรือมีอาการกดเจ็บ อาการเจ็บ แผล หรือติดเชื้อที่ขา และเท้า แพทย์อาจตัดสินใจหยุดอินโวคานาเป็นเวลาสั้นๆถ้าคุณมีอาการหรืออาการแสดงเหล่านี้

ปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับการดูแลเท้าที่เหมาะสม

- ภาวะขาดน้ำ อินโวคานาสามารถส่งผลให้บางคนมีภาวะขาดน้ำ (สูญเสียน้ำในร่างกายปริมาณมากเกินไป) ภาวะขาดน้ำอาจส่งผลให้คุณรู้สึกเวียนศีรษะ หมดสติ หน้ามืดเป็นลม หรืออ่อนแรง โดยเฉพาะเมื่อคุณลุกขึ้นยืน (ความดันโลหิตต่ำขณะเปลี่ยนท่า)

คุณอาจมีความเสี่ยงสูงที่จะมีภาวะขาดน้ำถ้าคุณ:

INVOKANA USPIL (Medication Guide)
Version July 2017

Created on 20 November 2017

- มีความดันโลหิตต่ำ
- ไข้ยาที่ทำให้ความดันโลหิตต่ำลง ประกอบด้วยยาขับปัสสาวะ (ยาขับน้ำ)
- กำลังอยู่ในระหว่างควบคุมอาหารให้มีโซเดียม (เกลือ) ต่ำ
- มีปัญหาทางไต
- อายุตั้งแต่ 65 ปีเป็นต้นไป

ปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับสิ่งที่คุณสามารถทำได้ในการป้องกันภาวะขาดน้ำ รวมถึงปริมาณน้ำที่คุณควรดื่มในชีวิตประจำวัน

- **ติดเชื้อราในช่องคลอด**สตรีที่ใช้อินโวคานาอาจเกิดการติดเชื้อราในช่องคลอดได้ อาการของการติดเชื้อราในช่องคลอดประกอบด้วย:
 - ช่องคลอดมีกลิ่น
 - ตกขาวสีขาวหรือสีเหลือง (ตกขาวอาจมีลักษณะเป็นก้อนหรือคล้ายคอทเทจชีส (Cottage cheese))
 - คันบริเวณช่องคลอด
- **ติดเชื้อราบริเวณองคชาต (ส่วนหัวองคชาตอักเสบ (balanitis) หรือส่วนหัวองคชาตและหนังหุ้มปลายองคชาตอักเสบ (balanoposthitis))** ผู้ชายที่ใช้อินโวคานาอาจเกิดการติดเชื้อราที่ผิวหนังบริเวณองคชาตได้ ผู้ชายบางคนผู้ที่ไม่ได้ทำการขลิบอาจเกิดการบวมขององคชาตได้ที่ทำให้ยากในการดึงกลับของผิวหนังรอบบริเวณส่วนปลายองคชาต อาการอื่นของการติดเชื้อราบริเวณองคชาตประกอบด้วย:

○ แดง คัน หรือบวมบริเวณองคชาต	○ มีผื่นผิวหนังบริเวณองคชาต
○ หลังสารคัดหลั่งที่มีกลิ่นเหม็นจากองคชาต	○ เจ็บปวดที่ผิวหนังรอบ ๆ องคชาต

ปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับสิ่งที่ควรปฏิบัติถ้าคุณมีอาการของการติดเชื้อราในช่องคลอดหรือบริเวณองคชาต แพทย์อาจแนะนำคุณให้ใช้ยาต้านเชื้อราที่สามารถซื้อเองได้ ปรึกษาแพทย์โดยทันทีถ้าคุณใช้ยาต้านเชื้อราที่ซื้อเองแล้วและอาการเหล่านี้ไม่หายไป

อินโวคานาคืออะไร?

INVOKANA USPIL (Medication Guide)
Version July 2017

Created on 20 November 2017

- อินโวลคานาเป็นยาที่ใช้ร่วมกับการควบคุมอาหารและการออกกำลังกายเพื่อทำให้การควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด (กลูโคส) ดีขึ้นในผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2
- ไม่ใช้อินโวลคานาในผู้ที่เป็โรคเบาหวานชนิดที่ 1
- ไม่ใช้อินโวลคานาในผู้ที่มีภาวะไคแอซิติคโตซิส (diabetic ketoacidosis) (ระดับของคีโตนในเลือดหรือปัสสาวะเพิ่มขึ้น)
- ยังไม่ทราบถึงความปลอดภัยและประสิทธิผลของอินโวลคานาในเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี

ใครไม่ควรใช้อินโวลคานา?

ห้ามใช้อินโวลคานา ถ้าคุณ:

- แพ้ต่อคานากลิฟลอสซินหรือส่วนประกอบอื่น ๆ ในอินโวลคานา ดูที่ส่วนท้ายของคำแนะนำการใช้ยานี้สำหรับรายการส่วนประกอบในอินโวลคานา อาการของปฏิกิริยาแพ้ต่ออินโวลคานาอาจประกอบด้วย:
 - ผื่นผิวหนัง
 - เกิดรอยปื้นแดงบนผิวหนัง (ลมพิษ)
 - มีอาการบวมบริเวณใบหน้า ริมฝีปาก ปาก ลิ้น และลำคอ ซึ่งส่งผลทำให้หายใจหรือกลืนลำบาก
- มีปัญหาทางไตขั้นปานกลางถึงรุนแรง หรือกำลังได้รับการล้างไต

ฉันควรแจ้งอะไรกับแพทย์ก่อนใช้อินโวลคานา?

ก่อนคุณใช้อินโวลคานา แจ้งแพทย์ถ้าคุณ:

- มีประวัติเคยถูกตัดขา
- เป็นโรคหัวใจหรือมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจ
- เคยมีการอุดตันหรือตีบของหลอดเลือด โดยเฉพาะที่ขา
- มีการทำลายเส้นประสาท (โรคเส้นประสาท) ที่ขา
- เคยมีแผลที่เท้าหรือมีอาการเจ็บที่เท้าซึ่งเกิดจากโรคเบาหวาน
- มีปัญหาทางไต

- มีปัญหาทางตับ
- มีประวัติการติดเชื้อมีบริเวณทางเดินปัสสาวะ หรือปัญหาเกี่ยวกับการปัสสาวะ
- กำลังอยู่ในระหว่างควบคุมอาหารให้มีโซเดียม (เกลือ) ต่ำ แพทย์อาจเปลี่ยนการควบคุมอาหาร หรือขนาดยาอินโวคานา
- กำลังจะได้รับการผ่าตัด
- กำลังมีการรับประทานน้อย เนื่องจากเจ็บป่วย ผ่าตัด หรือเปลี่ยนแปลงการควบคุมอาหาร
- มีหรือเคยมีปัญหาด้านการนอน ประกอบด้วยนอนอึกเสบ หรือนอนหลับไม่ได้รับการผ่าตัด
- ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บ่อยมาก หรือดื่มแอลกอฮอล์ปริมาณมากในช่วงเวลาสั้น ๆ (การดื่มแบบยกหมดแก้ว ("binge" drinking))
- เคยเกิดปฏิกิริยาการแพ้ต่ออินโวคานา
- มีภาวะทางการแพทย์อื่น ๆ
- กำลังตั้งครรภ์ หรือวางแผนตั้งครรภ์ อินโวคานาอาจเป็นอันตรายต่อทารกในครรภ์ หากคุณมีการตั้งครรภ์ในระหว่างที่กำลังใช้อินโวคานา ให้รีบแจ้งแพทย์โดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ ปรึกษาแพทย์ถึงแนวทางที่ดีที่สุดในการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของคุณในระหว่างที่คุณกำลังตั้งครรภ์
- กำลังให้นมบุตร หรือวางแผนจะให้นมบุตร อินโวคานาอาจผ่านสู่น้ำนมได้ และอาจเป็นอันตรายต่อทารกของคุณ ปรึกษาแพทย์ถึงแนวทางที่ดีที่สุดที่จะให้อาหารทารกของคุณถ้าคุณกำลังใช้อินโวคานา ห้ามให้นมบุตรในระหว่างที่ใช้อินโวคานา

แจ้งแพทย์เกี่ยวกับยาทุกตัวที่คุณกำลังใช้อยู่ รวมถึงยาที่แพทย์สั่ง และยาที่ซื้อใช้เอง วิตามิน และยาสมุนไพร

อินโวคานาอาจส่งผลต่อการทำงานของยาตัวอื่น และยาตัวอื่นอาจส่งผลต่อการทำงานของอินโวคานา ให้แจ้งแพทย์โดยเฉพาะถ้าคุณกำลังใช้:

- ยาขับปัสสาวะ (ยาขับน้ำ)
- ไรแฟมพิน (ใช้ในการรักษาหรือป้องกันวัณโรค)
- ฟินิโตอิน หรือฟีโนบาร์บิทัล (ใช้ในการควบคุมอาการชัก)
- ไรโทนาเวียร์ (ใช้ในการรักษาการติดเชื้อเอชไอวี)
- ดิจ็อกซิน (ใช้ในการรักษาโรคหัวใจ)

สอบถามแพทย์หรือเภสัชกรสำหรับรายการยาเหล่านี้ ถ้าคุณไม่แน่ใจว่ายานของคุณอยู่ในรายการดังกล่าวหรือไม่

คุณควรทราบว่าคุณกำลังใช้ยาตัวใดอยู่ ให้เก็บรายการยาไว้ และแสดงให้แพทย์หรือเภสัชกรดูเมื่อคุณได้รับยาตัวใหม่

ฉันควรใช้อินโวกานาอย่างไร?

- ใช้อินโวกานาโดยการรับประทาน วันละ 1 ครั้ง ตามที่แพทย์สั่ง
- แพทย์จะเป็นคนแจ้งว่าคุณต้องรับประทานอินโวกานาปริมาณเท่าไรและเวลาใด แพทย์อาจปรับเปลี่ยนขนาดยาของคุณถ้ามีความจำเป็น
- สิ่งที่ดีที่สุด คือ รับประทานอินโวกานาก่อนอาหารเช้าของวัน
- แพทย์อาจแจ้งคุณให้รับประทานอินโวกานาร่วมกับยารักษาโรคเบาหวานตัวอื่น ภาวะระดับน้ำตาลในเลือดต่ำสามารถเกิดขึ้นได้บ่อยขึ้นเมื่อใช้อินโวกานาร่วมกับยารักษาโรคเบาหวานบางชนิด ดูหัวข้อ “อาการข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นได้จากอินโวกานามีอะไรบ้าง?”
- ถ้าคุณลืมรับประทานยา ให้รับประทานยาทันทีที่นึกได้ ถ้าเป็นเวลาใกล้ถึงมื้อถัดไปให้ข้ามมื้อที่ลืมและรับประทานยามื้อถัดไปตามเวลาปกติ ห้ามเพิ่มขนาดอินโวกานาเป็น 2 เท่าในเวลาเดียวกันปรึกษาแพทย์ถ้าคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการลืมรับประทานยา
- ถ้าคุณรับประทานอินโวกานามากเกินไป รีบแจ้งแพทย์หรือไปห้องฉุกเฉินที่โรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดโดยทันที
- เมื่อร่างกายของคุณอยู่ในภาวะเครียดบางชนิด เช่น มีไข้ ได้รับความเจ็บ (เช่น อุบัติเหตุทางรถยนต์) ติดเชื้อ หรือผ่าตัด อาจจำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนปริมาณยารักษาโรคเบาหวาน ปรึกษาแพทย์โดยทันทีถ้าคุณมีภาวะเหล่านี้ และปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์
- ให้ปฏิบัติตามการควบคุมอาหาร และตารางการออกกำลังกายของคุณที่แพทย์สั่งในระหว่างที่กำลังใช้อินโวกานา
- ตรวจสอบระดับน้ำตาลในเลือดตามที่แพทย์สั่ง
- อินโวกานาจะส่งผลให้การตรวจปัสสาวะของคุณมีค่าบวก

- แพทย์อาจทำการตรวจเลือดบางชนิดก่อนที่คุณจะเริ่มอินโวคานาและระหว่างทำการรักษาถ้ามีความจำเป็น แพทย์อาจปรับเปลี่ยนขนาดยาอินโวคานาโดยขึ้นกับผลจากการตรวจเลือดของคุณ
- แพทย์จะตรวจเบาหวานโดยการตรวจเลือดด้วยวิธีปกติ ประกอบด้วยระดับน้ำตาลในเลือด และค่าฮีโมโกลบิน A_{1c}

อาการข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นได้จากอินโวคานามีอะไรบ้าง?

อินโวคานาอาจส่งผลให้เกิดอาการข้างเคียงที่รุนแรง ประกอบด้วย:

ดูหัวข้อ “ข้อมูลที่สำคัญที่สุดที่ฉันควรทราบเกี่ยวกับอินโวคานาคืออะไร?”

- ภาวะคีโตนแอซิดอสิส (ketoacidosis) (ระดับของคีโตนในเลือดหรือปัสสาวะเพิ่มสูงขึ้น) เคยเกิดภาวะคีโตนแอซิดอสิส (ketoacidosis) ในผู้ที่เป็โรคเบาหวานชนิดที่ 1 หรือ ชนิดที่ 2 ในระหว่างการรักษาด้วยอินโวคานา ภาวะคีโตนแอซิดอสิส (ketoacidosis) เป็นภาวะที่รุนแรงซึ่งอาจจำเป็นต้องได้รับการรักษาในโรงพยาบาล ภาวะคีโตนแอซิดอสิส (ketoacidosis) อาจนำไปสู่การเสียชีวิตได้ ภาวะคีโตนแอซิดอสิส (ketoacidosis) สามารถเกิดขึ้นจากอินโวคานา แม้ว่าระดับน้ำตาลในเลือดของคุณต่ำกว่า 250 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร ให้หยุดใช้อินโวคานาและรีบแจ้งแพทย์โดยทันทีถ้าคุณมีอาการดังต่อไปนี้:

- คลื่นไส้
- อาเจียน
- ปวดบริเวณท้อง (เกี่ยวกับท้อง)
- เหนื่อย
- หายใจลำบาก

ถ้าคุณมีอาการเหล่านี้ระหว่างที่กำลังรักษาด้วยอินโวคานา ถ้าเป็นไปได้ให้ตรวจสอบคีโตนในปัสสาวะของคุณ แม้ว่าระดับน้ำตาลในเลือดของคุณจะต่ำกว่า 250 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร

- ปัญหาทางไต การบาดเจ็บที่ไตโดยเฉียบพลันเคยเกิดขึ้นในผู้ที่ใช้อินโวคานา รีบแจ้งแพทย์โดยทันทีถ้าคุณ:
 - รับประทานอาหารปริมาณลดลง หรือ ต้มเครื่องต้มลดลง ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณป่วย หรือไม่ สามารถรับประทานอาหารได้ หรือ

- คุณเริ่มมีอาการสูญเสียของเหลวจากร่างกายของคุณ ตัวอย่างเช่น จากการอาเจียน ท้องเสีย หรืออยู่กลางแดดนานเกินไป
- ปริมาณโพแทสเซียมในเลือดสูง (ภาวะโพแทสเซียมในเลือดสูง)
- การติดเชื้อบริเวณทางเดินปัสสาวะขั้นรุนแรง การติดเชื้อบริเวณทางเดินปัสสาวะขั้นรุนแรงที่สามารถนำไปสู่การรักษาตัวในโรงพยาบาลเคยมีการเกิดขึ้นในผู้ที่ได้รับอินโวคานา แจ้งแพทย์ถ้าคุณมีอาการหรืออาการแสดงของการติดเชื้อบริเวณทางเดินปัสสาวะ เช่น ความรู้สึกแสบร้อนในขณะที่กำลังปัสสาวะ มีความต้องการปัสสาวะบ่อย มีความต้องการปัสสาวะทันทีทันใด ปวดบริเวณช่วงล่างของท้อง (เชิงกราน) หรือปัสสาวะมีเลือดปน บางครั้งอาจมีไข้ ปวดหลัง คลื่นไส้ หรืออาเจียน
- ระดับน้ำตาลในเลือดต่ำ (ภาวะระดับน้ำตาลในเลือดต่ำ) ถ้าคุณใช้อินโวคานาร่วมกับยาตัวอื่นที่สามารถส่งผลให้ระดับน้ำตาลในเลือดลดลงได้ เช่น ยากลุ่มซัลโฟนิลยูเรีย หรืออินซูลิน คุณมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นที่จะเกิดภาวะระดับน้ำตาลในเลือดต่ำ อาจจำเป็นต้องลดขนาดยาของยากกลุ่มซัลโฟนิลยูเรีย หรืออินซูลิน ในระหว่างที่คุณใช้อินโวคานา อาการและอาการแสดงของภาวะระดับน้ำตาลในเลือดต่ำ อาจประกอบด้วย:
 - ปวด
 - ง่วงซึม
 - อ่อนแรง
 - สับสน
 - เวียนศีรษะ
 - หงุดหงิด
 - รู้สึกหิว
 - หัวใจเต้นเร็ว
 - เหงื่อออก
 - สั่น หรือ รู้สึกกระวนกระวายใจ
- ปฏิกริยาการแพ้ขั้นรุนแรง ถ้าคุณมีอาการของปฏิกริยาการแพ้ขั้นรุนแรง ให้หยุดใช้อินโวคานาและรีบแจ้งแพทย์โดยทันทีหรือไปห้องฉุกเฉินที่โรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดโดยทันที ดูหัวข้อ “ใครไม่ควรใช้อินโวคานา?” แพทย์อาจให้ยาคุณสำหรับปฏิกริยาการแพ้และสั่งจ่ายยาสำหรับรักษาโรคเบาหวานตัวอื่น
- ภาวะคูห์คัก (แตก) การกระตุกหักเคยพบในผู้ป่วยที่ใช้อินโวคานา ปรีกษาแพทย์เกี่ยวกับปัจจัยที่อาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดการกระตุกหัก

อาการข้างเคียงที่พบบ่อยที่สุดของอินโวคานา ประกอบด้วย:

- ติดเชื้อราในช่องคลอด และติดเชื้อราบริเวณองคชาต (ดูหัวข้อ “ข้อมูลที่สำคัญที่สุดที่ฉันควรทราบเกี่ยวกับอินโวคานาคืออะไร?”)

- การปัสสาวะมีการเปลี่ยนแปลง ประกอบด้วยมีความต้องการปัสสาวะอย่างเร่งด่วนบ่อยมากกว่าปกติ ในปริมาณมาก หรือในเวลากลางคืน

แจ้งแพทย์ถ้าคุณมีอาการข้างเคียงที่รบกวนคุณหรือไม่หายไป อาการเหล่านี้ไม่ได้เป็นอาการข้างเคียงทั้งหมดที่อาจเกิดขึ้นได้จากอินโวคานา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดสอบถามแพทย์หรือเภสัชกร

ให้สอบถามแพทย์เพื่อขอคำแนะนำทางการแพทย์เกี่ยวกับอาการข้างเคียง คุณอาจรายงานอาการข้างเคียงต่อสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาของประเทศไทยได้

คุณอาจรายงานอาการข้างเคียงต่อบริษัท แจนเซน-ซีแลก จำกัดได้

ฉันจะเก็บรักษาอินโวคานาอย่างไร?

- ห้ามเก็บอินโวคานาที่อุณหภูมิสูงกว่า 30 องศาเซลเซียส
- ดูวันหมดอายุบนกล่องยา
- เก็บอินโวคานาและยาทุกตัวให้พ้นจากมือเด็ก

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการใช้อินโวคานาอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ

ยาในบางครั้งอาจถูกส่งจ่ายด้วยวัตถุประสงค์นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในคำแนะนำการใช้ยา ห้ามใช้อินโวคานาสำหรับภาวะที่แพทย์ไม่ได้ระบุ ห้ามให้อินโวคานาแก่ผู้อื่นแม้ว่าพวกเขาจะมีอาการเดียวกับคุณ เนื่องจากอาจเป็นอันตรายต่อพวกเขาได้

คำแนะนำการใช้ยาฉบับนี้ได้รวบรวมข้อมูลที่สำคัญที่สุดเกี่ยวกับอินโวคานา ถ้าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมให้ปรึกษาแพทย์ คุณสามารถสอบถามเภสัชกรหรือแพทย์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอินโวคานาที่มีการระบุสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ได้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอินโวคานา โปรดอ่านเอกสารกำกับยาฉบับเต็มได้ที่เว็บไซต์ <http://ndi.fda.moph.go.th/>

ส่วนประกอบของอินโวคานามีอะไรบ้าง?

ตัวยาสัญญา: ดานากลิฟลอสซิน

สารประกอบที่ไม่มีฤทธิ์: ครอสคาร์เมลโลสโซเดียม ไฮดรอกซีโพรพิลเซลลูโลส แลคโตสแอนไฮดรัส แมกนีเซียมสเตียเรต และไมโครคริสตัลลินเซลลูโลส นอกจากนี้ ส่วนเคลือบเม็ดยาประกอบด้วยไฮดรอกซีเซลลูโลส (ยาเม็ดขนาด 100 มิลลิกรัม เท่านั้น) แมโครกอลโพลีเอธิลีนไกลคอล (พีอีจี) โพลีไวนิลแอลกอฮอล์ ทัลค์ และไทเทเนียมไดออกไซด์

ลักษณะและส่วนประกอบของภาชนะบรรจุ: ยาเม็ดบรรจุแยกเม็ดในแผงบลิสเตอร์ที่ผลิตจากพอลิไวนิลคลอไรด์ (พีวีซี) อะลูมิเนียมฟอยล์ จำนวน 10 เม็ดต่อ 1 แผงบลิสเตอร์ ในกล่องยาจะมีการบรรจุดังนี้: 10 เม็ด (1 แผงบลิสเตอร์) 30 เม็ด (3 แผงบลิสเตอร์) 90 เม็ด (9 แผงบลิสเตอร์) และ 100 เม็ด (10 แผงบลิสเตอร์)

คำเตือนตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข

- ห้ามใช้ในผู้ที่เคยแพ้ยานี้
- ห้ามใช้รักษาโรคเบาหวานชนิดที่ 1 ผู้ป่วยภาวะ ketoacidosis ผู้ป่วยภาวะติดเชื้อรุนแรง ผู้ป่วยได้รับอุบัติเหตุรุนแรง
- สตรีมีครรภ์ควรหลีกเลี่ยงการใช้นี้ และสตรีให้นมบุตรระมัดระวังในการใช้นี้
- ไม่ควรใช้นี้ร่วมกับเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
- หากผู้ป่วยมีอาการ คลื่นไส้ อาเจียน เบื่ออาหาร ปวดท้อง หัวใจผิดปกติ อ่อนเพลีย หายใจลำบาก สับสน และมีระดับน้ำตาลในเลือดสูงไม่มาก ให้รีบปรึกษาแพทย์ หรือเภสัชกรเนื่องจากอาจเกิดอาการ diabetic ketoacidosis
- ควรระมัดระวังการติดเชื้อแบคทีเรีย และเชื้อราที่อวัยวะเพศ และระบบทางเดินปัสสาวะในผู้ป่วยที่ใช้นี้

ชื่อผลิตภัณฑ์	ผลิตโดย	เลขทะเบียนตำรับยา	วันที่ได้รับอนุมัติทะเบียนตำรับยา
อินวอคานา 100 มิลลิกรัม	Janssen Ortho, LLC Gurabo ประเทศเปอร์โตริโก	1C 36/58 (NC)	7 เมษายน 2558
อินวอคานา 300 มิลลิกรัม	Janssen Ortho, LLC Gurabo ประเทศเปอร์โตริโก	1C 37/58 (NC)	7 เมษายน 2558
อินวอคานา 100 มิลลิกรัม	Janssen Cilag S.p.A. Latina ประเทศอิตาลี	1C xxx (NC)	DD MMM YYYY
อินวอคานา 300 มิลลิกรัม	Janssen Cilag S.p.A. Latina ประเทศอิตาลี	1C xxx (NC)	DD MMM YYYY

วันที่แก้ไขเอกสารกำกับยาล่าสุด กรกฎาคม 2560

ได้รับลิขสิทธิ์จาก Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation

นำเข้าโดย

บริษัท แจนเซน-ซีแอล จำกัด
106 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง
ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง
กรุงเทพฯ 10520
โทรศัพท์: 02-792-7200
โทรสาร: 02-792-7222

INVOKANA USPIL (Medication Guide)
Version July 2017

Created on 20 November 2017