

ทาลิโดไมด์ 50 มิลลิกรัม [ทาโด]

ชนิดแคปซูล

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อสามัญว่าอะไร

- ยานี้มีชื่อสามัญว่า ทาลิโดไมด์ (thalidomide) เป็นยารักษาโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ยานี้ใช้เพื่อรักษา **โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว ชนิดมัลติเพิลไมอีโลมา** ซึ่งเกิดจากเซลล์เม็ดเลือดขาวชื่อว่าพลาสมา แบ่งตัวมากผิดปกติ

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- ⊗ ห้ามใช้ในผู้ที่แพ้ยานี้
- ⊗ ห้ามใช้ในสตรีตั้งครรภ์ หรือวางแผนที่จะตั้งครรภ์ **เพราะทำให้เกิดอันตรายร้ายแรงต่อทารก**
- ⊗ ห้ามใช้ในสตรีให้นมบุตร เนื่องจากยาอาจผ่านน้ำนมสู่เด็ก และเกิดอันตรายได้

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้ ในผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวี

- ควรตรวจวัดปริมาณเชื้อไวรัสเอชไอวีในเลือดในเดือนแรกและหลังจากเริ่มรับประทานยาได้ 3 เดือน และควรตรวจวัดทุก 3 เดือนอย่างสม่ำเสมอ

3. วิธีการใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้ ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือ เภสัชกร เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค

3.2 หากลืมกินยาควรทำอย่างไร

- ถ้าลืมกินยาน้อยกว่า 12 ชั่วโมง ให้กินยาทันทีที่นึกได้
- ถ้าลืมกินยามากกว่า 12 ชั่วโมง ให้รอกินยาของมื้อต่อไป ห้ามกินยาเพิ่มเป็น 2 เท่า

3.3 ถ้ากินยานี้เกินขนาด ควรทำอย่างไร

- ให้ปรึกษาแพทย์ หรือรีบนำส่งโรงพยาบาลทันที เพื่อได้รับการรักษาที่เหมาะสมต่อไป

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- **พบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอ** เพื่อติดตามผลการรักษาหรืออันตรายจากยา
- ผู้ชายที่ได้รับยานี้ ต้องใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ทุกครั้ง ตลอดระยะเวลาการรักษาและต้องใช้ต่อไปอีก 1 เดือนหลังจากหยุดใช้ยานี้
- **ผู้หญิงวัยเจริญพันธุ์**
 - ต้องได้รับการตรวจการตั้งครรภ์จากแพทย์ดังนี้
 - ก่อนการรักษา
 - ทุก 4 สัปดาห์ระหว่างการรักษา
 - 4 สัปดาห์หลังหยุดการรักษา
- หากประจำเดือนผิดปกติ หรือประจำเดือนขาดควรตรวจการตั้งครรภ์และปรึกษาแพทย์
- หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ และเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
- ระมัดระวังการขับชี่ยานยนต์ หรือการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกล หรือการทำงานที่เสี่ยงต่อการพลัดตกจากที่สูง

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 หากใช้ยาแล้วเกิดอาการ เช่น

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ
 - หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
 - ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีจ้ำตามผิวหนังหรือเลือดออกผิดปกติ
 - มีไข้ หนาวสั่น เจ็บคอ ไอ มีแผลในปาก หรืออาการอื่น ๆ ของการติดเชื้อ
 - มีอาการเหน็บชา เจ็บตามมือและเท้า
 - ปวดเท้าหรือเท้าบวมอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะน่อง
 - ปวดหน้าอกกลามมาที่แขน คอ กราม หลัง หรือท้อง มีเหงื่อออกและหายใจลำบาก รู้สึกไม่สบายหรืออาเจียน
 - ลำบากในการมองหรือพูดลำบาก
 - มีเลือดออกหรือจ้ำเลือดโดยไม่มีอาการบาดเจ็บ
- “หยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที”**

5.2 หากใช้ยาแล้วเกิดอาการ เช่น

- ปากแห้ง คอแห้ง คลื่นไส้ อาเจียน ปวดมวนท้อง ท้องร่วง ท้องผูก ท้องอืด
- ปวดศีรษะ ปวดหลัง ปวดกล้ามเนื้อ
- ง่วงซึม วิงเวียน ความดันโลหิตต่ำเนื่องจากเปลี่ยนอิริยาบถ

“ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้พบแพทย์ทันที”

6. ควรเก็บยาอย่างไร

- เก็บยาไว้ในภาชนะเดิมตามที่ได้รับมา
- เก็บยาในที่แห้ง อบอุ่นโดยตรง โดยทั่วไปควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ หรือ ห้องครัว
- ควรแกะยานี้เมื่อกินในแต่ละครั้งเท่านั้น ห้ามแกะยาออกจากแผงก่อน เพราะยาอาจเสียได้
- เก็บยาให้พ้นมือเด็ก

ผู้ผลิต TTY Biopharm Co., Ltd. Chungli Factory, 838, Chung Hwa Rd., Sec. 1., Chungli Dist., Taoyuan City., 32069, Taiwan R.O.C.

ผู้นำเข้า/ผู้แทนจำหน่าย บริษัท อเมริกัน ไตวัน ไบโอฟาร์ม จำกัด เลขที่ 1 อาคารอีสทวอเตอร์ ชั้นที่ 16

ซอยวิภาวดีรังสิต 5 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900

เอกสารนี้ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 9 กุมภาพันธ์ 2561

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อแพทย์หรือเภสัชกร