

โรฟาเพนทีน 150 มิลลิกรัม ยาเม็ดเคลือบฟิล์ม ชื่อการค้า Priftin (พริฟติน)

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อสามัญว่าอะไร

- ยานี้มีชื่อว่า **โรฟาเพนทีน (rifapentine)** เป็นยาในกลุ่มยาต้านวัณโรค

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- ยานี้ใช้รักษาวัณโรคระยะแฝงในผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป ที่แพทย์ตรวจแล้วว่าเหมาะสมที่จะใช้ยานี้

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ แพ้ยาในกลุ่มยาที่เรียกว่า ไรฟามัยซิน หรือแพ้ส่วนประกอบอื่นของยา

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

- แจ้งแพทย์หากท่านอยู่ในกลุ่มต่อไปนี้
 - เป็นวัณโรคระยะแพร่เชื้อ
 - เคยเป็นวัณโรคที่ติดต่อการรักษาด้วยยาบางชนิด หรือสัมผัสกับผู้ป่วยวัณโรคที่ไม่สามารถรักษาด้วยยาไอโซไนอาซิดหรือยาไรแฟมพิซิน
 - ติดเชื้อ เอชไอวี หรือใช้ยารักษาการติดเชื้อเอชไอวี
 - มีปัญหาเกี่ยวกับตับ
 - มีภาวะผิดปกติทางพันธุกรรมที่เรียกว่า โรคพอร์ฟีเรีย
 - ตั้งครรภ์หรือกำลังวางแผนที่จะตั้งครรภ์ เพราะไม่แน่ชัดว่ายานี้จะเป็นอันตรายต่อทารกในครรภ์

- ให้นมบุตรหรือวางแผนที่จะให้นมบุตร เพราะไม่แน่ชัดว่ายานี้ถูกขับออกทางน้ำนมท่านและแพทย์ของท่านควรตัดสินใจที่จะใช้ยานี้หรือให้นมบุตร

- แจ้งแพทย์เกี่ยวกับยาทั้งหมดที่ใช้อยู่ รวมถึงยาที่มีใบสั่งยาและยาที่ซื้อใช้เอง วิตามิน ผลิตภัณฑ์สมุนไพร
- ยานี้อาจทำให้ประสิทธิภาพของยาคุมกำเนิด ชนิดฮอร์โมนลดลง ผู้ที่กินยาคุมกำเนิด ใช้แผ่นแปะคุมกำเนิด หรือใช้ยาคุมกำเนิดชนิดฮอร์โมนแบบอื่น ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรเพื่อหาวิธีคุมกำเนิดแบบไม่ใช้ฮอร์โมนร่วมด้วย เช่น การใช้ถุงยางอนามัย เป็นต้น
- ยานี้อาจทำให้คอนแทคเลนส์และฟันปลอมติดสีส้มแดงแบบถาวร

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ใช้ยาอย่างต่อเนื่องจนครบตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกร หากหยุดใช้ยาจะรักษาไม่ได้ผล
- กินยาสัปดาห์ละ 1 ครั้ง เป็นเวลา 12 สัปดาห์
- กินยาพร้อมอาหาร
- หากไม่สามารถกลืนยาทั้งเม็ด สามารถบดยาและผสมกับอาหารกึ่งแข็งกึ่งเหลว เช่น ข้าวบด โจ๊ก ปริมาณเล็กน้อย กินทันที ห้ามผสมทิ้งไว้

3.2 หากลืมกินยาควรทำอย่างไร

- หากลืมกินยา แต่ไม่เกิน 2 วัน ให้กินเมื่อที่ลืมได้ หากเลย 2 วันแล้วให้ข้ามเมื่อนั้นไป และกินเม็ดต่อไปตามปกติ ต้องจดบันทึกแจ้งแพทย์ทุกครั้งที่ได้รับการตรวจติดตาม
- หากลืมกินยาบ่อย ๆ ต้องหาวิธีป้องกัน เช่น เข้ารับการปรึกษาในศูนย์บริการวัณโรค หรือมีผู้ดูแลการกินยา

3.3 ถ้ากินยาเกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง ให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- พบแพทย์ตามนัดเพื่อติดตามผลการรักษา
- ยานี้จะได้ผลดีที่สุดเมื่อใช้ร่วมกับยาต้านวัณโรคที่ชื่อ ไอโซไนอาซิด
- ไม่ใช้ยานี้นอกเหนือจากที่แพทย์สั่ง ไม่ให้ยาแก่ผู้อื่นถึงแม้จะมีอาการคล้ายกัน เนื่องจากอาจทำให้เกิดอันตรายได้

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 หากใช้แล้วเกิดอาการ เช่น

- คลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง เบื่ออาหาร เหนื่อย ตัวเหลืองตาเหลือง ปัสสาวะสีเข้ม
- ความดันเลือดต่ำ หายใจลำบาก ลมพิษ ตาแดง (เยื่อตาอักเสบ) ไอร่วมกับหายใจลำบาก เกล็ดเลือดต่ำ
- อ่อนแรง เหนื่อย ปวดกล้ามเนื้อ คลื่นไส้และอาเจียน ปวดศีรษะ ใช้ หนาวสั่น ปวดเมื่อย ผื่น คัน เหงื่อออก เวียนศีรษะ หายใจถี่ เจ็บหน้าอก ไอ เป็นลม หัวใจเต้นเร็ว
- ท้องร่วงขณะที่ใช้ยาหรือหลังจากหยุดใช้ยา
- อาการทางผิวหนัง ปรากฏในลักษณะที่อาจลุกลามเป็นอันตราย เช่น เป็นตุ่มนูนแดง เป็นตุ่มพองที่ผิวหนังหรือผิวหนังเยื่อเมือก (เช่นในช่องปาก เยื่อตา หรือ อวัยวะเพศ) หรือ เป็นแผลหลุดลอกที่ผิวหนังหรือเยื่อเมือก ที่ร่วมกับมีไข้ ปวดเมื่อยตามร่างกาย

"ต้องรีบไปพบแพทย์ทันที"

5.2 หากใช้แล้วเกิดอาการ เช่น

- สีของผิวหนัง ฟัน ลื่น เปลี่ยนเป็นสีส้มแดง

- ของเหลวในร่างกาย เช่น ปัสสาวะ อุจจาระ น้ำลาย เสมหะ น้ำตา เหงื่อ นานม เปลี่ยนเป็นสีส้มแดง

“ให้รอดอาการ แต่ถ้ามีอาการรุนแรงควรไปพบแพทย์”

6. ควรเก็บยานี้อย่างไร

- เก็บยาที่อุณหภูมิต่ำกว่า 30 องศาเซลเซียส
- เก็บในที่แห้งและไกลจากความร้อน
- เก็บให้พ้นมือเด็ก

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยานี้

- เม็ดกลมมน เคลือบฟิล์ม สีชมพูเข้ม สลัก “F” ด้านหนึ่ง อีกด้านหนึ่งเรียบ
- ยานี้ประกอบด้วย
 - calcium stearate
 - edetate disodium
 - FD&C Blue No.2 aluminum lake
 - hydroxypropyl cellulose
 - hypromellose
 - microcrystalline cellulose
 - polyethylene glycol
 - pregelatinized starch
 - propylene glycol
 - sodium ascorbate
 - sodium lauryl sulfate
 - sodium starch glycolate
 - red iron oxide
 - titanium dioxide

ผู้นำเข้า

บริษัท ซาโนไฟ-อเวนต์ิส (ประเทศไทย) จำกัด

เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ 28 มีนาคม 2562

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ หากมีข้อสงสัยให้
ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร