

บอร์ทีโซ้มิบ
ความแรง 3.5 มิลลิกรัม
ชนิดผงละลายน้ำสำหรับฉีด
ชื่อการค้า Myzomib (มา依โซ้มิบ)

1. ยานี้คือยาอะไร

1.1 ยานี้มีชื่อสามัญว่าอะไร

- ยานี้มีชื่อสามัญว่า บอร์ทีโซ้มิบ (bortezomib) เป็นยาต้านมะเร็งที่ออกฤทธิ์เฉพาะเจาะจงต่อ เซลล์มะเร็ง

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

- รักษามะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดมัมมาร์โนมา
- รักษามะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิดแม่นเทลเซลล์

2. ข้อควรรักก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไหร

- เดยแพ้ยาที่เคยได้รับประกอนของยาที่มีความผิดปกติเกี่ยวกับปอด หรือหัวใจ

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยา

- แจ้งแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยาที่ หากห้ามอยู่ในกลุ่มต่อไปนี้
 - เป็นโรคหัวใจ ความดันเลือดสูง
 - ตับทำงานผิดปกติระดับปานกลาง หรือรุนแรง
 - มีอาการชา ปวดแปลบที่มือ หรือเท้า
 - เม็ดเลือดแดงหรือเม็ดเลือดขาวต่ำ
 - เลือดออกง่าย เกล็ดเลือดต่ำ
 - ไตทำงานผิดปกติ
 - เคยชัก
 - กำลังเป็นไข้
 - กล้ามเนื้ออ่อนแรง เป็นตะคริว สับสน ตามัว ตาพร่า เห็นภาพเบลอ ภาพชัด
 - ความจำเสื่อม การคิดมีปัญหา เดินลำบาก สูญเสียการมองเห็น พระเป็นอาการของการติดเชื้อรุนแรงที่สมอง
 - เคยได้รับยาที่แล้วมีอาการเป็นลม เวียนหัว

- แจ้งแพทย์หรือเภสัชกรหากท่านดังครรภ์ มีแผนจะดังครรภ์หรือให้นมบุตร เพราะไม่มีข้อมูลความปลอดภัยของทารก
- เด็กและวัยรุ่นอายุน้อยกว่า 18 ปี ไม่ควรใช้ยาที่ พระยังไม่มีข้อมูลด้านประสิทธิภาพและความปลอดภัย
- ไม่ควรใช้ยาที่ร่วมกับยา อาหาร สมุนไพร หรือ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบางชนิด พระอาจมีผลต่อการรักษาหรือเกิดอันตรายได้ เช่น
 - ยาคีโตโคนาโซล ซึ่งใช้รักษาเขี้ยวร้า
 - ยาติโนนาเวียร์ ซึ่งใช้รักษาโรคเอดส์
 - ยาไรเฟมพิชิน ซึ่งใช้รักษาวัณโรค
 - ยารักษาโรคคลมชัก
 - ยารักษาเบาหวาน
- หากห้ามไม่แนะนำว่ากำลังใช้ยาเหล่านี้อยู่
โปรดปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

3. วิธีใช้ยา

3.1 ขนาดและวิธีใช้

- ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรท่านนั้น เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยาที่เข้มข้นกับชนิดและความรุนแรงของโรค
- แพทย์หรือพยาบาลจะเป็นผู้จัดยาที่ให้ห้ามโดยชัดเจ้าทางหลอดเลือดดำหรือใต้ผิวนัง

3.2 ถ้าหากลืมฉีดยาควรทำอย่างไร

- แจ้งแพทย์ พยาบาล หรือเภสัชกร หากห้ามลืมมากับยา หรือไม่ได้ไปพบแพทย์ตามนัด

3.3 ถ้าหากฉีดยาเกินขนาดที่แนะนำควรทำอย่างไร

- หากมีอาการผิดปกติ เช่น วิงเวียน หน้ามืด เป็นลม ตาพร่า มือเท้าเย็น เนื้องอกมาก หายใจเร็ว เนื้อย หรือลงสัญญาณร้าย ให้รับยาที่เกินขนาด ให้แจ้งแพทย์ หรือพยาบาลทันที

4. ข้อควรปฏิบัติหลังจากฉีดยา

- พบแพทย์ตามนัดทุกครั้งเพื่อติดตามผลการรักษา หรืออันตรายจากยา
- ระมัดระวังการขับปัสสาวะที่ห้องน้ำ ก่อนและหลังการฉีดยาที่แล้วมีอาการเป็นลม เวียนหัว

- ผู้ป่วยทั้งชายและหญิงต้องคุยกันเป็นตลอดระยะเวลาที่ใช้ยา และ ต้องคุยกันเป็นประจำอย่างน้อย 3 เดือน หลังจากหยุดยาครั้งสุดท้าย
- แจ้งแพทย์ทันทีหากดังครรภ์ หรือลงสัญญาณร้าย ดังครรภ์ในระหว่างใช้ยา หรือดังครรภ์ภายใน 3 เดือนหลังจากหยุดยาครั้งสุดท้าย

5. อันตรายจากยา

5.1 หากใช้ยาแล้วเกิดอาการเช่น

- บวมที่ใบหน้า เปลือกด้า ริมฝีปาก ลมพิษ
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอัก หายใจลำบาก หายใจสั่น
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวนังหลุดลอก
- มีจ้ำดามผิวนัง หรือเลือดออกผิดปกติ
- ตัวเหลือง ตาเหลือง ปัสสาวะเหลืองเข้มผิดปกติ
- กล้ามเนื้อเป็นตะคริว กล้ามเนื้ออ่อนแรง ปวดกล้ามเนื้อ ปวดกระดูก
- ชัก ปวดหัว สับสน ตาพร่า ตามัว เห็นภาพเบลอ ง่วงชืน เดินลำบาก
“ต้องรีบแจ้งแพทย์หรือพยาบาลทันที”

5.2 หากใช้ยาแล้วเกิดอาการเช่น

- มีอาการชา ปวดแบบที่มือ หรือเท้า
 - มือ เท้า หัวเข่า หรือขาด้านล่างบวม
 - หัวใจเต้นผิดปกติ ความดันเลือดต่ำ เป็นลม
 - ชีด อ่อนเพลีย เนื้อยังงาย
 - ติดเชื้อย่างง่าย มีอาการคล้ายเป็นหวัด
 - คลื่นไส อาเจียน เปื่อยอาหาร
 - ห้องอึด ห้องผูก หรือห้องร่วง
 - แพลในปาก
 - ผอมร่อง หรือผอมมีลักษณะผิดปกติ
- “ให้รอดูอาการ และถ้าหันไม่ไหวหรือมีอาการรุนแรง ให้แจ้งแพทย์”

6. ควรเก็บยาที่อย่างไร

- เก็บยาที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส อย่า แกะออกจากกล่องกระดาษที่มากับผลิตภัณฑ์
- ยานี้เก็บไว้ที่โรงพยาบาล ท่านจะไม่ได้รับกลับบ้าน

7. ลักษณะและส่วนประกอบของยา

- ผงยาสีขาวถึงสีขาวออกเหลือง ประกอบด้วย ตัวยาบอร์ทิซมิน และแม่นนิಥอล

คำเตือน: ยานี้อาจทำให้เกิดอันตรายร้ายแรงได้ ต้องใช้ ภายใต้การควบคุมของแพทย์เท่านั้น

ผู้ผลิต Mylan Laboratories Limited [OTL]
Plot no. 284 B, Bommasandra - Jigani Link Road,
Industrial Area, Anekal Taluk, Bangalore – 560
105, India

ผู้นำเข้า บริษัท เมด้า พาร์มาซี (ประเทศไทย) จำกัด
เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ 26 มิถุนายน 2561

ข้อมูลยานี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์
หรือเภสัชกร