

เอลิวเทกราเวียร์/โคบิซิสแทท/
เอมโทรซิตาบีน/เทโนโฟเวียร์ อะลาเฟนาไมด์
150/150/200/10 (มิลลิกรัม)
ชนิดเม็ด
(เจนไวเอยา)

1. ยานี้คืออะไร

1.1 ยานี้มีชื่อสามัญว่าอะไร

ยานี้ประกอบด้วยยาชื่อสามัญว่า เอลิวเทกราเวียร์/โคบิซิสแทท/
เอมโทรซิตาบีน/เทโนโฟเวียร์ อะลาเฟนาไมด์
elvitegravir/cobicistat/emtricitabine/ tenofovir
alafenamide) เป็นยารักษาโรคติดเชื้อเอชไอวี

1.2 ยานี้ใช้เพื่ออะไร

ยานี้ใช้เพื่อ

- รักษาโรคติดเชื้อเอชไอวีในผู้ใหญ่และเด็กวัยรุ่น
- รักษาโรคติดเชื้อเอชไอวีในเด็กที่มีอายุมากกว่า 12-6 ปีขึ้นไปที่มี
ซึ่งมีน้ำหนักตัวอย่างน้อย 35-25 กิโลกรัม ที่ใช้แผนการรักษาอื่น
ไม่ได้เนื่องจากมีความเป็นไปได้
สำหรับเด็กที่ได้รับยานี้ โปรดแทนที่ข้อความ "ท่าน" ด้วยคำว่า
"บุตรของท่าน"

2. ข้อควรระวังก่อนใช้ยา

2.1 ห้ามใช้ยานี้เมื่อไร

- เคยแพ้ยานี้ หรือส่วนประกอบของยานี้
 - **ห้ามกินร่วมกับยาต่อไปนี้**
 - ยารักษาต่อมลูกหมากโต: อัลฟูโซซิน
 - ยารักษาหัวใจเต้นผิดจังหวะ: อะมิโอดาโรน ควินิดิน
 - ยารักษาโรคลมชักเช่น คาร์บามาซีพีน ฟิโนบาร์บิทอล เฟนิทอยน์
 - ยารักษาวัณโรค: ริแฟมพิซิน
 - ยารักษาโรคไมเกรน: เออร์โกทามิน
 - ยาที่กระตุ้นการเคลื่อนไหวของทางเดินอาหาร: ซิซาไพรด์
 - สมุนไพรรักษาโรคซึมเศร้า: เซนต์จอห์นส์เวิร์ต
 - ยาลดไขมันในเลือด: ซิมวาสแตติน โลวาสแตติน
 - ยานำบาดอากาศทางจิต: ฟลิเมซัล ลูวาฟีโดน
 - ยารักษาความดันหลอดเลือดแดงในปอด: ซิลเดนาฟิล
 - ยากดประสาท: มิดาโซแลม โทระโซแลม
- หากท่านเคยกิน หรือกำลังกินยาดังกล่าว ต้องแจ้งให้แพทย์ทราบ
ทันที เพราะอาจทำให้โรครุนแรงขึ้นหรือเกิดอันตรายจากยามากขึ้น

2.2 ข้อควรระวังเมื่อใช้ยานี้

- หากท่านมีภาวะต่อไปนี้ ได้แก่ โรคติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีหรือ
ไวรัสตับอักเสบบี โรคตับ โรคไต โรคกระดูกตาย ภาวะพ่นน้ำตาลแลค
โทส ภาวะอักเสบจากการติดเชื้อของระบบภูมิคุ้มกัน ภาวะไขมัน
สะสมใต้ผิวหนังผิดปกติ ควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ยานี้
- หากท่านไม่แน่ใจว่า ยาเสริม หรือสมุนไพรที่กินอยู่มีผลกับ
การใช้ยานี้หรือไม่ ให้ปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ยา และควรระมัดระวัง

การใช้ยานี้ร่วมกับยา อาหาร สมุนไพรบางชนิดเพราะอาจมีผลต่อ
การรักษาหรือเกิดอันตรายได้ เช่น ยาด้านเชื้อรา : คีโทโคนาโซล
- ยารักษาโรคติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี : เทโนโฟเวียร์ อะลาเฟนา
ไมด์ เทโนโฟเวียร์โพรออกซิลฟูมาเรด ลามิวูดีน และไวรัสตับอักเสบบี
ซี : โบเซพรีเวียร์* ยารักษาโรคหัวใจ: ดิจอกซิน เพราะยานี้อาจ
เพิ่มพิษของยาดิจอกซินได้
- ยาด้านจุลชีพและรักษาโรคผิวหนัง: ริฟาบูติน คลาริโทรไมซิน -
ยากลากังวล หรือยารักษาโรคซึมเศร้า • ยากดภูมิคุ้มกัน:
ไซโคลสพอริน - ยาสเตอรอยด์และซัลฟูนาไมด์รักษาอาการภูมิแพ้
หอบหืด อากาศหืด หรือกล้ามเนื้ออักเสบ เบนทามเทวาโซน เพรดนิโซ
โลน ไทโรแอมซีโนโลน ควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ยาเพื่อติดตาม
อาการข้างเคียงอย่างใกล้ชิด
- ยารักษาเบาหวาน : เมตฟอร์มิน* ยาลดไขมันในเลือด: วอร์ฟาริน
- ยาขยายหลอดลม: แซลเมเทอรอล • ยารักษาโรคเกาต์: คอลชิซิน

• หญิงที่กินยาเม็ดคุมกำเนิด หากกินร่วมกับยานี้อาจทำให้
ประสิทธิภาพยาคุมกำเนิดลดลง ควรคุมกำเนิดด้วยวิธีอื่นร่วมด้วย
เช่น ใช้อุปกรณ์อนามัย

3. วิธีใช้ยา

- 3.1 ขนาดและวิธีใช้ ควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือ
เภสัชกร เพราะขนาดและระยะเวลาในการใช้ยานี้ขึ้นกับชนิดและ
ความรุนแรงของโรค
- กินวันละ 1 ครั้ง พร้อมอาหาร

- ห้ามเคี้ยว หรือบดเม็ดยา แต่สามารถหักแบ่งเม็ดได้ในกรณีที่ไม่สามารถกลืนยาได้ทั้งเม็ด ควรหักเมื่อยังก่อนกินเท่านั้น ไม่ควรหักแบ่งเก็บไว้
- หากกินวิตามินรวม หรือยาลดกรดที่มีส่วนผสมของแมกนีเซียม หรืออลูมิเนียม ให้กินก่อนหรือหลังกินยานี้อย่างน้อย 4 ชั่วโมง
- หากอาเจียนภายใน 1 ชั่วโมงหลังกินยา ให้กินยาซ้ำ 1 เม็ด

3.2 หากลืมกินยาควรทำอย่างไร

- ถ้านึกได้ภายใน 18 ชั่วโมงหลังจากเวลาที่ต้องกินยาตามปกติ ให้กินยาทันทีที่นึกได้ และกินยาเมื่อต่อไปตามปกติ
- ถ้านึกได้เกินกว่า 18 ชั่วโมงหลังจากเวลาที่ต้องกินยาตามปกติ ให้รอกินยาของมือต่อไป และห้ามกินยาเพิ่มเป็น 2 เท่า

3.3 ถ้ากินยานี้เกินขนาดที่แนะนำ ควรทำอย่างไร

- ให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรง ให้รีบไปพบแพทย์ทันที

4. ข้อควรปฏิบัติระหว่างใช้ยา

- ห้ามหยุดยาเอง และให้กินยาอย่างต่อเนื่องตามคำแนะนำของแพทย์ หรือเภสัชกร
- พบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตามผลการรักษาหรืออันตรายจากยา
- ระมัดระวังการใช้ยานี้ในหญิงมีครรภ์และให้นมบุตร เนื่องจากไม่มีข้อมูลยืนยันความปลอดภัย แพทย์อาจตรวจเลือดและร่างกาย

ท่านเป็นประจําเพื่อพัฒนาการเด็กในครรภ์ และประเมินผลการรักษาหรือผลข้างเคียงจากยา

- ระหว่างใช้ยานี้ คุณยังสามารถรับเชื้อหรือแพร่เชื้อไวรัสสู่ผู้อื่นได้ ควรปรึกษาแพทย์เพื่อทราบวิธีปฏิบัติตัวที่ปลอดภัย
- หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่และเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
- ระมัดระวังการขับขี้จิ้งจก ยานอนหลับหรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกลหรือทำงานที่เสี่ยงต่อการพลัดตกจากที่สูงเนื่องจากยานี้ทำให้เวียนศีรษะ มึนงงได้

5. อันตรายที่อาจเกิดจากยา

5.1 อาการที่ต้อง หยุดยาแล้วรีบไปพบแพทย์ทันที

- บวมที่ใบหน้า เปลือกตา ริมฝีปาก ลมพิษ
- หน้ามืด เป็นลม แน่นหน้าอก หายใจลำบาก
- ผื่นแดง ตุ่มพอง ผิวหนังหลุดลอก มีจุดตามผิวหนัง หรือเลือดออกผิดปกติ
- ภาวะกระดูกตาย ซึ่งมีอาการปวดและเจ็บข้อโดยเฉพะสะโพก หัวเข่าและไหล่ ข้อตึงขัด เคลื่อนไหวลำบาก
- ภาวะแพ้ภูมิตัวเอง ซึ่งมีอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรง เริ่มที่มือ เท้า และลำตัว ใจสั่นเมื่อเคลื่อนไหวมากผิดปกติ

5.2 อาการที่ ไม่จำเป็นต้องหยุดยา แต่ถ้ามีอาการรุนแรงให้ไปพบแพทย์ทันที

- คลื่นไส้ เวียนศีรษะ

- ท้องเสีย

- ผื่นผื่นปกติ อ่อนเพลีย

หากมีอาการไม่พึงประสงค์ใดๆ ที่สงสัยว่าเกิดจากการใช้ยานี้ โปรดแจ้งแพทย์และผู้รับผิดชอบการวางจำหน่ายในประเทศ (หมายเลขโทรศัพท์ 02-257-3500) เพื่อติดตามความปลอดภัยจากการใช้ยา

6. ควรเก็บยาอย่างไร

- เก็บไว้ในภาชนะบรรจุเดิมตามที่ได้รับมา
 - เก็บยาในที่แห้ง อย่าให้โดนแสงโดยตรง โดยทั่วไปควรเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส
 - ไม่เก็บยาในที่ร้อนหรือชื้น เช่น ในรถ ห้องน้ำ ห้องครัว
 - เก็บยาให้พ้นมือเด็ก
- ผู้ผลิต Patheon Inc., Canada/
ผู้นำเข้า DCH Auriga (Thailand) Limited /
ผู้แทนจำหน่าย DCH Auriga (Thailand) Limited
เอกสารนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ กุมภาพันธ์ 2566 2561

เอกสารนี้เป็นข้อมูลโดยย่อ
หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร